






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5853/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5853/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5853/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5853/A


A. XXXIV

16/5

5853

/A





Omnes fere radices alius solvunt
propter succum mercuriatum quem
in terra hauriunt.


Gravis Confusio betwixt feet
& head. hands & head.
Breasts & wombs. Bal. 25. /

Delitit virtus mellea per Evacuacionem

Tertia pars morborum Curatur
Sudoribus /

Laudamus. medicina Laudatissima

Hodgson
Sept 11.
1860



Hab. by man. 1723

APHORISMORVM
MEDICINAE
LIVM,


CVM THEORICORVM, TVM
PRACTICORVM, OMNIBVS, QVIBVS
secunda valetudo curæ est, appri-
mè necessariorum,

SECTIONES OCTO.

QVARVM PRIORES QVINQVE
theoricam Medicinæ partem, vt ex Arabum distinctione
appellatur; posteriores verò tres Practicam, sic ab
iisdem dictam complectuntur.

Collectæ studio & operâ

AVRENTII SCHOLZII VRA-
TISLAV. PHILOSOPHIÆ ET ME-
dicinæ Doctoris.



FRANCOFVRTI AD MOENVM,
typis & sumptibus Wecheliorum,
apud Danielelem & Daudem Aubrios &
Clementem Schleichium.


ANNO M.DC.XXVI.

Handwritten text at the top of the page, likely a title or header, written in a cursive script.



EPISTOLA DEDI-
CATORIA:

AD MAGNIFI-
CVM, AMPLISSIMVM,
prudentissimum SENATVM
Clytæ Silesiorum Reipublicæ
RATISLAVIENSIS, Dominos
& Patronos suos omni re-
uerentia colendos.

 *Vm ea bona, quibus
Deus Optimus Ma-
ximus mortalium ge-
us amplissimè auctum cohone-
tumq; voluit, mecū ipse consi-
ro; in eam sententiam facilè*
A 2 ad-

EPISTOLA

adducor, ut præclarius magnificenti-
usq; nullum, quàm Medi-
cinam, Artem omnium, quas
humana eruit industria, salu-
berrimam, reperiri posse existi-
mem. A reliquis enim externa
ut plurimum fortunæ subsidia
petuntur: ab hoc verò ipsa sani-
tas, qua nihil homini utilius, aut
suavius in hac ærumnarum val-
le contingere potest, ac sine qua,
ut Orpheus in hymno suo ceci-
nit, cuncta hominibus inutilia
sunt, cuique Plato primum inter
bona humana locum tribuit, de-
pendet. Cùm itaq; sacratissimæ
artis Medicinæ tanta dignitas
sit,

DEDICATORIA.

fit, atque utilitas: præclare mihi
de mortalium commodis, qui in
hac augenda atque illustranda,
omnes ingenii sui nervos inten-
derunt, promeriti esse videntur.
Decet enim animum liberaliter
à natura, & doctrina institu-
tum, virtutemque ac decus a-
mantem aliquid opis communi
hominum societati conferre, nec
de propria magis, quàm de publi-
ca utilitate sollicitum esse. Quod
cum ita sit: ut pro mea etiam
parte Medicinam, artem nostram
præclarissimam, exornarem; sen-
tentias istas Aphoristicas: quæ
hactenus hinc inde sparse lege-

A 3 ban-

EPISTOLA

bantur, ac veluti disiectæ nau-
 fragiæ tabulæ, ex totidem libris,
 quot earum autores sunt, non si-
 ne graui lectoris molestia, peten-
 dæ erant: in unum quasi corpus
 contractas, unicoque libello, di-
 lucida breuitate conspicuo, pul-
 chro ordine, & iusta serie, vt u-
 niuersæ simul studiosorum oculis
 subiicerentur, comprehensas, in
 lucem edendas, honesta, opinor,
 sententia statui. Et si enim hasce
 octo Aphorismorum Medicinæ
 sectiones, in illo otio meo,
 quod mihi ex Italia ante decen-
 nium reuerso, in Patria, ante-
 quam plurib. in ea innotescerẽ,
 con-

DEDICATORIA.

concedebatur, non in eum finem,
ut aliquando in publicum emit-
terem; sed in priuatum potius u-
sum meum collegeram : tamen
cū viderem amicos nonnullos
has non solum approbare : ve-
rum etiam apud me instare, ut
eas ad prouehendos studiosorum
conatus, typis describendas da-
rem; neque tam commodam de
rebus mortalium benè merendi
occasionem è manibus amitterē,
ut æquissimis postulatis eorum;
quid à me efflagitabāt, gratifi-
carer, has diutius apud me sup-
primere nolui. Aggressus autē

A 4 sum

EPISTOLA

sum hoc, quicquid est laboris, eò
alacrius, quod certò mihi per-
suasum haberem, fore, ut consi-
lium hoc meum, quod à me non
alio fine, quàm ut ipse quoque in
communem vitæ usum, aliquid
posteritati conferrem, susceptū
est, à plurimis approbaretur.
Quantum verò hi Aphorismi
lectoribus profuturi sint, ex ipso
potiùs euentu, quàm magno
meorum verborum encomio, po-
steris innotescere cupio. Si qui
tamen erunt, qui hæc nostra im-
perfecta esse iudicauerint, eos
propter publicam rei Medici-
næ studiosorum utilitatem pera-
manter

DEDICATORIA.

manter rogatos volo, ut his meliora, commodiorique ordine, ut lectioni & memoria maius lumen accedat, disposita, posteritati communicent. Quod si fecerint, magnam non solum illis gratiam habiturus, minimeque gloria ipsorum inuisurus: verum grata commemoratione laudes eorum amplificaturus sum. Et hac de consilio & instituto nostro dicta sufficiant. Cur autem hasce conatus mei primiti honoratissimi nominis vestri splendore, vestroque patrocinio tectas, in publicum prodire voluerim, Nobilissimi, Amplissimi,

A 5 simi,

EPISTOLA

*fimi, & prudentissimi Viri,
CONSVLES ET SENATO-
RES, Domini ac Patroni mihi
plurimum observandi; non solum
ob eximias, summopereque ad-
mirandas animorum vestrorum
dotes, insignem nimirum pie-
tatem, singularem prudentiam,
incredibilem humanitatem, ad-
mirabilem industriam, ac plu-
rimarum rerum usum: verum-
etiam ob singularem vestrum
erga me amorem, multiplicem
benevolentiam, ac innumera
vestra erga me merita, quæ gra-
tam à me memoriam efflagitāt,
à me factum est. Licet autem
exi-*

DEDICATORIA.

exiguum istud munusculum vestris in me animis nequaquam par esse; sed longè maius vobis deberi, verè statuam: tamen fretus singulari vestra humanitate, ac propensa in studia honesta volūate, quam radicem esse iudico, ex qua uberrimi, letissimique aliarum virtutum fructus proueniunt, in eam spem adducor, fore, ut hoc chartaceum munus, mei erga vos officii, studii, & obseruantiae monumentum sempiternum, hilari fronte suscipiatis, boni consulatis, ac me, meaque studia, voluntate benefica, sicut hactenus à vobis factū
A 6 est,

EPISTOLA

est, in posterum quoque comple-
ctamini. Sed cum vestra sponte
hoc facturos esse non dubitem,
me pluribus verbis hoc à vobis
petere, prorsus superuacaneum
esse iudico. Quod superest, DE-
VM ter maximum, ut vos in
plurimos annos saluos & inco-
lumes conseruet, & omnia consi-
lia, deliberationes, ac labores ve-
stros, quos singulari prudentia
pro Reipublicæ gubernatione
suscipitis, benignè fortunet, fa-
ciatque ut vestra gubernatio
felix sit, tranquilla, & salutaris,
ardentibus votis oro. Sed ne lon-
gior sim, benè valeatis mihi co-
lendi

DEDICATORIA.

lendi PATRIÆ PATRES, bonorum omnium, doctorumque inprimis Patroni optimi, & vivatis quàm felicissimè, diutissimèque incolumes, Reipublicæ, amicis, ac vestris omnibus, meque, nominis vestri observantissimum, solita benevolentia persequi pergatis. Vratislaviæ, die Dominica Palmarum. Anno à partu Virgineo 1589.

Vestræ Ampliss. Prud.
addictissimus

LAVRENTIVS SCHOLZIVS,
Medicinæ Doctor.

A 7 . IN



IN APHORISMOS
Viri Clarissimi Dn. LA V-
RENTII SCHOLZII, Medici
& Philosophi præstan-
tissimi

EPIGRAMMA.

QVI varias lustrat discendi ardore ta-
bernas,

Hic paruo magnas ære emat hospes opes.

Nil hic plebeium aut scriptorum è face peti-
tum,

Nil quod non vsus, quod ratio ipsa prober.

Tot gemmæ, quot verba libris excerpta sopho-
rum,

Magnaque sub quavis voce medulla latet.

Huc fœcundus Arabs, methodique Magister
Iberus,

Celta huc diuitias huc tulit Auso suas.

Salve apis Elysia & plures è diuite cella,

Ingenii profer, quas veneremur, opes.

Nam.

*Nam quam das aliis, SCHOLZI clarissime,
vitam,
Ingenii spondent hanc monumenta tibi.*

NICOLAUS RHEDINGER
à Strisa, Musis inuitis F.

ALIVD.

L EMMATA seu te Coa iuuant: seu tur-
gida magni,

Tibi vena Claudii placet.

*Siue Arabum Princeps Auenzoar: aut Abo-
allys.*

*Maiores utroque Auenroes,
Forte tuum ad gustum faciunt, lentamque sa-
liuam:*

*O care Phæbo prolyta:
Huc celeres confer gressus: SCHOLCI q; li-
bellum,*

Politulum, limatulum.

*Hauri avidis præceps oculis: atque aurea in imo
quicquid,*

Præcepta conde pectore.

Quic-

Quicquid Arabs; quicquid florentia Pergama:
Schola Coāsciuit; aut sciet:

Omne breui strinxit calamo Podalirius iste,
Silesii decor soli.

Cui nisi de priua tribuisset nomina fronde,
Apollo: Lauri confitor:

Ipse suos titulos illi nomenque fuisset,
Largitus AEsculapius.

O felix mea Bresla: tuū hunc cōplectere foetū:
Meritisque macta honoribus.

Nam superat iubar hoc, iubara illa antiqua
Galenum,

Hippocraten, Auenroem:

Quosque DEVM numero veteres habuere
Poeta:

Apollinem, AEsculapium.

Aut si forsan idem sunt, SCHOLZIVS at-
que Galenus,

Hippocrates, Auenroes:

Quosque DEVM numero veteres habuere
Poeta:

Apollo & AEsculapius.

Carnem atq₃ ossa istos dicam, pellemq₃; sed illū,
Succum, medullam, sanguinem.

IOH. MATH. WACKER,
I. C. Constantinus.

ALIVD.

ALIVD.

QVALITER extractam per multa vo-
lumina litem,

Cū pars quæque preces clausit anhelæ suas,
Prætor amans æqui dirimit sermone rotundo,
Promit & ad veri vix tria verba fidem:

Non secus in vastis quæ Pæonis arte politi,

Aduersum morbos differuere libris,

Illa breui forma complecteris, orbaque fruge,

Vel minus ex vsu firma, tacenda putas.

Scriptores varii coiere volumen in arctum;

Quæque libri grandis pagina semen habet.

Sudasti si issum. Prætori doctæ, laborem,

Sed graue Mnemosyne leniit acris opus.

Atropos hoc igitur cū forte videret, apertam

Sic nutu bilem significante refert:

Longa quod ars, rapidæ sed sit brevis orbita
vitæ,

Publica communi sorte querela gemit.

Vt brevis ars contra, sed longa sit orbita vi-
tæ,

Autor hic excellens Pæonis arte facit.

Bilis

*Bilis agat Parcā. Tibi laus det premia Lauri,
Cuius, amant Artes, fraus necis horret, o-
pem.*

GEORG. TILLENI, V. I. D.
Illustris. Ducis Monster-
bergen. à Consiliis.

ALIVD.

INVENTVM Medicina Dei est; Qui cō-
didit artem,
Arti etiam prestò est, & iuuat artis opus.
Sed studiis opus est. Nam qui sine lege meden-
tur,
Ægris triste malum, probra sibiq³ creant.
Olim igitur nato: artem docuere parentes,
Græcia cum docta Pallade sæta fuit.
Nec schola longa fuit: Rebus sententia præ-
gnans,
Contraxit breuibus dogmata certa modis.
Arcta quidem ratio est. At si benè vertis ad v-
sum,
Panditur in curas areolata tuas.
Nec male procedit, qui nunc quoque prisca re-
perta,

Colli-

Colligit, inque operis seruat alitque suis,
Nullius ille dabit vitæ per pharmaca damnum,
Quicquid agat, morbi dum graue soluit o-
nus.

Eiiciet multas affecto corpore pestes,
Prelia cumque fera Morte secunda geret.
Nam DEVS ingenio Medici succurrit, &
Arti,


Cùm sit, quod fieri cum ratione decet.
Sic labor est felix, sic experientia crescit,
Assiduè, multis fertque salutis opem.
Præstat idem studio quoniam LAVREN-
TIVS, acri,

Quis lauri dignum fronde virente neget?
Patria fortè negans dicet; Mea membra tuen-
tis,

Condecorant melius quærnea ferta caput.

M. NICOLAVS STEINBERG
Vr. Schol. Vratisl. Rector.

ALIVD.



ALIVD.

EST aliquid sauos dextra prostrasse Leo-
nes,

Et valida tauros perdomuisse manu.

Sed morbos domuisse, ipsiq. resistere Morti;


Et fati celeres sistere posse gradus.

Hoc opus hic labor est; nempe istac gloria pau-
cis

Contigit, aut si cui? contigit ista tibi.

DANIEL ENGELHARD
in Coroscavv.


Cla-



Clarissimo Viro,
DN. LAVREN-
TIO SCHOLZIO,
Medicinæ & Philosophiæ
Doctori eximio,

S. P. D.

MARTINVS WEINDRICH
VRAT.



DE APHORISMORVM
συμμετρη, quos ex opti-
mis Medicorū com-
mentariis hinc inde
disperfos, in hoc libello nobis re-
ponis, quæris quid mihi videat-
ur: opera est, quantum ego iu-
dicare possum, te in primis di-
gna,

gna, quæque varietatem in le-
gendo, laborem, ac prudentiam
in colligendo, iudicium in dis-
ponendo, pietatem verò in
iuuandis alienis miseriis aper-
tissimè indicat. Sententiæ ipsæ
graues, maturæ, quæ rem & v-
sum habent, nihil hîc vulgare,
aut ignobile, ex sapientum hor-
tis omnia, ipsumque consilium
tuum & exemplo potes, & ratio-
ne tueri: Nam autorem habes
inter Medicos antiquissimum
Hippocratem, qui artem vestrâ
sententiis talibus non paucis lo-
cupletissimè nobilitauit: Græ-
cos deinde Medicos alios vide-
mus, postea Arabes, denique la-
tinos etiam in hoc genere mul-
tùm laborasse, vt legislatorum
respōsa, decreta, senatus consul-
ta, Ethicorum & septem sapien-
tum

tum gnomas, theologorum moracula, anthologias, polyantheas planè præteream. Quid in parua arte aliud Galenus egit? Quid Avicenna in canticis, & Rabbi Moses, ac Damascenus? è nostris hominibus Arnoldus, Alexander Benedictus, Otto Brunsfeldius, & qui hos omnes diligentia superasse videtur, in locupletissimo illo Galenicarum sententiarum indice conficiendo, Antonius Musa Brassauolus, & complures etiam alii: Nam cum duoomnino docendi genera esse sapientes illi animaduertissent, vnum diffusum & diexodicum. Alterum Aphoristicum, præcisum, & definitum, summaque breuitate circumscriptum, & κατὰ σύνθεσιν, ex his duobus prius illud in philosophando, & veritate in-

te inquirenda, Alterum ad memoriae subsidium adhibuerunt, quæ ut custos est eorum, quæ discuntur, ita infinitas illas res in ambitu scientiarum (cùm & finitum infiniti capax non sit, & prolixitas ingenium perturbet) vix admittit, nisi multa in pauca, quasi in carmen inclusa, redigantur. Ergo copiosarum præceptionum summas quasdam sententias, ac velut conclusiones, quales sunt in omnibus artibus, detrahentes quædam, constituerunt, quæ à toto corpore auulsæ seminis instar, mole quidē minimi, sed virtute maximi, si quis hoc agat, ad multa reuocari, & diduci rursus possint, sicut multa quæ sunt ad pauciora, è quibus cœtera pullulant redigi. Eas porrò sententias, si soli con-

tem-

templationi seruirent, theore-
mata appellabant, qualia sunt,
Corporis simplicis simplex mo-
tus: Infinitum plus vno esse non
potest: Figura rotunda perfectis-
sima: sin verò ad actionem face-
rent, practicas sententias, vt,
Turpe, nescire, quid liceat sibi.
Qui mortalis est, immortalem i-
ram non gerat. Sera omnis vita
crastina. Id vtrumque enuncia-
tionum genus vel rationem ha-
bet additam, si res dubia sit, vel
non habet, si per se manifesta. V-
niuersas autem vel sub ænigma-
te, vt Pythagorici, vel apophteg-
mate, vel parabola, aut denique
legis ac decreti autoritate enū-
ciabant, vt quatuor earum for-
mæ essent: Placere aliis aliæ.
Medicorum sententiis Aphorif-
mi nomen Hippocrates impo-
suit.

B

suit.

fuit, maximus proprietatum in
rebus nominandis affectator:
sunt autem non flosculi quidam
tantum, sed ipsa artis summa ca-
pita paucis expressa, nulla ver-
borum frequentia munita, quæ
in iudicando lucem, in agendo
viam præmonstrant, magnum-
que ad omnem artis exercita-
tionem subsidium habent, quod
& tu, Vir clarissime, frequenti
artis exercitatione observas
quotidiè, & artifices huius gene-
ris alii aliorum in periculis quo-
tidiè experiuntur, maximè, si ut
hæ ipsæ sunt, sententiæ veræ sint,
receptæ, rationi ac experientiæ
consentaneæ, si è turba selectæ,
ac quasi ab excrementis com-
munium opinionum repurgatæ,
quod ipsum vox Aphorismi vi-
detur innuere, & sit, qui eas non
tan-

tantum meminerit, sed sciat etiam
commodè vtendo suas facere:
Neque enim stolidum vsurpa-
torem, & qui non, nisi ad vnum,
possit respicere, desiderant:
Quòd si quis hoc in istis senten-
tiis vituperet, dicatque per pau-
cas è tanto esse numero, quæ v-
niuersaliter, ac sine exceptione
efferi possint, aut cōtradictione
non destruantur, fatebor id pri-
mum, cum vetus sit, semper cum
periculo aliquid de toto affir-
mari posse, & ipsi etiam verissi-
mè Philosophi pronunciarint,
difficilimū esse, vniuersale quip-
piam constituere. In Medicorū
verò principiis ob subiecti, & re-
rum circa quas versantur natu-
ram mutabilem, minus etiam
Mathematica illa certitudo
postulanda est. Illud tamen ad-


B 2 den

dendum, iniquum & sophisticū
esse, aphorismi vel definitionis
etiam alicuius veritatem vno a-
liquo exemplo abhorrente, sed
rarò, superbè eleuare velle:
Quid enim? Vixit Augustus e-
dentulus ad annum vsque se-
ptuagesimum. Malè igitur dixe-
rit Aristoteles, Raros dētes bre-
uitatem vitæ indicare? Nihil mi-
nus, vt nec illud, Mares in dex-
tro gestari, in sinistro fœminas.
Ferrum quoddam est, vt & ori-
chalcum, de quo Scaliger, quod
nullo igni liquefieri possit: An
ob id falsa ilicò definitio fuerit:
Metallum corpus esse fossile,
durum, quod ab igne liquefcere
& metallico dilatari possit? Nihil
iniquius: Ergò vt hæc de iis tan-
tum metallis intelligi debent,
quæ sub terra, non in nubibus
nata

nata sunt, & nasci plerunque ac
secundum naturam solent. Ita
fatis opinor fuerit decantatas
illas artium & scientiarum sen-
tentias, si non in vniuersum, sal-
tem magna ex parte, & ἐπὶ τὸ πολὺ
veras esse, non de omni, & loco,
& tempore, & corpore, estque
prudentiæ videre, quousque,
quæ dicuntur, singula se possint
extendere. Aut igitur ita acci-
piendi aphorismi medici, aut nō
hi soli, sed mille alii etiam ex Phi-
losophia eiiciendi. Autores au-
tem, quòd taces, parùm refert:
Quid enim interest, quis dixe-
rit? Verum à quocunque dictum
sit, verum est, & falsum similiter.
Legam igitur hæc, & legent alii,
tibi que pro voluntate optima
iuuandi bonum publicum, & li-
brissius, cuius vitæ & necis po-
B 3 testa-

testatem habebas, hoc est, eden-
di, vel supprimendi, communi-
catione gratiam se tibi debere
ingenuè profitebuntur: Vale vir
Doctissime, & tuam pristinam
mihi & meis, qui te merito tuo
& columus & obseruamus, be-
neuolentiam conserua. Dab. ex
Musæo meo: Pridie Paschat:
ANNO M. D. L. XXXIX.

OCTO



OCTO APHO- RISMORVM MEDI- CINALIVM INDEX.

I. Complectitur Prolego-
mena, & agit:

1. *De Medicina præstantia.* pag. 1.
2. *De Medico atque eius officio.* ib.
3. *De Aegroto.* 4.
4. *De Sanitate.* 6.
5. *De Consuetudine.* 7.

II. Primâ Theoricæ Me-
dicinæ partem, utpote: Φυσι-
λογικῶν, & agit:

1. *De Elementis.* 8.
2. *De Temperamentis.* 2.
3. *De Saporibus.* II
- B 4 4. *De*

INDEX.

- | | | |
|-----|---|-------|
| 4. | <i>De Humoribus.</i> | 12. |
| 5. | <i>De membris siue partibus Cor-</i>
<i>poris.</i> | 13. |
| 6. | <i>De Calido innato, & humido</i>
<i>radicali.</i> | 15. |
| 7. | <i>De virtutibus seu facultatibus.</i> | 17. |
| 8. | <i>De Operationibus, seu fun ctio-</i>
<i>nibus.</i> | ibid. |
| 9. | <i>De generatione fœtus, atque hu-</i>
<i>mano semine.</i> | 18. |
| 10. | <i>De Coitu.</i> | 22. |

III. Secundum, nempe
Υ'μενιω, & agit de rebus non
naturalibus, ac:

- | | | |
|----|---------------------------------|-------|
| 1. | <i>De Aere.</i> | 25. |
| 2. | <i>De partibus anni.</i> | 26. |
| 3. | <i>De Motu & Quiete.</i> | ibid. |
| 4. | <i>De Exercitio.</i> | 27. |
| 5. | <i>De Somno & vigiliis.</i> | 29. |
| | 6. <i>De</i> | |

INDEX.

6.	<i>De repletionē & inanitione.</i>	31
7.	<i>De Phlebotomia.</i>	33
8.	<i>De ventosis.</i>	46
9.	<i>De sanguisugis.</i>	49
10.	<i>De Excrementis.</i>	50
11.	<i>De Urinis.</i>	53
12.	<i>De Sudoribus.</i>	58
13.	<i>De Balneis.</i>	60
14.	<i>De Frictionibus.</i>	66
15.	<i>De animi affectibus.</i>	68

IV. Tertiam, videlicet, πα-
θολογικὴν, & agit de rebus præ-
ter naturam:

1.	<i>De causa morbi.</i>	69
2.	<i>De Morbo.</i>	72
3.	<i>De Symptomate.</i>	78

V. Quartam nempe, Ση-
μειωτικὴν, siue Προγνωστικὴν, &
loquitur de signorum ob-
servatione, ac quidem:

B 5

I. De

INDEX.

- | | | |
|----|----------------------------|-----|
| 1. | <i>De Prognostico.</i> | 78 |
| 2. | <i>De Crisibus.</i> | 104 |
| 3. | <i>De diebus Criticis.</i> | 110 |
| 4. | <i>De Pulsibus.</i> | 113 |

VI. Primam practicę Medicinę partem, nempe: Διαίτητικὴν, & agit:

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | <i>De Victu.</i> | 114 |
| 2. | <i>De regimine puerorum.</i> | 122 |
| 3. | <i>De regimine senum.</i> | 123 |
| 4. | <i>De vario genere ciborum & potus.</i> | 125 |
| 5. | <i>De regiminis mutatione secundum quadrifariam temporum anni diuersitatem.</i> | 141 |
| 6. | <i>De Confortantibus.</i> | 144 |

VII. Secundam partem, videlicet Φαρμακευτικὴν, & loquitur:

- | | | |
|----|-------------------------|-----|
| 1. | <i>De Medicamentis.</i> | 145 |
| | 2. <i>De</i> | |

INDEX.

2. *De Tempore & modo exhibendi Medicinas.* 152
3. *De Quantitate Medicamentorum.* 154
4. *De Purgatione.* 155
5. *De Curatione in genere.* 190
6. *De morbis indeterminatis, siue totius, ac primùm de febris.* 252
7. *De febris Pestilentibus, seu de Peste absolutè.* 286
8. *De Venenis.* 291
9. *De Doloze.* 293
10. *De doloribus Arthriticis.* 296
11. *De morbis internis, ac primò supremi ventris siue capitis.* 302
12. *De morbis medi ventris, nempe: de Thoracis & Pulmonum affectibus.* 341
13. *De morbis infimi ventris.* 357
14. *De morbis Mulierum.* 391
- B 6 15. De

INDEX.

15. *De morbis Puerorum.* 407

VIII. Tertiam partem, ut-
pote: *Χερσρχικῶν*, & agit:

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | <i>De Vulnere.</i> | 410 |
| 2. | <i>De Ulcere.</i> | 415 |
| 3. | <i>De Inflammatione.</i> | 423 |
| 4. | <i>De Apostematibus.</i> | 424 |
| 5. | <i>De articuloꝝ luxationibus &
fracturis.</i> | 429 |
| 6. | <i>De Cutis vitiis.</i> | 432 |

FINIS INDICIS.

Cicero lib. 2. Offic.

Valētudo sustentatur noticia sui corporis,
& obseruatione earum rerum, quae res aut
prodesse soleant, aut obesse, & continentia in vi-
ctu omni, atque cultu corporis tuendi causa, &
praetermittendis voluptatibus, postremo
arte eorum, quorum ad scienti-
am hac pertinent.

APHO-

**APHORISMO-
RVM MEDICINA-
LIVM,**

SECTIO PRIMA.

I.

De Medicinæ præstantia.

MEDICINA diuinitus data 1.
est, nō vt homines à mor-
te, & constituto vitæ ter-
mino omninò liberet; sed
vt corpus à corruptione, & festina dis-
solutione præseruet.

Vt alimēta sanis corporib⁹ agricultu- 2.
ra: sic sanitatē egris Medicina promittit.

II.

De Medico, atque eius officio.

Quæ natura salubriter & probè ope- 3.
ratur, ea Medicum imitari oportet.

Non satis est Medicum suum fecis- 4.

2 *Aphorismorum Medicin.*

se officium, nisi suum quoque egrotus, suum astantes faciant, sintque externa ritè comparata.

5. Oportet ægrotantibus perpetuo, etiam si ipse desperes, salutem polliceri, neque vel deploratos animum deuovere vnquam permittere. Temperatura enim corporis animi affectibus semper cohæret.
6. Decet Medicum ægri consuetudinem cognoscere in sanitate, vt cum res ipsi sano placentes agnouerit, ei illas promittat, cum ab ægritudine correptus fuerit.
7. Nulli Medico, quantumvis docto, credendum, nisi vsu artis perito.
8. Tutius est iis vti, quibus nullus error accidere potest, quàm iis quorum effectus adhuc nobis perspectus non est.
9. Qui quo morbum leuet, nihil prætermittit, & secundū artē omnia gerit, probi Medici officium fecit, etiam si nō omnia semper respondeant. Neque enim orator semper persuadet; tamen vbi, quod artis suæ est, fecerit, oratoris munus

munus expleuit.

Periti & perfecti Medici officium 10.
est, ut iucundè, tutò, ac celeriter curet.
Nimia tamen festinatio sæpenu-
periculosa, & consilio certo contraria
esse solet. Quapropter in mora etiam,
quæ curationis securitatem quandam
præse ferat, nonnunquam peccandum
est.

Prudentis Medici est, eorum corpo- 11.
rum curâ renuere, vnde facilè infamiâ
incurrere potest, ut infantum, prægnâ-
tium, oculorum ægritudinem, & lapi-
lo laborantium.

Discordantium Medicorum turba 12.
ægotantes multos ducit ad interitum.
Mutua verò ipsorum conuenientia
quamplurimos ad sanitatem reducit.

Plus mali à Medico, quàm à morbo 13.
est, si vel imperitia, vel audacia peccet.

Potentum & delicatiorum inobe- 14.
dientia, ac inopum penuria, sæpenu-
mero Medicos à rectè agendis distra-
hunt.

Vnum hoc Medicus rectè agit, quod 15.
rectè

4 *Aphorismorum Medicin.*

rectè cognoscit.

16. Parcitas in laxando, ac in reficiendo liberalitas, duo sunt quæ Medicum sæpè à detractorum calumniis liberum reddunt.

17. In grauissimis periculis, ac rebus propè desperatis, satius est anceps auxilium experiri, quàm nullum.

18. In quibus desperata omninò salus est, imprudentis consilii fuerit, apud vulgus infamare præsidia, quæ multis saluti fuere.

19. Omnis cognitio est per causas, Medicus igitur causarum imperitus, minimè verus Medicus censendus.

20. Prudentis Medici est, insanabiles morbos curandos non suscipere, ne eū qui sorte sua interiturus erat, occidisse existimeretur.

III.

De Ægroto.

21. Præcepta Medicorum spernentes, si
in

Sectio Prima.

5

in morbum aliquem inciderint, non
ob Medicorum culpam: sed suimet er-
rorem languorem suscipiunt.

Bona persuasio egri de Medico plu- 22.
rimum adiuuat, modò non sit stulta, &
ex vulgi opinione pendeat.

Ægrotus Medicum fidelem, & ex- 23.
pertum eligat, & eius opera diu vtatur.

Minus enim hîc errare, quàm nouus
poterit. Æger qui plurimos consulit
Medicos, plerunque in singulorum er-
rorem cadit.

Spes conualescentiæ, ac constans æ- 24.
gritudine de Medico fiducia, plurimum ad sa-
nitatem amissam recuperandam con-
ducunt.

Præstat Medicum adire antequam 25.
morbus inualescat, quàm tunc vocare,
cum naturam prostrauerit ægritudo.

Vt is aquam à vicinis frustra sibi 26.
corrigi petit, cuius tota domus iâ igne
accenditur: ita infirmus à Medicis fru-
stra auxilium petit, cuius virtus à mor-
bo iam prostrata est.

Vt semel admissum intrò hostem 27.

NON

6 *Aphorismorum Medicin.*

non facillè expellas ; ita morbum tua
sponte receptum, non poteris cum vo-
les depellere.

28. Multæ ægritudines sua natura sana-
biles, ægri negligentia & errore, confi-
lia Medicorum saluberrima respuentis,
fiunt incurabiles.

29. Satiùs est morbo ingruenti occurre-
re, quàm inualescēti cum periculo ma-
deri.

IV.

De Sanitate.

30. Cauendum ne in secunda valetudi-
ne aduersæ præludia contemnantur.

31. Sanum æstimandum est corpus, ve-
membrum, cuius actiones sunt sanæ.

32. Sanitatis tuitio magna est, ea, quæ o-
pinione saltem prodesse videntur, reue-
ra nocent, fugere.

33. Tempus obseruandum, neque quæ
in præsentia suauius videntur, dum i-
posterum noceant, suauius ducenda.

34. Cùm vtplurimum animi in corpore
& cor

et corporis in animum redundet infirmitas, sine animo corpus, nec sine corpore animus bene valere potest.

Tria saluberrima: non repleri nimiti, 35.
exerceri absque defatigatione, ac genitale semen continere.

V.

De Consuetudine.

Consuetudo nõ facilè mutanda est. 36.


Cùm natura non sustineat repentinas mutationes, mala consuetudo in posterum nociua, paulatim mutanda est in melius. 37.

Consueta minus lædunt si sensim affuescas, subitæ autem mutationes omnes periculosa. 38.

Consueta longo tempore, etiamsi deteriora sint, insuetis minus molesta solent esse. Quare ad insolita quoque facienda mutatio. 39.

Moderata diuturna sunt. Immoderatis omnibus brevis ætas. 40.

APHO-



APHORISMO
RVM MEDICINA
LIVM,

SECTIO SECVNDA.

I.

De Elementis.

1. Quodlibet Elementum ex primis
qualitatibus duas in se continet, vnam
in summo gradu, & alteram in remissione.
2. Aqua etsi propter sui densitatem in
pso acre extrinsecus corpora magis hu-
meſcet: Aër tamen ab extraneis exic-
cantibus seiunctus, propter sui rarita-
tem intrinsecus magis humeſcat.
3. Omnia minoralia, vegetabilia, & vi-
uentia fiunt ex quatuor elementis, qui-
bus diuersimodè mixtis variæ genera-
torum species hinc inde causantur.
4. Elementorum, ex quibus omnia
fiunt,

nt, mutuo inter se pugnantium con-
tetas, causa est, & principium, & ne-
sitas interitus hominis & cæterorum
entium.

Ex quibus præconstitutū est quod 5.
et, in illa cedit si dissoluatur. Hanc
rem dissoluta corpora in prima ele-
ta redeunt.

II.

De Temperamentis.

Ex mutua actione & passione quali- 6.
um Elementorum, resultat in omni-
vna qualitas secunda, quæ dicitur
plexio.

Qui in corpore, vel ipsis membris a- 7.
i animalium similatur, illius ani-
is mores naturaliter sequitur. Ob
asos aquilinos habentes, prædato-
& magnanimos: Habentes verò
inos, latratores & inuidos sæpè vi-
nus.

Aquilæ & Lynces, quanquam visu 8.
nines præcellant, Vultures & Canes
oratu, Talpæ & Apri auditu, Araneæ
tactu,

10 *Aphorismorum Medicin.*

tactu, & gustu Simiæ: nihilominus
men perfectiores sunt operationes
corpore humano, eoque temperato
quod corpus ipsum finaliter ordi-
tur, quàm in prædictis animalibus, c-
poribusque distemperatis.

9. Regionum, ætatis, & regiminis
uersitas, in hominibus variam arg-
complexionem. Ad aëris igitur, re-
minis, ac ætatis, naturam hominis, m-
res, & corpus sæpè mutari verifimile

10. Cùm calidi sit dilatare, ac frig-
constringere; cuius venæ amplæ er-
naturæ calidæ, cuius verò strictæ, fr-
dæ esse rationi consentaneum est.

11. Atram bilem exuperantem sequi-
fatuitas, animi demissio, & sine ratio-
tristitia.

12. Pilorum in capite multitudo,
nigredo ipsorum, complexionis in-
arguit caliditatem. Ipsius autem ca-
ties, siccitatem designat.

Ho

Sectio Secunda.

II

Homo ut primo die est calidissimus: 13.
novissimo est frigidissimus.

III.

De Saporibus.

Dulce plus omni alio sapore huma- 14.
æ complexioni vicinius existit, atque
longè cæteris digestionem iuvat, &
corpora nutrit.

Amarum omnis animalibus, & plā- 15.
is inimicatur, incidit, abstergit, resol-
vit, & præservat à putrefactione, hac de
re non ut cibo; sed ut medicina amaris
utendum est.

Salsus sapor dissolvit, subtiliat, ag- 16.
gregat, calefacit, mordicat, exiccatque
humiditates, & putredines prohibet.

Res acutæ corporibus humanis præ 17.
cæteris saporibus aduersantur. Corro-
dunt enim, incendunt, nec modò os
stomachi lædunt; sed etiam totum cor-
pus. Pituitosis tamen medicinæ gratia
interdum conueniunt.

Unctuosæ stomachum mollificant, 18.
pituitam

12 *Aphorismorum Medicin.*

pituitam adaugent, oppilant, hebetem cogitationem reddunt, somnum prouocant, & satietatem plus æquo afferunt.

19. Insipida incrassant, infrigidant, aggregant, & oppilant.

20. Acetosa infrigidant, desiccant, incidunt, subtiliant, penetrant, aperiunt, abstergunt, & mundificant. Membris nocent neruosis, seniumq; accelerant, ac stomachum ac intestina, si munda fuerint, constringunt.

21. Aceti & acetosorum vsus improbat, ubi adest siccitas aliqua, aut dolor, aut vigiliæ, aut inflammatio, aut vlcus.

22. Styptica infrigidant, desiccant, crebro vsu stomachum roborant, aluum constringunt, & meatus coarctant.

23. Mulieribus longè magis, quàm viris aduersatur acetum, vtpote, quod vterum dolore cruciet.

IIII.

De Humoribus.

24. Vt Sol ex eodem solo, eodemque tempore

tempore varia producit vegetabilia: sic
natiuus calor iecoris ex massa chymo-
sa, propter partium ipsius dissimilitudi-
nem diuersos gignit humores.

Humorum puritas homines hila- 25.
riores reddit, ipsorum autem crassities
atque turbulentia tristiores, melancho-
licosque facit.

Quales sunt corporis exteriores co- 26.
lores tales sunt humores, exuperantes
ad intra.

V.

*De Membris siue partibus
Corporis.*

Quælibet corporis pars quatuor in 27.
se habet naturales virtutes: attractiuã,
retentiuam, digestiuam, & excretiuam.

Vt magneti vis inest à natura, qua 28.
ferrum trahere potest: sic quælibet a-
nimalis particula suum ad se natura
trahit alimentum, attractum retinet,
retentum in suam transmutat substan-
C tiam,

14 *Aphorismorum Medicin.*

tiam, & superfluum expellit, indeque totum corpus suum capit incrementum.

29. Principium sensus & motus cerebrum est, Cor vitæ, iecur nutritionis, & seminaria vasa generationis.

30. Arteriarum, spirituumque origo cor est, venarum iecur, neruorum verò & medullæ spinæ dorsi cerebrum.

31. Vt nerui à cerebro & nucha oriuntur: sic chordæ à musculis, & ligamenta ab ossibus originem suam ducunt.

32. Vt in ventriculo cordis dextro vitalis sanguis resultat, & in sinistro spiritus: ita in anteriori cerebri cellula sensus communis & phantasia vigent, in media autem ratio, & in posteriori memoria, vt Arabes tradiderunt.

33. Iecur ex ventriculo per mesenterii venas, veluti arbores è terra per radices, cibum siue succum ad se trahit.

34. Quibus cutis mollis & rara est, ab extrinsecis ingruentibus malis facile læduntur. Quibus verò dura densaque ab internis citius: Ob id raritas
corpo-

Seçtio Secunda.

15

corporis iis, quibus plurimum ex alimento per transpiracula aufertur, salubrior; quibus verò minus, insalubrior.

Omnia ossa, solis dentibus exceptis, 35. medullam habent.

VI.

De Calido innato, & humido radicali.

Natiua caliditas humido moderato 36. gaudet.

Natiuo calore corpora hyeme sunt 37. calidiora, & extraneo frigidiora, Æstate autem acquisito calidiora, & innato frigidiora.

Corpora rariora, quantò velocioré 38. suscipiunt impressionem: tãtò velocius calefiunt atque frigescunt, & contra.

Vt à lucernæ elychnio oleo made- 39. facto ipsius flamma nutritur: sic cor similitudinis ratione elychnio haud dissimile sanguine olei officio fungente calorem fouet vitalem.

C 2

Quem-

40. Quemadmodum oleo humidoque elychonii igne cōsumptis lucernæ flammam extinguere necesse est; sic humido radicali à nativo calore exhausto aura vitalis à corde illicò discedit.
41. Ut lucernæ flamma ebibit continuo id, quod sibi infunditur, ut seipsam cōseruet; sic calor naturalis, qui in nobis est, nativum humorem consumit incessanter, quo prorsus resolutò, accedit mors naturalis.
42. Ut variis casibus lucernæ flammam extinguere sæpenuerò contingit; sic in multis ante statutam à natura periodum diversis accidentibus spiritus evanescit.
43. Virtus vitalis à corde per arterias in totum corpus effluens, omnia membra vegetat. Naturalis à iecore per venas in omnes corporis partes diffusa, integrum corpus nutrit. Animalis verò per nervos in omnem corporis sedem erumpens uniuersa ipsius organa mouet, ac sensitiua reddit.
44. In confesso est omnibus Medicis ratio-

rationalem animæ vim in cerebro fixam esse, vitalem atque irascibilem in corde, concupiscibilem verò in iecore.

Humidum nativum, membris radicalibus imbibitum, in quo vita vehitur, restaurari non potest: sed per appositionem humidi nutrimentalis impediri, ne citius, quam oportet, consumatur. 45.

VII.

De Virtutibus seu Facultatibus.

Quibus qualitatibus naturales virtutes operantur, iisdem aut sibi similibus servantur aut roborantur. 46.

VIII.

De Functionibus seu Operationibus.

Sensorium tactus crassius sensorio gustus est, gustus verò crassius visificus. Visus autem auditu crassius. Auditus 47.

C 3 cate-

18 *Aphorismorum Medicin.*

cætera tenuitate præcellit. Olfaciendi
verò illorum quatuor in crassitudine
occupat medium.

48. Sensus visus splendorem sentit &
lumen, Auditus aerem, Olfactus fu-
mum, Gustus substantiam humidam,
Tactus verò duram.

49. Talis est hominis sensus, qualis est
spiritus. Spiritus autem talis, qualis est
ipsius sanguis.

IX.

*De generatione fœtus, & se-
mine humano.*

50. Cùm animantium genus in indiui-
duo conseruari nō posset, vnumquod-
que sibi simile, vt in specie conseruare-
tur, generare necesse habuit.

51. Sicut ad annum vsque sexagesimum
quintum vir generare potest: sic qua-
dragesimus quintus fœminis vt pluri-
mum finis est concipiendi.

52. Qui humidiores natura sunt, & plus
albi, quàm fusci, & non valdè corpu-
lenti,

lenti, seminis plus aliis habent. Nec se-
cus quò ad menses, fit etiam in fœmi-
nis.

Si genitale semen ex dextro teste, in 53.
cellulâ matricis dextram decidat, ma-
sculus inde gignitur: si verò à sinistro in
sinistram emanauit, tunc fœmella ge-
neratur.

Si semen testis dextri in sinistram 54.
ceciderit cellulam, formatur inde vira-
go. At si sinistri in dextram effluat, na-
scitur effœminatus. In medium inter-
stitium vtriusque sexus formatur her-
maphroditus.

Masculi semen formam præbet, & 55.
motus principium, fœminæ verò cor-
pus dat simul & materiam fœtus.

Quoniam ex sanguine semen geni- 56.
tale proficiscitur, animalia pingua sæ-
pius sterilia sunt. Nam mutatur in adi-
pem & seuum, quod debet in sangui-
nem mutari.

A quo semen copiosius decidit, fœ- 57.
tus ille assimilatur. Nam præualet è se-
minibus duobus, quod potētius & acti-

20 *Aphorismorum Medicin.*

uius fuerit. Si ambo æqua fuerint, figurarum fit mixtio, & sobolis æqualitas.

58. Quibus patres & aui in sua generatione iuuenes fuerunt, membra illis principalia fortiora sunt. Contrariis verò accidunt contraria.

59. Mulieres supra dextrum latus dormire consuetæ, rarò pariunt fœminam.

60. Viri semen ad menstruum se habet, veluti artifex ad suum artificium, & ad lac coagulum.

61. A quo semen decidit, in se gerit vim illius, unde primum decisum est. Hac de re cholericus gignit cholicum, in cæterisque similiter.

62. Quemadmodum semen plantæ, ut inde gignatur herba, terræ copulari necesse est: sic etiam semen viri, ut fœtus inde gignatur, matrici insinuari debet. Nam quale in plantis terra, tale in animalibus ipsa matrix est.

63. Conglobatus in vtero situatur fœtus, habens nasum inter genua, oculos supra illa, pugnis intermediis, & aures extra ipsa; talis natibus admotis.

A ge-

A genitali semine in matrice corru- 64.
pto nocumenta nocumentis retento-
rum menstruorum accidunt deteriora.

Sperma corruptum, plus æquo in 65.
homine retentum, in venenum con-
uertitur, nec solum spermatica vasa
inficit: sed etiam totum corpus.

Vt virile semen ex rubro sanguine 66.
ac puriori genitum, in seminalibus va-
sis alba eorum substantia albescit: sic
sanguinem etiam in vberibus conten-
tum, in iisdem dealbari contingit. Nam
quodlibet contentum colorem conti-
nentis suscipit, & ad ipsum declinat &
vergit.

Sobolem cupientibus sternutatio il- 67.
licò post coitum, ne semen prius, quàm
paternus humor penetralibus matricis
se se insinuauit, expellatur, cauenda est.

Decimus a conceptu dies dolore 68.
gravidas admonet. Inde capitis inquie-
tudo incipit, & caligine Visus inhebe-
scit. Cibi quoque fastidium vt pluri-
mum his accidere solet.

Si corpusculum in marem figura- 69.
tur,

C 5

tur,

22 *Aphorismorum Medicin.*

tur, melior est grauidis color, & vteri pronior eminentia: Concepta autem fœmina vultus pallore inficitur, ac crura quoque languidiora redduntur.

70. Si falsos cibos frequenter edat grauida, fœtum vnguibus carere comperum est.

71. Calida testiculorum crasis maximè Venerea est, & marium generatrix. Frigida verò contrarium operatur.

72. Si nidor fœminarū naturalibus subditus ori respondet, fœcunditatis nota est.

73. Intentiones rerum conspectarum tempore generationis, efficaces in genitis relinquunt impressiones.

X.

De Coitu.

74. Ut sint ortus animantium perpetui, in causa est naturalis voluptas, quæ facit vt animantes ad coitum ardentius excitentur.

75. Cuiuslibet animalis prima seminis
emis-

emissio infœcunda est, aut si fœcundetur fœtum imbecillum gignet.

Cùm humoribus deorsum ductis, 76.
superiora siccari necesse sit: eorum qui
nimis concumbunt, oculos, cœterasque
partes superiores non parùm ematiari
mirum non est.

Moderatus coitus repletum corpus 77.
alleuiat, hilarẽ animum facit, iram mi-
tigat, tollit varias imaginationes, & à
multis malis præseruat affectibus.

Immoderatus verò coitus neruis 78.
nocet, oculis, stomachoque plurimùm,
aluũ insuper siccatur & infrigidatur, hec-
ticum corpus reddit, viresque eius pro-
sternit, & senectutem accelerat.

Frequens & nimius coitus masculi- 79.
no sexui magis, quàm fœmineo nocet.
In hoc enim masculi plus, quàm fœmi-
næ laborant.

Hyeme & vere plus, quàm cæteris tẽ- 80.
poribus permittitur coitus. In æstate p-
hibitus est, & in autumno detestatur.

Repletis & inanitis, aut quouis mo- 81.
do superfluè vacuatis, siue exercitatis,


C

6

coitus

coitus aduersatur. Repletis tamen & calefactis minus, quàm inanitis, aut frigefactis nocet.

32. A pastu repleti illicò cocuntes, siue etiam erectè, podagricas passiones incurrunt, aliosque multos membrorum dolores & passiones.
33. Cùm menstruatis coeuntes ob inferti spiritus aspirationem, raucedini, canero,ve, aut lepræ se exponunt.
34. Concubitus neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus excitat corpus, frequens soluit.
35. Hyeme Venus non perniciofa, Verutissima. Autumno tolerabilior, quàm æstate, in qua in totum, si fieri potest, ab ea abstinendum est.
36. Quibus venæ secundùm aures secantur, coeunt quidem, ac semen emittunt: sed id minimè fœcundum est.



APHORISMO- RVM MEDICINA- LIVM,

SECTIO TERTIA.

I.

De Aëre.

Lucus nimis & calidus aër, rela-
xat corpus, frigidus & obscurus
constringit. Temperatus verò oble-
stat, mulcet & temperat. 1.

Sole exorto & aëre claro synceroq; 2.
existente cubiculi fenestras aperito, vt
aër crassus, impurus. & fætido ægri, seu
hominum halitu infectus, sic emitta-
tur, expellaturque, & aër clarus purus-
que recipiatur, admittaturque, vt sic
aër cubiculi crassus à Solis radiis atte-
nuetur, euentetur, renoueturque & ne
maneat suffocatus.

Aër putridus inspiratus, sæpe est 3.

C 7 causa

26 *Aphorismorum Medicin.*

causa putrefactionis humorum in corde, etiamsi nulla prohibita adsit transpiratio, euentatioque. Solo enim contactu humores hic corrumpuntur. Quicquid enim à putrido tangitur, putrefit.

4. In omni regione venti, qui nubes cogunt, rheumatismos in hominibus gignunt, & sensus aggrauant.

5. Ex tempestatibus optimæ æquales sunt, siue frigida, siue calida. Pessimæ, quæ variant maximè, quò fit, vt Autūnus plurimos opprimat.

II.

De partibus anni.

6. Saluberrimum Ver est, deinde ab hoc hyems, Periculosior æstas, Autūnus longè periculosissimus.

III.

De Motu & Quiete.

7. Ignauia corpus hebetat, Labor autē firmat. Illa naturam senescētem; hic lōgam

gam adoleſcentiam facit.

Motus omnis calefacit corpora, 8.
contra verò quies refrigerat. Hæc cali-
dis, illa frigidis naturis ex vſu eſt.

Quoquo modo corpus moueatur, 9.
ſimul ac laborare cœpit, quies ſtatim
laſſitudinem leuat.

Geltatio longis & inclinatis malis 10.
aptiſſima eſt, & iis corporibus, quæ iam
ex toto febre carent, ſed adhuc exerce-
ri non poſſunt, & his quibus lentę mor-
borum reliquię remanent neque aliter
eliduntur.

IIII.

De Exercitio.

Quotidianis laboribus aſſueti, etiãſi 11.
inualidi ſint, aut ſenes, inſuetis, quam-
uis robustis & iuuenibus facilius con-
ſueti ferunt exercitia.

Ex calore ſudantibus, fatigatis ab i- 12.
tinere, & à balneo exeuntibus, potio
frigida eſt pernicioſiſſima.

Potentes ante cibum exerceri, diætã 13.
certa non egent; qui verò prohiben-
tur

28 *Aphorismorum Medicin.*

tur propter multa negotia, non modò
certa diata; sed etiam pharmacorum
sanatiuorum usu.

14. Sicuti exercitium ante cibum factū
custodit & conseruat sanitatem: ita
post cibum quilibet fortis motus huic
perniciosissimus est.

15. Debile debilibus, & forte fortibus
conuenit exercitium. Relictis tamen
extremis medium in omnibus eligen-
dum est.

16. Crassis cibis utentibus aut multis,
fortia conueniunt exercitia. Debilia
subtilibus & modicis, & mediocri me-
diocribus, eiectis prius naturæ cōmu-
nibus excrementis.

17. Quemadmodum aqua mota non
putrescit, & quæta facile corrumpitur:
sic exercitata corpora non putrescunt.
Otiosa autem à paruis læduntur causis,
& morbis obnoxia fiunt. Hac de re sa-
nitas exercitio perficitur, otio autem
seu quiete languet.

18. Sanitatem custodire volenti ante
pastum moueri necesse est. Exercitia
enim

enim ad digerendum, & ad sanitatem
tuendam conferunt.

Corpora exercitata in exercitatis sa- 19.
niora, & firmitiora sunt, nulloque indi-
gent pharmaco, vel phlebotomia.

Quemadmodum repletis & impu- 20.
ris corporibus exercitium laboriosum
prohibetur: similiter inanitis aduersa-
tur & gracilibus.

Per hyemem celeriter ambulandum, 21.
æstate conquiescendum est, aut non in
sole ambulandum.

Fortissimæ exercitationis finis est
frequens & spissa respiratio.

Exercitia fortia ante cibum, fames, 23.
sitis, durities stramentorum, vigiliæ, so-
licitudines, & tenuis diæta concurrens,
cum balneo thermarum, corpora ni-
mis crassa celeriter amaciare solent.

V.

De Somno & Vigilia.

Somnus & vigilia, si modum exces- 24.
serint, malum.

Somnus

30 *Aphorismorum Medicin.*

25. Somnus fortis omnes euacuationes cohibet, præterquàm sudorem.
26. Somnifera, vbi inmodicè somnum prouocant, naribus spongiam in aceto madefactam admoneto.
27. In somno alborum visio frequens phlegma superabundans denotat: Nigrorum Melancholiam: Igneorum aut citrinorum choleram, & rubrorum sanguinem.
28. Corporis dispositiones nobis indicat somnium: Ignem enim accensum quis videns in somniis, cholera molestat: si verò humum caliginemue aut profundas viderit tenebras, atra bile affligitur. Pluuia autem visa, frigidam designat excrecere humiditatem. Nix autem & glacies, siue pruina, frigidum phlegma denotant. Tempus tamen in talibus, & etiam diætam assuetam notare decet.
29. Qui in sordibus, aut infimo versari somno se existimant, prauis, fœtidis, ac putridis chymis abundant, aut stercore multo. Sed qui se in locis redolentibus volu-

voluptuari putāt, ii contrarium prædi-
ctis habent dispositionem.

Decubitus in dextro latere factus, 30.
cæteris longè præstat modis. Ventricu-
lus enim sic recalescit citiùs, cōcoquit-
que celeriùs, & locum flatibus liberio-
rem reddit.

Pessimum est, si somnus neque no- 31.
ctu, neque interdium accedit: Id enim si-
ne continuo dolore esse non potest.
Æquè verò signum malum est, somno
ultra debitum vrgeri, peiusque quò
magis interdium sopor vrget.

Somnus superfluous, & vigiliæ nimie, 32.
caput & memoriam valdè lædunt.

Propter vigiliam conuulsio, aut de- 33.
sipientia malum.

Si lucubrandum est, nō post cibum, 34.
sed post concoctionē id facere oportet.

Immodicis vigiliis tussis intercedēs, 35.
mortifera est.

VI.

Derepletionē & inanitionē.

Corporis plethora sanguinis de- 36.
tractio-

32 *Aphorismorum Medicin.*

tractione, balneis, amplioribus exercitiis, ieiunis, ac frictionibus curatur: Caco-chymia verò, propria vniuscuiusque superabundantium humorum solutione. Quoniam dyscrasia semper indiget suis contrariis.

37. Vt ex multa fame nimia saturitas, & ex multa saturitate fames damnatur: Sic ex nimio labore subitum otium, & ex nimio otio subitus labor sine periculo non est.

38. Si quis longo tempore, neque per vomitum, neque per aluum euacuatus fuerit, & subita aliqua horum ingruit euacuatio, cunctanter sistas.

39. Calidis aridisque complexionibus, natura vel accidente, haud parum officit ieiunium.

40. Ieiunium senes decrepiti ferunt facillimè: secundum hos, qui constantem ætatem agunt, minus adolescentes, minimè omnium pueri, atque inter eos maximè, qui acriore sunt, & viuidiore ingenio præditi.

41. Non saturitas, non fames, nec aliud quic-

quicquam, quod naturæ modum excesserit, bonum.

Inediæ quantum profunt ad morbi 42.
curationem: tantum vel amplius viri-
bus officiunt. Cibi verò quantum æ-
groti robur adaugent, tantum materiæ
peccantis coctionem impediunt.

Fame dominante ab omni agitatio- 43.
ne vacandum & labore.

Famem thorexis soluit.

44.

Corporibus humida carne præditis 45.
perferenda fames est. Nam fames sic-
cat corpora.

VII.

De Phlebotomia.

Præseruationis, minorationis, alle- 46.
uiationis, diuersionis, alterationis, de-
oppilationis, attractionis, euētationis,
purgationis, & eradicationis gratia
phlebotomia fieri potest.

Ipsa morbi magnitudo præsens, & 47.
robur laborantis, cū chymorū coctione
legitimè approbāt fieri phlebotomiā.

Larga

34 *Aphorismorum Medicinæ.*

48. Larga sanguinis detractio humores mali deteriores fiunt.
49. Humoribus omnibus vitiatis male sanguis detrahitur.
50. Quoniam phlebotomia ad diuersum trahens naturam retinet, aluo siccata sanguinem mittere non licet, nisi prius clysteribus pinguibus mollibusque aut suppositoriis ventrem solueris.
51. Post longos morbos, aut à crapula, sanguinis missio cauenda.
52. Plena crudis humoribus, prægnans, & menstruata, nisi maxima urgeat necessitas, non debent phlebotomari.
53. In tribus primis mensibus prægnans venæsectionem facilius sustinet. Quarto autem, quinto, aut sexto pharmacum tutius.
54. Boni sanguinis paucitas cum multis malis succis renuit phlebotomiam.
55. Ventriculo debili, vel aluo adstricta sanguinem mittere noxium.
56. Post sanguinis missionem cibo modico vtendum.

Ne

Sectio Tertia.

35

Ne cholera, aliusue humor ad stomachum repens syncopen inducat, 57.
buccellâ panis vino, succoque granatorum aut alio iure acerbo infusa, priusquàm phlebotomes, debitè ministratur.

Permittente virtute, dum te cogit necessitas, omni tempore, & hora, siue 58.) dies sit, siue nox, phlebotomare conuenit.

Crapula, nausea, coitus, calor ingens, albor, dolor, balneum, infantia, 59.
senectus, chronicus morbus, stomachi fastidium, eiusque debilitas, aetaturæ frigiditas, vel corporis siccitas, venam aperiri regulariter prohibet.

Resupinus decubitus in venarum sectione ægri virtutem conseruat, & à 60. syncope prohibet.

In febrium ingenti feruore, & iis quibus spasmus accidit, & in die 61. motus morbi, vena secari non debet.

Multo-

36 *Aphorismorum Medicin.*

62. Multoties in autumnno sanguinem minuentibus, accidit sæpè visus obscuritas, & aliquando cæcitas.
63. Sectio venarum crurum retētas provocat mariscas, fluentes autem epatocarum incisio retinet, menstrua persimili sæpè cura sanantur.
64. Forti morbo existēte, vel etiam molestissimo, cum virtutis ægroti robore indubiè facimus phlebotomiam, citra tamen hanc intentionem sunt infantes & pueri.
65. Humorū multitudo, & morbi malitia, sanguinis missionem expetunt.
66. Difficile transpirabile corpus, aut ex multitudine succorum febriens, sanguinis indiget detractiōe.
67. Ars tota rectè exercendæ phlebotomiæ, vel quancunque aliam operationem circa corpus, in duabus generalissimis considerationibus atq; principiis consistit: quarum prima est necessitatis & possibilitatis, secunda verò operis & modi operandi.
68. Venæ manuum, crurum, pedumq; & ca-

& capitis, (illa dempta quæ sub mento est) post partum sunt aperiendæ. Brachiorum verò ante ipsum debent aperiri.

Venam incidere multoties in anno, 69. non videtur idoneum. Simul enim cum sanguine de vitali spiritu non parum euacuatur, quo quidem euacuato tota corporis moles infrigidatur.

A venarum inanitione ad pharmacias notabiles, aut contrà, ante triduum transire periculosum est. 70.

Cum ex vena incisa sanguis erumpit, colorem eius, habitumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus existit, ideoque vtiliter effunditur. Si rubet integer est, eaque missio non prodest, ut etiam non noceat, propterea is supprimendus est. 71.

Mulier utero gerens sanguine misso 72. ex vena abortit, & magis si fœtus sit maior.

Qui in iuuentute plurimum sanguinem per phlebotomiam eiicere sunt consueti, eorum natura post sexagesimum annum in frigus resolvitur, & suffoca-

D

foca-

38 *Aphorismorum Medicin.*

focatur in eis naturalis calor, maximè
verò si frigida fuerint complexionis.

74. Post fortè euacuationē phlebotomia
nō sequatur, nisi tribus exactis diebus.

75. Quemadmodum sub cane, & quo-
libet tempore, aut extremè calido, aut
frigido, sanguinem mittere non con-
uenit; ita nec pharmaca dare.

76. Quibus vna die bis sanguis mitten-
das, si viribus valeant, primò copiosius,
parcius secundariò fundatur.

77. Quibus stomachus fuerit cacochy-
micus, eorum ventriculum ante phle-
botomiam præmundari, eiusq; os cor-
roborari oportet.

78. Luna vetus veteres, iuuenes noua
luna requirit. Senes vocantur, qui su-
pra quadraginta sunt annos, iis poste-
riores quadræ Lunares conueniunt.

79. In tertiana non debet fieri phlebo-
tomia, nisi post tertiam, vel quartam
accessionem, vt sit facta separatio mali-
gni à benigno.

80. Quinquagenariis, licet non conue-
niat phlebotomia, scilicet ratione con-
fer-

seruationis sanitatis: tamen in necessitate & ægritudine imminente non est prætermittenda.

In febricitante cholericò non est extrahendum multum de sanguine vna vice, quia exasperat magis cholera. Humiditas enim sanguinis frenum cholerae est. Secus in aliis benè habituatìs, vel phlegmaticis.

Præposterè faciunt, qui immodicas, atq; vehementes purgationes præmittunt phlebotomiæ. Levis enim euacuatio, non fortis, conuenit.

Quibus sanguinem è venis detrahere conducit, iis vere secanda est vena.

Venæ sectionem impediunt, impregnatione, ætas, virtutis debilitas, & ventris constipatio.

Sectio venæ frontis dolorem capitis chronicum extirpat. Antequam autem hæc secetur, collum prius vinculo arctè constringatur. Sic enim vena frontis manifestius apparet.

In Paralyfi si adest plenitudo, secetur vena in latere incolumiori, & sit

D 2

mode-

moderata phlebotomia, ne corpus immodicè refrigeretur. In parte verò paralytica nequaquam ipsa conducit venæ sectio.

87. In capitis affectibus, quando adest plethora, aut vbi sanguis in toto exuperat, tùm principio secetur vena mediana dicta, seu saphena, si menses nō eunt, eius partis in qua dolor potissimūm exercet, postea cephalica aperiatur, vel huius loco ea, quæ est inter pollicem & indicem. Post tres vel quatuor dies, si dolor adhuc sæuit, vena frontis secanda est, vel scarificandæ sunt cartilagine aurium, vel cucurbitulæ in humeris affigendæ.

88. Quantitas sanguinis, is qui extrahitur, sit secundum quantitatem repletionis & virtutis.

89. In febribus continuis venā hora diei frigidiori, hoc est, in aurora tūdes. In intermittentibus verò vena est secāda, & medicandum tempore intermissionis.

90. Quando color corporis malus est, phlebotomiæ vsus improbatur.

Cūm

Cum venam secas pulsum tangito, 91.
& quando deficere, vel tremulus fieri
incipit, tum supprimatur, & statim buc-
cellam panis torrefacti optimo vino
maceratam, vel in vino granatorum,
aut syrupo de agresta, vel mrua citonio-
rum infusam, offeras.

A secta vena non statim cibus suma- 92.
tur, donec hora transiit, ne corpus cru-
dis humoribus repleatur. Statim etiam
requiescat, vt humores moti quietio-
res reddantur, & arceatur à somno, ne
sanguis ad interiora abeat, decurratq;.

Si quid venæ sectionem inhibet, vi- 93.
mur eius loco cucurbitulis.

Quorum stomachus ac epar frigida 94.
intemperie laborant, phlebotomandi
non sunt.

In corporibus quæ prolixas perpessa 95.
sunt ægritudines, cauendum est à phle-
botomia.

Alio constipata nunquam fiat phle- 96.
botomia, neque etiam in die, in qua
natura se morbo opponit, hoc est, in die
aliquo critico.

42 *Aphorismorum Medicin.*

97. In reuulsionibus, vt in sputo sanguinis, hæmorrhagia narium, sic in phreneticis & furiētibus, angustissimam incisionē facere oportet, ob duas causas; & vt solūmodò subtilis euacuetur sanguis, & crassus in corpore relinquatur; & vt vulnus celerius conglutinetur.
98. A venæsectione ne apostema aboriat, brachiū eleuetur, & capiti imponatur. Si verò in pede secta est vena, tū etiā pes altius gestetur, supinusq; sedeat.
99. In tribus casibus venam secamus etiā si nulla sanguinis copia adsit, vt in vehementissimis doloribus; veluti in ileo, vbi dolor est intensus, secatur vena ne accidat apostema, propter attractionis vim, quæ in dolore est. In ictu seu casu ex alto, vt materia affluens sic reuellatur; & in adurentibus febribus vt totum corpus refrigeretur.
100. Quādo à secta vena aliquo in loco dolor eueniat, venæsectio repetēda est, ne ob motos humores apostema oboriat.
101. In morbis ex plenitudine ortis, venæsectio posthabenda est, quando menses,

tes, aut hæmorrhoides fluunt.

Vena non est aperienda, dum crudi- 102.
tas in stomacho adest.

Reconualescentibus vena nō est se- 103.
cāda, quia parū habent boni sanguinis.

Si virtus est robusta, & necessitas vr- 104.
geat, etiam septuagenariis venā incides.

Si gutta sanguinis in aquam proiecta 105.
fundum petit, tūm sanguis crassus esse
censetur. Si verò supernatat, aut diffun-
ditur, cēsetur esse aquosus. Si autē me-
dio modo se habet, bon⁹ esse iudicatur.

Magnum fiat foramen in tribus casti- 106.
bus: primò quādo crassi humores exu-
perāt, deinde tēpore frigido, vt in hye-
me: & tertiò ppter humoris copiam.

Vena non est secanda ebriosis, qui- 107.
bus stomachus est repletus cibo & po-
tu, crudis humoribus abundantibus, à
coitu, à balneo, à vehementi exercitio,
in fine chronicorum morborum, id est,
in reconualescentibus, labore defati-
gatis, vt fabris & balneatoribus, & tem-
pore calidissimo, & frigidissimo.

Àëre existente nebuloso & turbido 108.

D 4 vena

44 *Aphorismorum Medicin.*

vena non est aperienda, ne aër subintrans sanguinem inficiat. Ideò eligatur aer clarus, purus, & luminosus.

109. Cephalica substratam habet arteriam, & neruum nullum, ideò minus est periculi si secatur. Mediana neruum. Epatica verò arteriam magnam, ideò cautè agendum.

110. Neruum vulneratum esse, inde cōstat, quia adest plerumque spasmus, paralyſis seu stupor, dolor intensus, febris delirium, vigiliæ sitis. Arteriam verò, quia sanguis prorumpens cum saltu exit, estque valdè calidus, tenuis & rubeus seu flauus.

111. Venarum pedis, vt saphenæ, sciaticæ, & harum vicariarū, phlebotomia plus debilitat, quàm reliquarum, quia longius à corde auertunt calorem & spiritum, quàm reliquæ venæ. Ideò communiter has venas secamus à prandio, quia tunc virtus est fortior, & tunc humores magis mouëtur ad extrema corporis, & venas minores.

112. Antequam vena secetur, aluus & vesica

vesica prius exoneranda sunt.

In Autumno & principio hyemis se- 113.
camus venas sinistri lateris, ob melan-
choliā, & humores adustos in liene
coaceruatos.

Quibus color corporis albidior, 114.
quā pro naturali habitu est, aut qui-
bus plumbeus est, sic qui valde obesi
sunt, & præpingues, item qui senes, his
vena temerè secanda non est.

In corporibus obesīs cautè est secā- 115.
da vena, quia sanguine nō abundant. In
gracilib⁹ verò audacius venā secamus.

Quibus corpus gracile est, & venas 116.
habent amplas, iis sanguinem demas v-
berius. Quibus verò candidum & mol-
le, & venas exiles habent, iis parcius.

In acutis affectibus sanguinem de- 117.
trahe, si vehemens videatur morbus, e-
grotus ætate floreat, roburque illi adsit.

Sanguis nō effluit, aut ob copiam e- 118.
ius, hīc bonū est tussire, screeare aut sca-
pulas pulsare: aut sanguinis crassitiē &
paucitatem, aut timorē & pusillanimitatem,
aut demum foraminis paruitatē.

D 5

A ve-

46 *Aphorismorum Medicin.*

119. A vena secta detestatur omnis motus, & crapula: Sic etiam coitus.

120. Sanguinis missionem immoderatā, sequuntur hæc incommoda; scilicet: aut syncope ob virium exolutionem, aut faciei decoloratio & cachexia, aut difficultas spirandi seu orthopnæa, languida cibi concoctio, appetitus prostratus, & pedum totiusque corporis tumor.

121. In morbo recenti vena secatur in latere opposito: In inueterato verò in latere affecto.

122. In principio vena tundatur in parte contraria: In statu verò ac fine, in parte affecta.

VIII.

De Ventosis.

123. Cucurbitula materiā euacuare, doloremq; mitigare, quotidiano usu cōperta est à peritis, ventositates item carminare retentas, prostratum appetitum reuocare, imbecillem quoque stomachum roborare, & quæ in profundo sunt rheumata trahere posse, hæmorrhagias

rhagias prohibere, menses muliebres
ciere retentos, & nimium fluidos com-
pescere.

Fronti admotæ cucurbitulæ, phle- 124.
botomiæ Cephalicæ vicem gerunt. In-
ter scapulas autem, & ad cubitum, me-
dianæ; supra renes verò, basilicæ.

Colicum affectū, vomitumq; & sin- 125.
gultum compescunt affectæ particulæ,
cucurbitulæ superimpositæ. His etiā v-
terus, intestinaq; & ossa, decēter appli-
catis, ad sedes reducuntur. Vretorum
meatus dilatāt renibus adhibitæ, exin-
deq; calculos educūt. Auribus quoque
& fistularum orificio appositæ, saniem
è profundo attrahunt. Collo applicitæ,
respirationis viam amplificant: Angina
igitur læsis subsidio sunt.

Cucurbitula vbi inhæsit, si concisa 136.
ante scalpello cutis est, sanguinem; si
integra est, spiritum extrahit. Ergo vbi
materia, quæ intus est, lædit illo modo,
vbi inflatio, hoc imponi solet.

Cucurbitulæ, vt auxilium minus ve- 137.
hemēs, ita magis tutum, neq; vnquam
D 6 peri-

48 *Aphorismorum Medicin.*

periculosum, etiamsi in medio febris impetu, inque cruditate adhibeantur.

138. Potiores ac vehementiores iudicantur, quæ cum igne applicantur, quàm quæ suctione.

139. Cuticulæ incisio, tantò profundior esse debet, quantò crassior est ipsa cutis, sanguisque ipse euacuandus profundius delitescit.

140. Cucurbitulas affigere occipiti, oblivionem inducit. Sic scapulis affixæ, tremorem cordis pariunt, nisi tremor ob copiam sanguinis ortus est.

141. Mulieribus albi coloris, ac rari habitus, magis expedit cucurbitularum supra crura appositio, quàm saphenæ incisio.

142. Cucurbitulæ affixæ cruribus, sanguinem mundificant, & menses euocant.

143. Cucurbitulæ nonnunquam affiguntur, ut membrum frigidum calefiat, ut in paralyti, vel ut flatus dissipentur, ut in colica.

144. Nervorum origini cucurbitulæ suprapo-

prapositæ, ipsos calefaciunt, ob id curant paralyticos.

Cucurbitularum vsus in prapingui- 145.
bus detestatur.

In Melancholicis affectibus vsus 136.
cucurbitularum improbatur cum scarificatione. Sic enim subtilis extrahitur sanguis, crassus in corpore relinquitur.

IX.

De sanguisugis.

A profundiori sede attrahunt hiru- 137.
dines, crassioresque succos. Cucurbitulæ à proximiori, & subtiliores.

Sanguisugæ antequam affigantur, 138.
locus prius fricetur, vt rubescat, aut foueatur aqua calida, donec rubescat locus, postea illinatur sanguine recenti, vt adhæreant. Eligantur autem quæ non in lutosiis & turbidis aquis degunt.

Si vis vt sanguisugæ decidant rursus, 139.
aspergatur sal, aut cinis, aut calx. Si verò, posteaquam deciderint, sanguis adhuc fluet, puluere aliquo competenti sistatur.

sistatur.

140. Post casum sanguisugarum, cucurbitula, ut virus, quod in vulnere relictum est, extrahatur, affigenda est.

141. Sanguisugæ antequam adhibentur, debent esse famelicæ, quod fit, si in aqua absque cibo aliquādiu asservietur.

142. Sanguisugæ si fuerint venenate, succedit aut syncope, aut apostemata mala, aut sanguinis fluxus, aut febris, aut ulcera maligna.

143. In morbis omnibus subcutaneis, qui facti sunt ex sanguine corrupto, multum valent sanguisugæ, & plus, quam ventosæ. Nam ventosa indifferenter attrahit bonum & malum: Sanguisuga verò non, sed sibi proportionabilem, scilicet malum.

X.

De Excrementis.

144. Omnia corporis excrementa, cuiuscunque generis sunt, in quibuslibet morbis semper considerata sunt.

A cun-

A cunctis corporis venis lotium de- 145.
mittitur, eo modo quo & sudor. Quē-
admodum enim sudor est aqua san-
guini mixta; ita quoque est lotium.

Excrementum alui molle, atque 146.
coniunctum, iusta quantitate pro cibo-
rum assumptorum ratione, ac hora
consueta exiens, optimum iudicatur.

Excrementa membrorum, in qui- 147.
bus fit ægritudo, semper considerata
sunt. Nam quælibet excrementorum
coctio, quoquo tempore apparuerit,
breuitatem morbi, eiusque meliora-
tionem indicat.

Ægritudinem solui impossibile est, 148.
priusquam digestionis signa appareāt
in excrementis.

Ab excrementorum natura affectæ 149.
sedis coniecturam facere possumus,
singulique dolores pro situs varietate,
affectum locum ostendere possunt.

Periculum ostendit id, quod excer- 150.
nitur, si glutinosum est, subpallidum,
vel si est liuidū, aut biliosum, aut crū-
tum, aut peioris odoris, quā ex cōsue-
tutine.

Pus

52 *Aphorismorum Medicin.*

151. Pus quacunque parte erumpit, si est leue, album, vnius coloris, sine vlllo metu est, & quo effuso febris protinus conquiuerit, desieruntque urgere cibi fastidium, & potionis desiderium.
152. Deiectiones nigrae, qualis est sanguis niger, sponte venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessimae. Et quanto colores magis prauis, plures, peius. Cum medicamento verò, melius, & quanto colores plures, non prauis.
153. Alui excrementa inter bona indicia sunt, si mollia, ac benè colorata sunt, si eodem ferè tempore, quo in secunda valetudine deiici solebant, excernuntur, & si his, quae ingeruntur, proportionem respondent.
154. Excreationes in febribus non intermittentibus liuidae, sanguineae, biliosae, & foetidae, omnes malae.
155. Pus illud optimum est, quod album est, & leue, & haudquaquam foetet: Quod verò ab hoc variat, pessimum est.
156. Alba excrementa, vixque confecta, digerendi & attrahendi vim inuolidam signi-

significant : Varia verò, corruptam digestionem ostendunt.

Quibus cruda per inferiora subeunt, 157.
ab atra bile; si plura, copiosiore; si pauciora, minore.

XI.

De Urinis.

Qualis sanguis, talis vrina. Siquidē, 158.
si biliosus sit, eius quoque serum biliosum esse oportet. Si pituitosus, pituitosum; si melancholicus, melācholicum. Vbi verò crudus est, tenuis utique & aquosa vrina cernitur.

Vrina turbida quę visitur, qualis subiugantium, 159.
crudis succis refertas venas indicat, nō tamen naturam cessare, sed eos concoquere valenter.

Si celeris separatio crassi à liquido 160.
in vrina cernitur, sitque quod subsidet album, leue, & æquale, iam iam superaturam eos omnes naturam asserit. Si verò pura mingitur, ac protinus turbatur, iam crudi succi coctionem aggredi
naturam

54 *Aphorismorum Medicin.*

naturam docet. At si interposito tempore turbetur, non protinus, sed paulò post aggressuram inlinuat.

161. Cùm iudicia vrinarum mendosa & falsa sæpè inueniantur, qui ex solo ipsarum iudicio ægros nituntur curare, multa committunt homicidia.

162. Liuidus vrinarum color frigiditatis effectus est: Odor verò grauis, putrefactionis.

163. Non facile pronuncies de vrina, nisi postquam ægrum videris, & eum interrogaueris atque examinaueris.

164. Vrina pessima ac mortifera ea est, quæ nigra, crassa, & mali odoris est.

165. Si sanguis aut pus in vrina est, vel vesica, vel renes exulcerati sunt.

166. Ex vesica dolente, si purulenta vrina processit, inque ea leue & album subsedit, metum distrabit.

167. Si vrinae cruentæ sunt, in venis vitium est.

168. Si in vrina veluti furfures huc illuc natent, scire licet vesicæ scabiem esse.

Quibus

Quibus incipiente morbo vrina 169.
crassa est, ac veluti nubeculae in ipsa sus-
penduntur, si nihil aliud obstiterit, eos
purgare conuenit.

Cuius vrina in morbo diuturno sa- 170.
ni hominis vrinae similis, in vna eadem-
que qualitate permanferit, is nunquam
euadet aegritudinem.

Cuius vrinam non praenoueris sani, 171.
eius iam aegrotantis haud cognosces
facile. Vrina enim sanitatem hominis
praese ferens, in nullo mortalium, ne-
que quantitate, neque qualitate, neque
liquore aequalis est.

Quibus pellucidae & albae sunt vri- 172.
nae, malae, praesertim si in phreneticis
appareant.

Si quis sanguinem aut pus meiat, re- 173.
num aut vesicae exulceratio significa-
tur.

Quibus cum vrina crassa exiguae 174.
carunculae, ac veluti pili exeunt, his a
renibus excernitur.

Quibus cum vrina crassa furfuro- 175.
sa quaedam vna exeunt, his vesica
scabie

56 *Aphorismorum Medicin.*

scabie laborat.

176. Qui inopināter sanguinem meiunt
iis à renibus venulā ruptam esse signi-
ficatur.
177. Quibus in vrina subsident sabulosa
iis vesica calculo laborat.
178. Si quis sanguinem aut grumos me-
iat, aut vrinam guttatim emittat, dolo-
re ad hypogastrium & pectinem, & pe-
rinæum pertinente, ad vesicam loca la-
borant.
179. Si quis sanguinem, aut pus, aut squa-
mulas meiat, & grauis odor adsit, vesi-
cæ exulceratio significatur.
180. Mictus noctu plurimus, paruum de-
iectionem significat.
181. Quibus diuersæ sunt vrinæ, iis ve-
hemens in corpore fit turbatio.
182. Quibus in vrina bullæ innatant, ne-
phritim, & longam fore inualetudinē
significant.
183. Quibus in vrina adipalis superficies
est, & conferta, iis nephriticum & acu-
tum morbum adesse significat.
184. Quæ per vesicā promanant, specta-
re o-

re oportet, an talia sint, qualia secunda
valetudine subeunt. Nam quæ his mi-
nimè sunt similia, insalubriora; quæ ve-
rò valentibus similia, minimè insalu-
bria.

Et quibus hypochoremata, si reside- 185.
re permiseris, nec moueris, subsident,
veluti strigmenta, quæ si pauca sunt,
paruus morbus est; si verò multa, ma-
gnus, his aluum infernè purgari con-
ducit. Alioqui si non repurgata aluo
orbitiones exhibueris, quantò plures
dederis, tanto magis offenderis.

Qualia, quæ per vrinas & aluum sub- 186.
eunt, & quæ per carnes abeunt, & si
qua alia corpus à natura recedat, spe-
tare oportet. Nam si parum, paruus
morbus est; si multum, magnus; si valdè
multum, iam tale fuerit perniciosum.

Quando in vrina non videtur ma- 187.
nifestum sedimentum, & signum co-
ctionis, vel in calore, vel substantia,
vel in contentis, tùm nequaquam for-
tia aperitiua, vretica & solutiua exhi-
beantur, quia hoc certum est indicium,
mate-

materiam nondum esse præparatam & æquatam.

XII.

De Sudoribus.

188. A sudore horror, non bonum.
189. Sudor multus calidus, vel frigidus, semper fluens, humorem educi, robusto quidem suprâ, debili verò infrâ, significat.
190. Sudores saluberrimi censentur in omnibus acutis morbis, si in diebus decretoriis oriantur, febremque finiant, aut ubi toto corpore æqualiter insudante, æger morbum faciliùs sustinere videtur. Contrâ inutiles, qui id efficere non valent.
191. Sudorum omnium pessimi sunt frigidi, & ubi caput duntaxat, & facies, aut ceruix insudat, quippe, qui in acuta quidem febre mortem, in mitiore verò morbum diuturnum fore significet.
192. Quotiescunque sudauerint tunicati maximè graciles, expedit mutare tunicam,

unicam, ne corpus lædatur in frigidato
dore.

Quibuscunque sanguis phlegmati- 193.
us, & viscera naturaliter sunt calida &
robusta, his phlegmatica superfluitas
ad cutim copiosè propellitur, & candi-
la morphæa sæpiùs maculatur. Hoc
autem illis præcipuè contingit, qui-
buscunque crebrò sub vestibis sudor
concluditur.

Qua corporis parte sudor, ibi mor- 194.
bus.

Sudor multus per somnium factus, 195.
copiosiore cibo corpus uti significat.
Quod si parciùs epulanti hoc accadat,
vacuatione indigere sciendum est.

Sudor multus, frigidus, calidusve, 196.
semper fluens; frigidus grauiorem, cali-
dus minorem morbum significat.

Sudor multus calidus, aut frigidus, 197.
semper fluens, humiditatem in robusto
quidem supernè, imbecilli verò infer-
nè, vacuandam esse demonstrat.

Sudores in diebus iudicatoriis si 198.
sint, periculosi, præsertim qui ex fron-
te tan-

60 *Aphorismorum Medicin.*

te tanquam guttæ & fistulæ salientes pelluntur, frigidique valdè atque multi: necesse est enim talem sudorẽ multavi & labore, & longa expressione exire.

199. Sudor non est prouocandus, donec corpus probè sit euacuatum, hoc est, in declinatione.

200. Quando aliquis sudat immodicè, tum sudor nequaquam abstergetur, sic enim pori obstruuntur, vt nihil sudoris amplius succedere possit.

201. Quidam sanguinolento sudore madescent, & hoc fit ob nimiam sanguinis tenuitatem, ac pororum raritatem.

XIII.

De Balneis.

202. Quibus prostratæ sunt vires, aut qui fastidio, aut vomitu afficiuntur, aut qui biliosa ructāt, quibusue sanguis nimius ex naribus aut aliunde fluit, siue qui per morbos plus æquo citatiores fiunt aluo, aut quibus supra modũ aluus est adstricta, lauacro non sunt committendi.

Laua-

Lauacrum lateris, pectoris atq; dor- 203.
si mitigat dolorem, sputum maturat at-
que educit, spiritum quoque facilio-
rem reddit.

Balneum post exercitium, & ante 204.
prandium factum, corporis partes hu-
mectat, poros aperit, abstergit fordes
congregatas, minuit repletionem, ven-
rositates dissoluit, somnum prouocat,
humores subtiliat, dolores reprimat,
stringit ventrem, lassitudinem remo-
uet, corpusque cibis magis aptum efficit.

Lauacra æstate & hyeme, præsertim 205.
his, qui balneis multis assueti sunt, non
incommoda iudicantur. Gracilibus ta-
men, quàm corpulentis incommodio-
ra habentur.

A lauacro illicò nec sorbere, nec bi- 206.
bere conuenit.

Balneum fatigationem lenit, articu- 207.
los & cutim emollit, urinam ciet, capi-
tis grauitatem soluit, naresq; humectat.

Qui aluo sunt citatiore, quàm fue- 208.
rit opportunum, aut nimis astricta, iila-
uacro committi non debent.

E

Qui

62 *Aphorismorum Medicin.*

209. Qui volens ingredi balneum time-
motum cholerae ad os stomachi, ille an-
te ingressum balnei assumat panem in
succo granatorum acetosorum aut a-
rantiorum acetosorum infusum, ne ac-
cidat syncope: A balneo nequaquam.
210. Exiens à balneo, corpus benè tegat
pannis, ne ab aëre externo frigido læ-
datur.
211. Balneum aquæ simplicis temperatæ
calidæ, confert in febrium declinatione,
ne, signis coctionis manifestè in lotio-
nibus apparentibus. Sic enim cutis rarior fit,
pori aperiuntur, reliquæ transpirant
& resoluuntur, corpus inde humectatur
tur. Hecticis confert, præsertim si postea
ea in frigidam aquam subito demerse-
rint se, sic enim pori apertè constrin-
guntur, & humidum aqueum in eis con-
tentum detinetur.
212. Quando à balneo aliquis non dor-
mit, signum est, prauos humores in cor-
pore abundare, quorum vapores reso-
luti à balneo stimulando meninges, vi-
gilias inducunt.

Quan

Quando ingrederis balneū, & hor- 213.
rore afficiaris; tunc statim rursus exeas.
Hoc enim accidit ob materiam motā,
& nota est, corpus non esse mundum.

Quando à balneo aliquis dolore ca- 214.
pitis vexatur, ob vapores à balneo mo-
tos caput petentes, excitantes vel dolo-
rem capitis, vel vertiginem, hīc vtere,
quæ ascensum vaporum ad caput inhi-
bent, vt Diacitorium absq; speciebus,
coriandrum confectum vnius tunicæ,
grana granatorum, & similia styptica, vt
rob de ribes, iuleb rosarum, Capiti etiā
linimenta facta ex albumine oui, aceto
& aqua rosarum, plantaginis vel solatri.

Antequam ad thermas proficiscaris, 215.
corpus prius probè euacuetur. Si corp⁹
plethoricū est, venæ sectione: si verò ca-
cochymicū, tū purgetur cathartico cō-
petenti; nec vnicā hīc sis contētus eua-
cuatione. Si enim corpus non est probè
euacuatum, tūm humores prauī lique-
scunt & dissoluūtur; vnde prauiorū hu-
morū cum bonis fit commixtio, & eorū
ad mēbra debilia deflux⁹, & p̄terea sub-
tiles

64 *Aphorismorum Medicin.*

tiles euacuantur, & crassi in corpore
relinquuntur.

216. Intres balnea ventre vacuo & prius
exonerato, & vesica leuata; ne cibum
crudus & recrementa ad membra tra-
hantur, id quod multarum ægritudi-
num causa est.

217. Quando è balneo egredieris, cor-
pus probè sit munitum, ne per poros
patentes aër irrepat frigidus, & offensa
dat interiora.

218. Ultra modum in balneo non perse-
ueres, ne virtus exoluatur: Ideoque ad
virtutis vsque tolerantiam tantum per-
manendum.

219. Qui calidæ sunt complexionis, &
raræ texturæ, ac tenuium humorum, illi
li nequaquam largam moram in bal-
neo trahāt. Qui verò fortes ac pingues
sunt, & non facilè resolubiles, comple-
xionis frigidæ ac humidæ, illi diutiùs in
balneo perseuerare possunt.

220. Dum in balneo es, neque bibere ne-
que comedere debes. Si verò syncopa
molestaris ob choleram motam, tùm
offe-

fferatur panis in vino granatorum in-
usus.

Egressurus è balneo confestim se in 221.
lectum recipiat, ac sudet in eo per spa-
tium vnius horæ, ac dormiat, si potest.

E lecto vbi progredieris, refert leuis 222.
motus, & leue exercitium, vel loco ex-
ercitii fiant leues in corpore fricatio-
es: Postea quiescat, & assumat cibum
mucosum & facilis concoctionis.

A balneo statim, sic etiam ieiuno 223.
stomacho, nequaquam bibat aquam
frigida, neque etiam vinum, ne aper-
tus poris confestim penetret ad epar, &
ius temperamentum alteret, vnde ca-
tarrhexia.

Qui in thermis sunt, vitent diligen- 224.
ter coitum.

Non statim à cibo rursus ingredian- 225.
tur balneum, donec cibus fuerit con-
coctus, hoc est, septem horis à prandio,
aliàs cibus crudus à stomacho ad mē-
tra auertitur, vnde oppilationes & aliæ
agritudines.

Qui balnea & thermas intrant cor- 226.

E 3 pore

66 *Aphorismorum Medicin.*

pore non inanita, purgatoque, illis plerunq; hæc mala eueniunt, materia seu superfluitatibus liquatis, fufisque fcilicet vertigo, epilepfia, apoplexia, paralyfis, fpasmus, cœcitas, aut apoftema in membro aliquo principe, aut pleuritis, peripneumonia, aut angina, aut afthma. Sic quibus calidi funt renes, plerumque ardore vrinæ corripuntur, renum intemperie calidè exaucta. Sic quibus epar est calidum, fiunt hydropici, plerumque moleftantur fiti, aluo dura & conftipata. Ideoque refert ante ingreffum balnei, quibus renes calidi funt, & epar calidum eft, renes & epar ceroto Galeni inungere.

XIV.

De Frictionibus.

227. Frictio vehemens durat corpus, lenis emollit, multa minuit, modica implet.

228. Frictione vtendum eft; cùm aut adstringendum corpus, quod fluens eft,
aut

aut molliendum, quod induruerit; aut
indigerendum in eo, quod copia nocet;
aut alendum id, quod tenue & infir-
num est.

Longa frictione vti, neque in acutis 229.
norbis, neque in crescentibus conue-
nit, præterquam, cum phreneticis so-
nnus quæritur.

Capitis longos dolores ipsius frictio, 230.
non tamen in impetu doloris facta, le-
uat, & membrum aliquod resolutum,
ipsius frictione confirmatur.

Vbi à summis, aut à mediis corporis 231.
partibus, materiam euocare volumus,
extremas partes perfricare solemus.

Frictio maximè necessaria est his, 232.
qui paralyfin incurrunt, & quibus mē-
bra stupida sunt.

Ex forti frictione soluitur corpus, ex 233.
mediocri verò constringitur.

Corpora obstructa, leuius sunt con- 234.
fricanda.


Modica frictio nutrit corpus, fortis 235.
desiccatur, & extenuatur.

XV.

De Animi accidentibus.

236. Ut multi à pueris malè educati, ac in
desidia, & intemperantia viuentes, na-
turæ bonitatem corrumpunt: ita con-
trà nōnulli vitiosam corporis naturam
fortiti, temperantia vitæ & idoneis ex-
ercitiis ipsius naturæ vitia permutant
in melius.
237. Animæ actiones, & eius passionēs,
corporis complexionēs sequuntur.
238. Ægrotante corpore impeditur ani-
ma in suis actionibus: Existente autem
sano, agit omnia liberè.
239. Ira excandescit facies, pallefcit verò
metu, erubescit verecundia, gaudio se-
renatur, & obscuratur tristitia.

APHO-



APHORISMO- RVM MEDICINA- LIVM,

SECTIO QVARTA.

I.

De Causa morbi.

MORBI causas ignorantes certa 1.
remedia adhibere non possunt.

A causis ægrotatiuis faciliter vinci 2.
eos, qui dyscrasati sunt & imbecilles:
Fortius verò resistere eucratos & ro-
bustos, certum est.

Cum geminas corruptionis causas 3.
quodlibet corpus habeat, alteras inter-
nas, & à se (quas assiduum fluxum vo-
cant, quò ad interitum tendit:) alteras
extrinsecas incidētes, excrementorum
nimirum prouentum, ex cibis corpus
ingredientibus, necessum est, vt curam
quoque geminam desideret, nempe, vt

E s assi-

assiduum fluxum tardemus, & superflua corporis expurgemus.

4. Cum ineuitabiles homini sunt sex res non naturales, quas variis de causis contingit distemperari, hominem quēlibet ægrotare, & mori, naturaliter necesse est.

5. Digestionis corruptio mater est acutarum ægritudinum, & origo chronicorum morborum.

6. Digestiua virtus si in disseminando nutrimentum per corpus errauerit, hecticum corpus faciet; si verò in vniēdo, tunc reddet hydropicum; at si in assimilādo peccauerit, faciet illud leprosum.

7. Ciborum indigentia, animi passionibus, vacuationibusque superfluis, corporis virtus languescit, paulatimque dissoluitur.

8. Angustas corporis venas habentes, à crassis & viscosis facile offenduntur; quibus verò latæ sunt, minus.

9. Phlegmatis à capite defluxus ad vētriculum, plures chronicos morbos inducit.

Yna

Vna & eadem materia putrescens, 10.
in diuersis corporis sedibus morbos
diffimiles facit.

Morbi alii à victus genere, alii à spi- 11.
ritu, quem attrahimus, proueniunt.

Cùm vna ægritudine plures homi- 12.
nes eodem tempore corripuntur, cau-
sam reiicere ad id debemus, quod ma-
ximè commune est, quoque omnes v-
timur, id autem spiritus est, quem acci-
pimus, reddimusque. Cùm verò eo-
dem tempore diuersi morbi gignūtur,
sine dubio victus cuiusque inculpāus.

Morborum ferè omnium causa, sto- 13.
machi infirmitas.

Omne nocumētum subitum & mo- 14.
mentāneum, si ab interiori processerit,
oritur à vapore. Si verò aliter sese ha-
buerit, ab humore originem ducere
certum est.

Mutationes temporum potissimum 15.
pariunt morbos, & in ipsis temporibus,
magnæ mutationes frigoris, aut calo-
ris, cæterorumque ad proportionem
his respondentium.

72 *Aphorismorum Medicin.*

16. Naturarum quædam ad æstatem, alia ad hyemem benè aut malè se habent.

II.

De Morbo.

17. Diuersæ ægritudines diuersa medicamenta requirunt, similesque similia.
18. Alterata corpora oppositis alterantibus indigent, repleta vacuantibus, vacua replentibus; omnisque immoderationis correctio, per contrariam efficitur immoderationem.
19. Complicatis ad inuicem morbis, cui libet innitendum: Prius tamen causanti, causato non neglecto.
20. Multos magnos morbos quiete, & abstinentia curari, Celsus affirmat.
21. Si naturalia non cognoueris, eorum quæ præter naturam sunt, noticiam non habebis. Ob id, numerum morborum comprehendere, impossibile est, nisi prius eorum, quæ causa actionis sunt, in vnoquoque membro, dum in suo natu-

naturali cursu extiterit, numerus agnoscat.

Errorem corrige, priusquam auctus 22.
curatu difficilior euadat.

Quoniam oppositorum est eadem 23.
disciplina, perfectam morborum noticiam habere impossibile est, nisi prius habita fuerit sanitatis cognitio.

Nemo melius morbo occurrit, quā 24.
cui malum maximè cognitum est.

Tanta est animi & corporis colligā- 25.
tia, ut sine animo corpus, nec sine corpore animus, rectè valere possit.

Morbos, quia semine, vel naturæ vi- 26.
tio insiti sunt, ars parum adiuuat.

Humidum tempus, humidus parit 27.
morbos, siccum, siccus. In algido verò frigidi, & in feruido calidi, gignuntur.

Contrariorum morborum, contra- 28.
riæ sunt solutiones: Contraria enim contrariis curantur.

Medicinæ subtiliatiuæ, aperitiuæ op- 29.
pilationum, & repletionum euacuatiuæ, morborum longitudini faciliè obuiant.

74 *Aphorismorum Medicin.*

30. Diuturnitate, si morbus inualuerit, rectius diutina curatio, quàm vehemens instituitur.
31. Humorū acuties, membrorum sensibilitas, & virtus imbecilla, corporis ægritudinem faciunt acutiorem.
32. Tot sunt membrorum compositorum species: quot modis ad inuicem possunt putrescere humores.
33. Morbi ex plenitudine facti, aucto Lunæ lumine augentur & crescunt, & ipsa decrescendo decrescunt & minuantur. Qui verò ex inanitione fiunt, in oppositum se habent.
34. Membro, quod est instrumentum alicuius actionis, vitiato, consequens est, ut ipsius actio vitietur. Nam læsa membrorum temperatura, actiones ab his factas lædi, rationi cōsentaneū est.
35. Morbi tantū curantur; causę morborum, si adsunt, remouentur, symptomata corriguntur, vel mitigantur.
36. Morbi non verbis, sed remediis curantur.
37. Longis morbis senectus, acutis adolescenten-

lescentia magis pater.

Morbi qui ex repletione proficiſcū- 38.
tur, ex inanitione curantur; qui ex ina-
nitione proueniunt ſaturitate; qui à la-
bore, quiete; qui verò ex otio, exerci-
tio vincuntur.

Initia morborum famem ſitimque 39.
deſiderant. Ipsi verò morbi, modera-
tionem, nempe, vt neque aliud quàm
expedit, neq; eius ipſius nimiū ſumatur.

Sicut vniuerſi morbi omnibus na- 40.
turis, omni tempore, omnique ætati e-
venire poſſunt: ita morbi vocati hære-
ditarii ac contagioſi, non mera neceſſi-
tate ſubſequuntur; ſed contingentia
obueniunt, non tamen omnibus.

Frigidæ ægri tudines in ſenibus dif- 41.
ficiliùs: in iuuenibus faciliùs curantur.

Nullus eſt morbus, qui non requi- 42.
rat, vt ſuper quibuſdam infirmus inter-
rogetur.

Quodcunque membrum, vel natu- 43.
ra, vel qualibet occasione læſum fuerit,
nunquam priori ſtatui integrè reſtitui-
tur.

In

76 *Aphorismorum Medicin.*

44. In acutis passionibus sanguis detrahendus, si morbus vehemens, ætas florens, & virium robur adfuerit.
45. Circa initia & finem morborum remissiora sunt omnia, in vigore vehementiora.
46. In quouis morbo, valere rationem, recteque se ad ea quæ sumuntur habere, bonum: Contra verò habere se, malum,
47. Minus periculose ægrotant, quorū vel naturæ, vel ætati, vel consuetudini, vel tempori familiaris morbus est, quā quibus horum nullo affinis cognatusque existit.
48. In quouis morbo partes ad vmbilicum & infimum ventrem attinentes, crassiores esse præstat: Harum siquidē extenuatio & tabes, mala. Sed ad inferiores quoque purgationes parū tuta.
49. Magnam partem senes iuuenibus minus ægrotant: semel autē diuturnis morbis correpti, ferè vnā moriuntur.
50. Morbi alii ad alia tempora benè vel malè se habent. Et quædam ætates ad
tempo-

tempora alia & loca, & aliud victus genus.

Certis temporibus & suam tempe- 51.
stiuitatem seruantibus, certi & tempe-
stiui, ac iudicatu faciles, morbi fiunt. In-
certis autem & alienis, incertæ quoque
ægotationes fiunt, & ad iudicandum
difficiles.

Autumno in vniuersum morbi acu- 52.
tissimi, & perniciosissimi: Ver autem
saluberrimum, & minimè exitiosum.

In morbis acutis detestatur omnis 53.
strepitus, fragor, canum latratus, cla-
mor, tumultus, & campanarum soni-
tus; ne natura ad exteriora euocetur,
sed potius vt intrinsecus maneat, & cō-
coctioni, ac expulsionī materiæ, tota
 intenta sit.

Terram mutare in diurnis mor- 54.
bis, vtile est.


In quocunque morbo sentitur gra- 55.
uitas, & pondus, ibi est materia.

III. De

III.

De Symptomate.

36. Cùm grauiori oeciùs succurrendum sit, accidentibus virtutem prostermentibus, relictà morborum cura, priùs succurrendum est.



APHORISMO-
RVM MEDICINA-
LIVM,

SECTIO QVINTA.

I.

De Prognostico.

1. **P**RIUSQUÀM morbum cures, mortis signa si percipias, ipsa prælagire oportet: Prognosticatio enim inculpabilem reddit de morte Medicum.
2. Quorum morborum cura adeò difficilis est, vt facillè euelli nequeant, cum bono prælagio ipsorum curam attentabis,

tabis, & lenando dolorem, patientis vitam ad tempus prolongabis.

In quibus desperata omninò salus 3. est, imprudentis consilii fuerit, apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere saluti.

Si virtus non remaneat ad horam 4. usque status morbi, ægrotum mori contingit ex illa ægritudine.

Virtutis debilitas, morbi magnitudo, materiæque peccantis indigestio sine crisi, subitam ægri mortem minantur.

Simplex affectus faciliùs multiformi curatur, minusque periculosus est. 6.

A prima die morbi in singulis quaternis diebus, ipsius morbi signa, atque morbum ipsum considerare oportet. 7.

Quoniam ex his duobus non solàm principii tempus cognoscere licet; verùm etiam sæpiùs, quo tempore morbus ipse finietur.

A liene morbi, fiunt diurni & melancholici: A vesicula autem fellis, breues oriuntur & acuti. 8.

Deplora-

9. Deploratos non oportet attingere, sed magis recedere euentu morbi pronuntiato.
10. Quæ præsentem sanitatem ostendunt, indicantia signa dicuntur; quæ futuram, prognostica, commemorantia, quæ præteritam. Maior tamen utilitas est indicantium, & prognosticorum, quàm commemorantium.
11. Cordis tremor assiduus subitam mortem minatur; sensus verò membrorum deperditio, paralyfin.
12. Intensus capitis dolor cum rubente facie, phrenesin prognosticat; facies verò rubra tumens, & ad fuscenedinem declinans, lepram futuram præsa git.
13. Ex stranguria iliacus dolor in septimo hominem rapit, nisi febris cum sudore præsidium adferat.
14. Timor & tristitia multa, quorum causæ ignorantur, melancholiam demonstrant.
15. Quoniam febrilis calor per arterias & venas febricitantium graditur, ipsorum vrinas oportet considerare: Circa

ver-

ventrem dolentium, egestionem pleuriticorum, sputa.

Solita iuuare si iuuant, bona est eorum significatio; si verò non iuuerint decenter exhibita, morbi exitus formidandus est. 16.

Facile soluitur morbus, si robur virtutis adsit: Imbecilli verò facta, citò mors accelerat. Ob id virtutis robur ex propriis operibus oportet præcognoscere, & præsertim ex eis, quæ fiunt secundum pulsus; Nam vitalis virtutis præcipue sunt opus: Morbi verò magnitudinē, ex propriis symptomatibus. 17.

Ægritudines hyeme nutrimentum capiētes, in æstate finiuntur; & contrā. Quæ verò in æstate creuerint, nisi infra dierum circuitum absoluantur, terminantur in hyeme. Vernorum enim morborum autumnus liberator est, Ver autem autumnalium. 18.

Effectus qui ex suis causis de necessitate proueniunt, procul dubiò iuxta naturalem cursum prædici possunt. De his enim quæ merè naturaliter accidunt, conie-

82 *Aphorismorum Medicin.*

coniectura veritati propinqua, notis quibusdam præcedentibus, certum potest haberi iudicium.

20. Cùm malorū futurorum ineuitabili-
lium, ignoratio vtilior sit, quàm ipsorū
scientia; deteriora accidentia super-
uentura ægrotantibus ipsis haudqua-
quam debent præsagiri.
21. Licet Medici ægros eo morbo, quo
laborant, sciant esse morituros: ipsis ta-
men mortem nunquam prædicant.
22. In morbo stomachi certius signum
ex egestione, quàm ex vrina sumitur.
23. Quibuscunque mulieribus ad mē-
mas sanguis colligitur, furorem signi-
ficat.
24. Vernorum morborum liberatio in
autumno; autumnalium verò in vere
expectanda est.
25. Ea facies optima censenda est, quæ
sanorum faciebus similis est. Quæ verò
longius ab hac recedit, grauißimum
periculum portendit.
26. Si nares acutæ sint, oculi concaui,
collapsa tempora, frigida contractæq;
aures,

aures, & imis partibus leniter versæ, cutis circa frontem dura, intenta, & arida, torius faciei color aut niger, aut pallidus, aut liuens, aut plumbeus, malum; multoque magis, si neque vigilia, neque ventris resolutio, neque inedia præcesserit.

Indicia mortis sunt, vngues digiti- 27.
que pallidi, frigidus spiritus, aut si quis in veste floccos legit, vel in adiuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit.

Dolores circa coxas & inferiores 28.
partes orti, si ad viscera transferint, subitoque desierint, mortem subesse testantur, magisque si alia quoque signa accesserint.

Cui sano subitus dolor capitis ortus 29.
est, ac somnus profundus accessit, sic ut stertat, nec expergiscatur, illi intra septimum diem pereundum est, magisque si eum alius cita non antecesserit.

Graue est, si se ipsū æger continere 30.
non valens, ad pedes subindè delabitur.

Vbi agrotus pedes, brachia, cer- 31.
vicem

84 *Aphorismorum Medicin.*

vicem, inæqualiter dispergit ac nudat, neque iis calor subest, mali morbi signum est.

32. Pernitiosum est, vbi hians quis assidue dormit, aut vbi supinus iacet, cruribusque vehementer contractis, complicatisque.

33. Stomachus cui doluerit, & acutè februerit, si in dextro pede pustula ei enascatur acerrima, & nullum desiderium habuerit, septimo die moritur.

34. Acres ægritudines plus in senibus, quàm in iuuenibus timendæ sunt.

35. Timere quis debet, si crebra vlcera oriuntur, si corpus contra consuetudinem incalescit, si grauior somnus premit, si tumultuosa somnia adsint, si sæpiùs expergiscitur aliquis, quàm consuevit, deinde iterum soporatur, si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem insudat, maximèque circa pectus, aut ceruicem, aut crura, aut genua, vel coxas.

36. Metuere etiam quis debet, si loqui piget, & moueri piget, si corpus torpet, si dolor

dolor præcordiorum adest, aut totius pectoris, aut in plurimis venis capitis, si salivæ plenum os, si oculi cum dolore vertuntur, si membra inhorrescunt, si spiritus grauior est, si frequentes oscitationes, si genua quasi fatigata sunt, totumve corpus lassitudinem sentit.

Sternutamentum inter bona indicia 37.
est, sic & cupiditas cibi, vel à primo seruata, vel etiam post fastidium or-
ta.

Mali morbi indicium est, vehemen- 38.
ter & crebrò spirare, dolorem habere continuum, difficulter ferre morbum, tractare brachia & crura, habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, & præcordia dolentia & tumida.

Mali quoque morbi signum est, ni- 39.
mis celeriter emarcescere, caput, pedes, manusque calidas habere, ventre & lateribus frigentibus, aut partes extremas frigidas acuto morbo urgente.

Æquè malum signum est, post vomitu- 40.
m singultum accedere, post sudorem inhorrescere, præsertim si sudor frigidus

F
dus

86 *Aphorismorum Medicin.*

us fuerit, & non per totum corpus æqualis.

41. Senectutem longiores plerunque morbi exercent: acutis verò adoleſcentia magis implicatur.
42. Obliuio, quæ ſanis ſpontè prouenit, comitialem morbū aut lethargum, aut apoplexiam denunciat.
43. Languor diuturnus plerumque ſola peregrinatione, aut loci mutatione fugatur.
44. Innata malitia figuræ nunquam adultis corrigitur: in creſcentibus verò rarò.
45. Meatus innaturalis, qui diu manauit, vt in fiſtulis antequam, abſque timore grauioris incommodi, niſi manatio conſueta deriuetur ad proxima, obturari nequit.
46. Ablatio repentina cuiuslibet actionis, abſque cauſa extrinſeca, teſtatur exuperare humiditates.
47. Eos, quibus egeſtionis & vrinæ ſuperfluitates diutiùs retinentur, lumborum aut circumiacētium membrorum paſſio-

passiones incurrere necessum est.

Naturarū diuersitas potissima causa 48.
est, cū longitudinis, tū breuitatis
vitæ. Sunt enim qui ab ipso ortu adeo
improspero sunt corporis statu, vt ne si
Æsculapium quidē ipsum iis præfece-
ris, vel quadragesimum annū videant.

Naturarum diuersitas potissimū 49.
in causa est, cur ab iisdem cū adiuuē-
tur, tū lædantur homines.

Morbi hæreditarii, licet vt plurimū 50.
inextirpabilis existimentur esse radicis:
tamen ne in deterius pullulent, conue-
nienti victus moderatione prohibere
possumus.

Hæreditarius morbus cēsendus est, 51.
si vtroque parente, eodem morbi ge-
nere laborante, conceptus infans mor-
bidus edatur. Vno enim parente exi-
stente sano, alterius seminis defectus
corrigi poterit, vt in infantem hæredi-
tariē morbus non transeat, vt experien-
tia sæpè docet, quam negare, nimis so-
phisticum est.

Si ver pluuiosum fuerit, & in- 52.

F 2 con-

88 *Aphorismorum Medicin.*

constans aëris mutatio, æstate expectare oportet pustulas vlcerosas plurimas, variolas, tubercula, abscessus, phrenesin, & omnis generis febres, quæ nulla ventris solutione curantur.

53. Morbi verò ipsi & anni tempora; & periodorum inter se proportionis observatio, siue ea quotidie, siue alternis, siue maiori intervallo fiant, paroxysmos & statum morborum indicabunt. Sed ex iis etiam, quæ postea apparent, indicia sumuntur, velut in pleuritide, sputum si statim in initio appareat, breuem fore denunciat, si verò posterius conspiciatur, longam. Quinetiam urinæ, alui feces, sudores, & iudicatu faciles, aut difficiles, & breues aut longos morbos fore, cum superueniunt, demonstrant.

54. Quo in morbo somnus laborem adfert, mortiferum est: si verò leuationem, minimè est mortiferum.

55. Vbi somnus debrationem sedat, bonum.

56. Spontaneæ lassitudines morbos denunciant. Qui

Qui ab aliqua corporis parte dolen- 57.
tes, ferè dolorem nò sentiunt, iis mens
ægrota.

In morbis acutis non omninò cer- 58.
tæ sunt mortis, aut salutis prædictio-
nes.

Non, si quid in morbis acutis fiat præ- 59.
ter rationem leuius, fidere oportet; nec
turbari, si quid temerè grauius accide-
rit. Istiusmodi enim multa sunt incerta,
nec durare diu, aut persistere solent.

Qui natura sunt valdè crassi, bre- 60.
uiore vita fruuntur, quàm qui graci-
les.

In temporibus, cùm eodem die mo- 61.
dò calor, modò frigus, autumnales
morbi expectandi.

Auster auditum hebetat, caliginem 62.
visui obducit, caput grauat, membris
tarditatem, & languorem conciliat:
Cùm itaque is increbescit, talia inuali-
dis accidunt. Contrà Aquilo tussès mo-
uet, fauces exasperat, aluum indurat, v-
rinam suppressit, horrores excitat, late-
ris & pectoris dolores facit. Hoc itaque
F 3 domi-

dominante, talia infirmos expectare oportet.

63. Cum æstas sit similis veri, sudores in febribus multos expectare oportet.

64. Magnis siccitatibus febres fiunt acutæ. Quod si annus talis esse pergat, qualem temporis statum effecerit, tales ferè morbos expectare oportet.

65. Inter anni partes, si hyems sicca & aquilonia, ver pluviosum & australe fuerit, æstate necesse est febres acutas fieri & ophthalmias, & dysenterias, mulieribus præsertim, & viris natura humidioribus.

66. Contrà verò si australis hyems, & pluviosa, & tepens fuerit, ver siccum & aquilonium, mulieres quibus partus in ver incidit, quavis occasione abortiunt, aut si pariant, tam infirmos & morbosos partus edunt, ut vel statim ipsi intereant, vel tenues & valetudinarii vivant. Cæteris dysenterix & ophthalmix sicca fiunt, & senibus catarrhi perniciem breui allaturi.

67. AEstate verò sicca & aquilonia; autu-

autumno pluuioso & australi, vehemē-
tes capitis dolores in hyemem, & tuf-
ses, raucitates, & grauedines, nonnullis
etiā tabes expectandæ.

Aquilonio verò & sicco autumno, 68.
hominibus natura humidis, & mulie-
ribus commoditas parabitur. Alios
ophthalmiæ siccae, & febres, partim
acutæ, partim longæ, quosdam etiā
melancholiæ, malè habebunt.

Ex tempestatibus anni, in vniuer- 69.
sum siccitates assiduīs imbribus salu-
briores & minus mortiferæ.

Assiduīs imbribus morbi ferè fiunt, 70.
febres longæ, fluxiones alui, putredi-
nes, epilepsiæ, apoplexiæ, anginae, sicci-
tatibus autem morbi tabifici, ophthal-
miæ, articulorum dolores, vrinae, & in-
testinorum difficultates.

Quotidianæ tēpestates Aquiloniæ, 71.
cogunt corpora, firmantque mobilio-
ra item, expeditioraque & coloratiora,
& auditu valentiora reddunt, aluum
siccant, oculos mordent, & si pectus
dolor aliquis prius habuerit, exasperāt.

F 4

Contrà

92 *Aphorismorum Medicin.*

Contrà Austringe eadem soluunt, & humectant, auditum hebetant, caput gravant, vertiginem oculis, tarditatem & languorem corporibus adferunt, aluum humectant.

72. Quod ad tempora verò pertinet, Vere & prima æstate pueri, & his ætate proximi, optimè degunt, valentque maximè. Æstate verò & Autumni ad aliquam vsque partem senes. Reliquo autumno & hyeme, qui mediam ætatem agunt.

73. Quilibet in quibusvis temporibus morbi fieri possunt: Nonnulli tamen in quibusdam magis, tùm fiunt, tùm irritantur.

74. Vere enim infania, melancholia, epilepsia, fluxiones sanguinis, angina, gravedines, defillationes, tussés, lepræ, impetigines, vitiligines, & pustulæ, ulcerosæ plurimæ, tubercula, articulorum dolores.

75. Æstate verò nonnulli horum, & febres continuæ, ardentes, & tertianæ plurimæ, quartanæ item, & vomitiones,

nes, alui profluuia, ophthalmia, aurium dolores, oris vlcerationes, genitalium putredines & sudationes.

Autumno æstiu etiam multi morbi, 76.
& febres quartanæ & incertæ, lienis tumor, aqua intercostem, tabes, urinæ difficultas, intestinorum tum leuitas, difficultas, coxæ dolores, angina, anhelatio, intestinorum parte quapiam coarctatio, epilepsia, insania, melancholia.

Hyeme pleuritides, peripneumonia, 77.
lethargi, grauedines, raucitates, tussis, pectoris, laterum & lumborum dolores, cephalalgia, vertigines, apoplexia.

Secundum ætates autem hi morbi 78.
fiunt. paruis & nuper natis puerulis, oris vlcera, vomitiones, tussis, vigilia, pauores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates.

Aduentante dentitionis tempore, gingivarum pruritus, febres, couulsiones, 79.
alui profluuia, maxime cum caninos edunt, & iis praesertim, qui crassissimi sunt,

F 5

sunt,

sunt, & qui alio sunt dura.

80. Ipsi verò grandiusculis, tonsillarum inflammationes, vertebræ in occipitio introrsum luxationes, anhelationes, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verruæ pensiles, satyriasmī, stranguriæ, strumæ, & alia tubercula, præcipuè verò antedicta.

81. Grandioribus autem, & ad pubertatem accedentibus, superiorum etiam morborum multi, & febres diuturniores potius, & ex naribus sanguinis fluxiones.

82. Pueris maxima ex parte morbi iudicantur, alii intra dies quadraginta, nonnulli intra septem menses, quidam intra annos septem, alii ipsis etiam ad pubertatem accedentibus. Qui verò permanserint, neque pueris circa pubertatem, neque fœminis cum menstrua erumpunt, soluti fuerint, inueterascere consueverunt.

83. Adolescentibus, sanguinis expuitiones, tabes, febres acutæ, epilepsiæ, alii-que morbi, sed præcipuè nunc dicti.

Ultra

Ultra hanc ætatem prouectis, asth- 84.
mata, pleuritides, peripneumoniæ, le-
thargi, phrenitides, ardentes febres,
diuturna alui profluvia, cholerae, dy-
senteria, lienteria, hæmorrhoides.

Senibus spirandi difficultates, destil- 85.
lationes cum tussi, stranguriæ, dysuriæ,
articulorum dolores, nephritides, ver-
tigines, apoplexiæ, malus corporis ha-
bitus, cachexia Græcis dictus, pruritus
totius corporis, vigiliæ; alui, oculorum
& narium humiditates, visus obtusior,
glaucomata, auditus hebetior.

Quibus tormina adsunt, & circa 86.
umbilicum cruciatus, & lumborū do-
lor, qui neq; medicamento, neque ali-
ter saluatur, in siccū hydropa firmatur.

Morbis quibusvis incipientibus, si 87.
atra bilis supra infraue exierit, perni-
ciosum.

Quibus per morbos acutos, aut diu- 88.
turnos, aut vulnera, aut alium modum
extenuatis atra bilis, aut velut sanguis
niger subierit, postridiè moriuntur.

Sanguinem supernè quidem effer- 89.

F 6 ri,

96 *Aphorismorum Medicin.*

ri, qualiscunque sit malum. Infernè verò niger si deiiciatur, bonum.

90. Quibus deiectiones sunt biliosæ, superueniente surditate cessant: & contrà quibus surditas adest, biliosorum deiectione finitur.

91. Quibus ex morbo conualescentibus pars aliqua laborat, in ea abscessus fiunt.

92. Sed si qua ante morbum pars laborauerit, ibi morbi sedes.

93. Ex qua parte corporis inest calor, aut frigus, ibi morbus.

94. Et quando toto corpore mutationes accidunt, ut si corpus refrigeretur, & vicissim calefiat, vel calor alius ex alio oriatur, longitudinem morbi significant.

95. A copioso sanguinis fluxu singultus aut conuulsio, mala.

96. A purgatione immodica (quam hypercatharsin vocant) conuulsio, aut singultus, malum.

97. Si ebrius quispiam derepentè obmutescat, conuulsus moritur, nisi febrè corri-

corripiatur, aut qua hora crapula soluitur, vocem recuperet.

Qui tetano corripiuntur, intra quatuor dies intereunt: si verò hos superauerint, incolumes euadunt. 98.

Calidum frequentiore usu hæc inuenit incommoda: carnis effœminationem, neruorum incontinentiam, animi torporem, profusiones sanguinis, animi deliquia, ad quæ quidem mors. 99.

Frigidum verò conuulsiones, tetanos, nigrores, & rigores febriles adfert. 100.

Frigidum inimicum ossibus, dentibus, neruis, cerebro, dorsali medullæ, Calidum verò amicum. 101.

Frigidum vlceribus mordax, cutem obdurat, dolorem insuperabilem facit, nigrorem inducit, rigores febriles, conuulsiones & tetanos curat. 102.

Calidum in quo vlcere pus mouet, maximum securitatis præstat indicium, cutem emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, conuulsiones, tetanos mitigat, capitis grauitatem soluit, ossibus

98 *Aphorismorum Medicin.*

fractis plurimum prodest, maximè si nudata sint, multoque magis, si in capite. His etiam prodest, quæ moriuntur, aut vlcerantur à frigore. Herpetibus denique exedentibus, sedi, pudendo, vtero, vesicæ, his omnibus calidum amicum, & decretorium, frigidum, inimicum & interimens.

104. Frigido verò in his vtendum, vnde fluit, aut fluxurus sanguis est, non quidem eodem loci; sed ad ea loca, vnde influit admoto: & si quæ partium inflammationes aut deflagrationes, ad rubrum sanguineumque colorem tendunt, recenti efflorescente sanguine, iisdem ipsis adhibito. Nam inueteratas nigrefacit. Erysipelas etiã non vlceratũ iuuat; Siquidem exulceratum lædit.

105. Frigida veluti nix & glacies, pectori inimica, tussés mouent, venarum ruptiones & destillationes efficiunt.

106. At recti intestini & vteri inflammationem, purulentosque renes, accedit stranguria: Iecore verò inflammatione laborante, interuenit singultus.

Quibus

Quibus arida & dura cutis obtendi- 107.
tur, sine sudore moriuntur: quibus ve-
rò laxa & rara, cum sudore vita defun-
guntur.

Quibus nares humidiores natura, 108.
& genitura humidior, ii minùs prospe-
ra valetudine fruuntur: Quibus verò
hisce contraria adsunt, salubriùs de-
gunt.

Singultu fatigante, sternutatio su- 109.
perueniens, liberat.

Pertusa, perfectæque vesica, cerebro, 110.
corde, septo transverso, tenui quopiã
intestino, ventriculo, iecore, lethale est.

Perfectum os, aut cartilago, aut ner- 111.
vus, aut genæ tenuis particula, aut præ-
putium, neque augetur, neque coale-
scit.

Si in ventrem sanguis præter natu- 112.
ram effusus fuerit, is suppuretur est ne-
cesse.

Si metus atque mœstitia longo tem- 113.
pore perseverent, melancholicum est
signum.

Qui

114. Qui calui sunt, iis varices magni nō sunt; quibus verò caluis existentibus varices superueniunt, ii rursus capillati fiunt.

115. In somnis etiam an de oculis aliquid subappareat, spectare oportet. Nam si quid non exactè commissis palpebris de albo appareat, modò non ex alui profluvio, aut medicamenti potione accidat, malum signum est, & valdè perniciosum.

116. In morbis acutis cum febre, quasi gementium suspicia, mala.

117. Morbis melancholicis per hæc tempora suspecti humorum decubitus, vel apoplexiam corporis, vel convulsionē, vel maniam, vel cæcitatem denunciāt.

118. In morbis acutis frigus partium extremarum malum.

119. Propter os ægrotans caro liuida, malum.

120. A vomitu singultus, & oculorum rubor, malum.

121. Horror à sudore, non bonum.

122. In morbo diuturno cibi fastidium,
& syn-

& sincerae deiectiones, malum.

A multa potatione rigor, & delirium, 123.
malum.

A tuberculi introrsum eruptione 124.
exolutio, vomitio, & animi defectio fit.

A sanguinis profluuiio desipientia, 125.
aut etiam conuulsio, malum.

Propter ardores vehementes con- 126.
uulsio, aut tetanus malum.

Propter plagam in capite acceptam 127.
stupor, aut desipientia, malum.

A puris sputo phthisis & fluxio: quum 128.
verò sputum retentum fuerit, moriun-
tur.

A forti in vlceribus pulsa hæmor- 129.
rhagia, malum.

A diuturno partium ad ventrem at- 130.
tinentium dolore, suppuratio.

A sincera deiectione dysenteria, 131.
malum.

Ab ossis vulnere desipientia si in va- 132.
cuum vsque penetrauerit.

Propter vehementem dolorem par- 133.
tium ad ventrem attinentium, extre-
marum perfrigeratio, malum.

Siue

134. Siue os, siue cartilago, siue nervus
sectus fuerit in corpore, neque auge-
tur, neque coalescit.
135. Si leucophlegmatia detento fortis
diarrhæa superuenerit, morbum soluit.
136. Quibus per diarrhæas spumosa sunt
alui excrementa, iis à capite fit deflu-
xio.
137. Quibus per febres in vrinis sedimē-
ta crassiorem farinam referunt, longā
inualetudinem fore significant.
138. Quibus in vrinis biliosa sedimenta:
sed suprā tenuia apparuerint, acutum
morbum significant.
139. Qui sanguinem vomunt, si sine fe-
bre accidunt, salutare est: si cum febre,
malum. Curatio verò refrigerandi &
adstringendi vim habentibus, perfici-
tur.
140. Si derepentè lingua incontinens fi-
at, aut aliqua corporis pars attonita
stupeat, signum est Melancholicum.
141. Quibus inter ventriculum & se-
ptum transversum pituita concluditur,
& dolorem adfert, in alterutrum ven-
trem

em viam non habens, iis per venas in
ficam versa pituita, morbi fit solu-
o.

Anxietudinem, oscitationem, hor- 142.
rem, vinum pari aquæ portione epo-
m, soluit.

Vbi toto corpore mutatio, & cor- 143.
us refrigeratur, vicissimque calefit,
it colorem alium ex alio mutat, mor-
significatur longitudo.

A sanguinis vomitione, tabes & pu- 144.
supernè purgatio.

Lingua nigra atque cruenta, cùm 145.
uid horum signorum abest, malum
alidum non est, & imbecilliores lu-
um significat.

Testis dexter frigidus conuulsus- 146.
ue, mortiferum est.

Vngues nigri, digiti pedum frigidi, 147.
emissi, vel proclinati, mortem proxi-
am esse ostendunt.

Digitorum extrema frigida, mortem 148.
ra se ferunt.

Et labia liuida, resoluta, inuersa & 149.
igida si sint, mortiferum est.

Si

150. Si oculi caligant, aut lucem adueniunt: qui somno multo & æstu denegatur, extra spem est.
151. Si quis sensum rabie quadam effertur: si quis non cognoscit, non audit, non intelligit mortiferum est.
152. Paulo post moriuris, signa hæc sunt clara magis, ventriculi si tollantur, tumescunt & inflantur.

II.

De Crisibus.

153. Naturam cum videris hora crisis potentem, nocivum expellere in sui roginem, extrinsecus emplastris, embrocationibus, aut vnguentis eam adiuvare poteris. Si vero suffecerit ad crisis faciendam, hanc operari dimitte.
154. Crisis velox, ac vehemens motu morbi cum infirmus ad mortem salutariter deducitur, aut cum virus ab venenosis nociva segregat, ut expulsiore praparet, circa morbi statum, aut in

pl

o regulariter accidit, ob id, præ cæte-
horis ægritudinū, hora status digni-
est, vt singulariter animaduertatur.

Accidentia hora crisis apparentia, 155.
um in eis non fit crisis, mortem aliàs
enotant, aliàs crisin difficilem.

Accidentium morbi, quæ crisin si- 156.
nificant, quædā sunt causa crisis, vt vo-
it⁹, alui fluor, vrina multa, sudore san-
guinis fluxus, & apostemata corporis
partibus diuersis, & præcipuè in e-
muntoriis, quædam verò tātum ipsius
crisis signa.

Quoniam omnis crisis per euacua- 157.
tionem fit manifestam, vel per exitu-
am notabilem; omnis ægritudo, quæ
osque his duabus sanatur rebus, cum
eteriore priore redit dispositione.

Cū quælibet ægritudo crisin sibi 158.
abeat conuenientem, adurentem fe-
rim patiens, per sanguinis narium flu-
um, aut per totius corporis sudorem,
gorem sequentem; vel per bilis multæ
omitum, siue biliosum secessum cri-
cat: Tertianam verò per sudorem
pluri-

plurimum, vel per bilis vomitum, aut
eius egestionem.

159. Calido cerebri apostemate febriens
per totius corporis, & capitis præsertim
sudorem, aut sanguinis narium decur-
sum, legitimè criticat.

160. Narium mucor, & aurium sanies, o-
culorumque lachrimæ, de crisi-
bus sunt morborum capitis.

161. Apostemata in iecore, aut dextro
hypochondrio existente, per sanguinis
fluxum è dextra naris parte salubriter
crisis fit.

162. Apostemata in liene, vel in sinistro
hypochondrio existente, post sinistra
naris hæmorrhagiam hora crisis factâ,
prosperius se habent.

163. Apostemate in gibbo epatis patien-
tes, per vnam trium harum rerum criti-
cant, aut per naris dextræ sanguinis flu-
xum, vel per salubrem sudorem, siue lo-
tium salubre, aut per duas harum, aut
quandoque per omnes. In concauo
autem si fuerint, secessu bilioso, aut si-
mili vomitu, vel sudore multo.

Pecto-

Pectoris, pulmonis, & partium vici- 164.
arum dolor per scretum plurimum
riticè soluitur.

Crisis laudabilis post materiæ com- 165.
pletam accidit digestionem, ea fit in
ora status, vel ante ipsam parumper.

Mors nihil aliud est, quàm morbi 166.
omnium supra naturam completum.
Nam cum natura vincit, rationi condi-
num est, vt saluetur ægrotus.

Propter morbi gravitatem, aut ipsi⁹ 167.
longitudinem, vel imbecillam virtu-
tem ante horam status, mori contin-
it ægrotum.

Morbi paulatim sanati nulla fit cri 168.
s vera: sed materiæ peccantis consum-
tio.

Mala crisis completa, & mala dimi- 169.
uta, paulatimque totum corpus defici-
ans, & illa quæ subitò fit absque eva-
uatione multa, aut exitura aliqua,
quatuor sunt crisis species, mortis si-
na demonstrantes.

Apostema nobile membrum occu- 170.
ans, cum plurima superfluitate crassa
viscosa-

viscosaque, repente ad corporis interiora effusa, & spirituum vias oppilante, aut natura in paroxysmorum statum morbi vehementia deiecta, aut virtus in ipsorum declinatione prorsus resoluta, tres sunt mortis species, quæ sine crisi contingunt.

171. Quibus ventriculus dolet hora crisis, cholerae vomitus aut phlegmatis accidit.

172. Caput, frontem, temporaque de recenti dolentibus, annum trigesimum quintum non adhuc attingentibus, sanguinis narium fluxus hora crisis contingit. Senioribus vero factis expecta saniem, ubi dolor praesertim ad vigesimum usque diem ab initio durauerit.

173. Sanguinis narium fluxus ex latere dolente tempore crisis factus, laudabilis iudicatur. Ex sano vero latere si fuerit, non reputatur salubris.

174. Quibus plus est humoris peccantis, pluribus accidentibus, & maiori agone hora crisis affliguntur.

175. Natura corporis ad crisin faciendam

dam se præparans insolito more, perturbat ægrotum, & grauius quàm antea, affligit totum corpus.

Vrinæ multæ, aut ventris obsequia, 176.
siue nimium sputum, vomitusue, aut mariũ fluor sanguineus, in morbi principio, siue in eius augmento, malam crisin futuram, & periculosam nunciant. In statu verò facta, prosperam & audabilem.

Materia ad exteriora tendens, per 177.
sanguinis è naribus fluxum, atque per sudorem, crisin fieri denotat. Si verò interiora petierit per vomitum, aut per ventris obsequia, mutatur.

Signa diuersarum cresium apparen- 178.
tia, varias crises fieri, ex multis corporum partibus, demonstrant.

Quæ à morbis post crisin relinquun- 179.
tur, recidiuos morbos facere consueuerunt.

Quibus crisis fit, nox, quæ accessio- 180.
nem præcedit, grauis, quæ verò subsequitur, leuior ferè solet existere.

Morbi acuti iudicantur intra dies 181.

G qua-

quatuordecim.

182. Quibus die septimo futura crisis est, iis vrina rubram die quarto nubeculam habet, cæteraque pro ratione.

III.

De Diebus Criticis.

183. Laudabilis totius corporis sudor, siue similis vrina, aut egestio multa, vel peccantis humoris vomitus, aut fluxus sanguinis narium, matricisue, aut menses scarum, siue exitura in molli carne magna, velut in emunctoriis, aut iuncturis quibusdam, siue in sedibus aliis facta, in diebus criticis, signa sunt laudabilia.
184. Quoniam crisis sæpius fit in horis grauiori febris, qui grauius affliguntur in diebus imparibus, in ipsis criticant. Qui verò in paribus, criticant in paribus.
185. Mortale signum apparens in quarto die morbi, malam crasin denunciat in septimo fieri. Si verò inter quartum & se-

Septimum ipsum nocumentum cederit non paruum, ad septimum usque non tardabitur crisis: sed in altero horum mediorum accedet crisis mala.

Die septima caue cibum exhibeas, 186.
In præcedenti immediatè septimum e eo minus quicquam, ne virtutem impedas, circa morbum his diebus ut plurimum occupatam.

Quò crudior, atque crassior humor 187.
Est: eò tardior crisis, & contrà.

Acuti morbi prima die non soluti, 188.
Soluuntur in quarta; & qui non in quarta, soluuntur in septimo; & qui non in septimo, in undecimo debent solui; sed qui non in undecimo, in die decimo-quarto fit eorum regularis solutio.

Crisis est velox, & vehemens motus 189.
Morbi ad salutem, vel ad mortem, cum accidentium difficultate. Nulla enim potius ægritudinis periculosior est, quàm ora crisis.

Morbus qui non est ex materia, non 190.
Incit crisin, ut qui sunt ex inanitione.

112 *Aphorismorum Medicin.*

191. Quatuor sunt, quæ Medicum in cognitionem crisis ducunt: motus materiae, virtus infirmi, species morbi, & tempus anni.
192. Sudor & vrina, pariter solutio ventris, sanguis, apostema, vomitus, sunt critica signa.
193. Si in diebus criticis æger incipiat dare, videndum est, ne æger perturbetur, aut cogatur ad aliud, sed omnino liber sit, cum bono animo sudet copiose, neque pluribus vestimentis cooperiatur.
194. Index septimi quartus, sequentis primanae octauus initium. Spectandus quoque est vndecimus, siquidem is secundae septimane quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus. Is enim à quatuordecimo quartus est, ab vndecimo septimus.
195. In diebus criticis non est natura impedienda, neque cum phlebotomia, neque cum medicinis solutiuis.

IV.

IV.

De Pulsibus.

Vt corporis affectus se habet: sic pul- 196.
s arteriæ cordis motibus incitatur.

Vndosus pulsus, atque insigniter 197.
mollis, futuros sudores indicat.


Pulsus in calida complexione, ma- 198.
gnus est, celer & frequens, in frigida,
parvus & tardus, in humida, profun-
dus, latus, inæqualis & mollis: in sicca,
angustus & durus. Hinc indicare potes
se complexionibus compositis.

Macilentorum pulsus, maior & for- 199.
tis est, pinguiorum pulsu. In his enim
pulsus arteriæ profundior est. In carnosiss
verò celer est; magnus & mollis.

Puerorum pulsus celer est & crassus; 220.
adolescentum magnus; senum parui,
tardi & tenues. Virorum pulsus fortio-
res, quàm mulierum, vno etiam maio-
res. Tardiores verò & tenuiores viro-
rum, quàm mulierum.

In Vere pulsus parvus & fortis; in 221.
estate parvus, celer & crassus; in autu-

mus fortis, mollis & tardus; in hyeme
tenuis & debilis.



APHORISMO-
RVM MEDICINA-
LIVM,

SECTIO SEXTA.

I.

De Victu.

1. **V**ICTVS rationem optimam esse
Medicinam, Diuinus Hippocrates
noster verissimè pronunciat.
2. Diætetica Medicina præstantior est
pharmaceutica & chirurgica.
3. Si sola victus ratione citra pharma-
cum mederi datur, nihil neque prius,
neque rectius.
4. Qui recta victus ratione viuitur, nec
vomitu, nec alui purgatione indigent.
5. Neque superuacua nutritione one-
randa,

anda, neque tenui corpora debilitan-
la sunt.

Cùm morbi noticiam habueris, se- 6.
cundum virtutis tenorem, & ægri con-
uetudinem diætare oportet.

Victus tenuis & exquisitus, in mor- 7.
bis longis semper, in acutis verò vbi
non conuenit, parum tutus. Rursum-
que victus qui ad extremam peruene-
rit tenuitatem, molestus: Siquidem q̃
ad summam plenitudinem perductæ
sunt repletiones, molestæ.

In victu tenui peccant ægroti, quò 8.
fit, vt magis lædantur. Siquidem quod-
uis peccatū grauius hîc, quàm in paulò
pleniori victu esse solet. Eadem de cau-
sa sanis etiam valdè tenuis, staturaque &
exquisita victus ratio parum rita, quia
errata grauiùs ferunt. Quare tenuis ex-
actusque victus paulò pleniori existit
maxima ex parte periculosior.

Cùm itaque morbus peracutus est, 9.
extremos protinus labores habet, sum-
meque tenuissimo victu vtendum est:
cùm verò non est, sed pleniorē victū

G 4 licet

licet exhibere, tantum de extrema vi-
ctus tenuis ratione remittendum, quā-
tō extremis morbis fuerit remissior.

10. Cum morbi vis est maxima, tūm vel
tenuissimo victu vtendum est.

11. Sed & ex ægroto coniecturam fa-
cere oportet, an is cum præscripto vi-
ctu perstet ad morbi vsque vigorem,
anvè prius deficiat, imparque cum tali
victu succumbat, quàm cedat morbus
& obtundatur.

12. Quibus itaque vigor statim futurus
est, tenuiter statim alere oportet: qui-
bus autem posteriùs, & in ipso vigoris
tempore, & paulò sub ipsum de victu
demendum. Antea verò plenius alen-
dum, vt ægrotus perferre queat.

13. In ipsis tamen exacerbationibus ci-
bum adimere oportet, nā præbere no-
xiū. Et cum per circuitus redeunt mor-
bi in ipsis accessionibus abstinendum.

14. Qui crescunt, plurimūm habent ca-
lidi natiui: itaque copioso cum ege-
ant alimento, abundè ipsis suppeditare
oportet, alioqui corpus consumitur. In
seni-

senibus verò inest caloris parum, paucis propterea succendiculis egent. Exiguus namque ignis fomitis extinguatur multitudine. Ob eandem causam nec senibus febres perindè acutæ fiunt: frigidum enim eorum corpus.

Ventres hyeme ac Vere natura calidissimi, & somni longissimi. Per ea igitur tempora plus cibi dare oportet, siquidem plus natini caloris habēt. Quò fit vt copiosiore alimento egeant, argumento sunt ætates & athletæ. 15.

Viçtus humidus cùm febricitantibus omnibus, tùm pueris maximè atque aliis, qui tali viçtu vti consueuēre, utilis. 16.

Quos etiam semel aut bis, aut plus minusve & minutatim alere conueniat, spectandum. Dandum verò aliquid tēpori, regioni, ætati & consuetudini. 17.

Æstate & autumno cibum copiosiorē ferunt difficillimè, Hyeme facili- 18.
mè, Vere minùs.

Quibus per statos circuitus accessiones fiunt, nihil dare, nec cogere, sed 19.

G s deme-

demere oportet ante iudicationes.

20. Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet, quæ verò breui,repentè.

21. Si à morbo cibum adhibens quispiam vires non recipiat, copiosiore alimento corpus onerari indicat: si verò modicè epulanti idem eueniat, vacuatione indigere sciendum est.

22. Impura corpora quò plùs nutriueris,eò magis læseris.

23. Vbi præter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum inde creari, indicat sanatio.

24. Eorum quæ confertim & celeriter alunt,celeres etiam excretiones esse solent.

25. Si à morbo bellè comedenti corpus non proficiat,malum.

26. Qui aduersa valetudine abundè initio comedunt, nec proficiunt, ii ferè tandem omnes in cibi fastidium incidunt: Contrà qui initio forti inedia vsi, cibum postea appetere incipiunt,invaletudine facilius liberantur.

Paulò

Paulò peior, sed suauior cibus & po-^{27.}
tus, meliori quidem, sed ingrato præfe-
rendus. Quæcunque enim cum volu-
prate assumuntur, ista ventriculus am-
plexatur & magis concoquit; sicuti illa
quæ displicent refugit, vnde nausæ,
flatus & fluctuatio.

Quibus tubercula ad articulos, vel^{28.}
labores post febres fiunt, ii cibariis plu-
ribus vtuntur.

In cibus offerendis, virium robur di-^{29.}
ligenter perpendendum.

Ventre constipato cibus non offera-^{30.}
tur: Sic enim cibus non potest descen-
dere, & sic fiunt exhalationes ad ca-
put.

In morbi principio æger cibandus^{31.}
est parcè, & victus hic est tenuis: in aug-
mento parcius, & est tenuior: in statu
parcissimè, estque tenuissimus; & in de-
clinatione modicè, ac modicus dicitur.

Qui ventriculum debilem habet,^{32.}
ille per diem sæpe nutriatur; & semel
parum cibi euchymi, qui sit facilis
concoctionis, assumatur, ne paucus sto-

G 6 machi

machi calor à cibi copia obruatur, & extinguatur. Idem de reconualescentibus intelligatur.

33. Ager semper tempore minoris afflictionis debet cibari: sic enim virtus circa materiam exuperantem minus est occupata, & cibum melius complectitur. Nonnunquam tamen in statu, ubi afflictio est intensissima, & accidentia vehementissima sunt, præsertim in corporibus siccis, & facile resolvilibus, cibum offerre cogimur, ne virtus prosteratur, ob immodicam spirituum ac caloris natiui resolutionem.

34. Corpora cholericæ, cum sunt sicca & emacida, ac valde resolvibilia, præsertim si in labore ac vigiliis vitam degerunt, statim sunt cibanda, etiam in ipso paroxysmo, & quacunque hora occurrit Medicus. Si enim non confestim cibo reficiuntur & humectantur, tum aut cadunt in syncopem, & moriuntur in paroxysmo, ob magnam resolutionem; aut fiunt confestim hæstici, ob magnam exiccationem.

Con-

Consuetudo etiam in præscribenda 35.
liæta consideranda. Nam crapulosis
non temerè est inedia iniungenda, &
tenuis diætæ præscribenda. Quicunque
enim error committitur magnus, ma-
ior in hoc fit, scilicet tenuiori victu,
quàm in paulò pleniori.

In morbis virtute existente debili, 36.
ob humorum & spirituum magnam
resolutionem, æger cibo reficiendus
est, aliàs virtus prosternitur. Virtus e-
nim, & non Medicus, curat morbos.
Sed quandò virtutis adest debilitas, ob
materiæ copiam virtutem opprimen-
tem, hic inedia imperanda est.

Panis lauetur cum aqua hordei, ad 37.
eductionem salis ac fermenti, quoniã
in morbis acutis exhibitio panis non
loti est nociua, & in apostematibus in-
trinsecis magis, quoniam facit ad ru-
pturam apostematis ante maturatio-
nem.

Quibus cibus in stomacho acescit, il- 38.
lis non est offerenda aqua hordei; & si
in eiusmodi frigido ventriculo offerre

G 7. volue-

volueris, tùm radix apii & parumpiperis addatur.

II.

De Regimine puerorum.

39. Quoniam eius naturam, à quo nutritur, suscipimus, bonorum morum nutrix, bonæque corporis dispositionis, ac mediocris ætatis, semper est eligenda.
40. Bono cibo nutrices si nutriantur, bonum lac generant, bonosque dant ipsi nutriti succos.
41. Solo lacte pascendus est infans, usque quò dentes anteriores producat.
42. Vt hædi lacte ouino nutriti pilum gignunt teneriorem; Et agni lacte caprarum aliti lanam ferunt duriores: sic nati alienis matribus educati, à propriis matrum naturis multùm discrepant.
43. Quæ suos fœtus deferunt, ablegantque à sese, & aliis nutriendos dant, vinculum animi atque amoris, quo parentes

res cum filiis natura confociauit, dirimunt.

Moderatus fletus ante pueri lactationem ad membra spiritalia dilatanda, cæteraque confortanda, & ad caput purgandum conuenit. 44.

Cùm ignem igni addere non liceat, 45. vinum propterea pueris non gustandum.

Vinum & cereuisia inimica sunt 46. pueris: Nam eorum capita malo vapore replent, & calefaciendo mentem eorum perturbant.

III.

De Regimine senum.

Senes omnes indigent exercitio 47. moderato, ne natiuus eorum calor extinguatur. Eorum enim calidum flabellari semper indiget. Cauenda tamẽ omnimoda quies, & motus admodum vehemens.

Senes immoderatè secundum quã- 48. rum, aut quale diætati, haud paruum incurrunt nocumentũ. Iuuenibus autem

tem maximis in peccatis minor fit læ-
sio.

49. Non omnib⁹ senibus est lac exhibē-
dum: sed solummodò iis, qui id benè
digerunt, & symptoma nullum inde
sentiunt in hypochondriis.
50. Cibaria temperata, concoctu faci-
lia, naturis senum præ cæteris conue-
niunt.
51. Subtilis substantiæ vinum prodest
senibus. Omnia enim membra eorum
calefacit, & sanguinis serum subducit
per urinam.
52. Carnium columbarum, turturum-
que & passerum usus, præ cæteris car-
nibus senibus, & iis quibus sanguis
modicus est, cum odorifero vino con-
venit. Biliosis verò & acutè febrienti-
bus nequaquam.
53. Plurimum falluntur, qui senum
corpora exiccanda esse putant.

III. De

IIII.

De vario genere ciborum, & potus.

Quò simplicior victus ratio, eò natura conuenientior. 54.

In omni re naturali est quædam vis naturalis, quæ res sibi conuenientes attrahit, ac repellit nociuas. 55.

Cibariorum quæcunq; natura sunt plùs iusto calida, biliosiora sunt; quæ verò frigidiora, hæc pituitosiora sunt. 56.

Nulla res attrahit aliquid propter ipsum attrahere: sed vt eo voluptuetur, ideoque citiùs fit attractio. 57.

Commune est hominibus, cæterisque animantibus, cor quidem à iecore, iecur verò ab intestinis, & ventriculo, nutrimentum attrahere. Nam membrum fortissimum trahit ad se conueniens ab imbecilliori & ad imbecillum suum superfluum mittit. 58.

Singula quæque nostri corporis membra, à similibus animalium membris, ab 59.

ab humana natura non longè distan-
tium, conueniens alimentum suæ crassi-
fufcipiunt; hac de causa cerebrum cere-
bro, iecur iecuri, & cor cordi conuenit.

60. Quibus æquale temperamentum,
his quantò iucundius fuerit quod com-
edunt; id tantò utique fit illis magis
nutriens.

61. Qui nimio cibo vtuntur, corpora
non augent.

62. Prospiciendum semper est, vt eorū,
quæ eduntur & bibuntur, respectu eo-
rum, quæ expelluntur, conueniens
semper feruetur mediocritas.

63. In omni nutritione, id quod nutri-
tur, oportet attrahere, & congregare
particulas sibi similiores, quæ sunt in
eo, à quo fit nutritio, hinc & illinc dis-
feminatæ. Simile ob id naturâ tendit ad
suum simile.

64. Quæ facilè digeruntur, facilè etiā
corrumpuntur. Durè verò digestibilia
difficiliter sunt alterabilia, & tardè cor-
ruptibilia.

65. Humidius alimentum, vt distribui-
tur

tur citiùs; ita citiùs etiam euaporat.

Quo acutiores morbi sunt, eò mi- 66.
nùs cibo indigent.

Quoniam omne animal necesse est 67.
nutriri, & ciborum substantia non sit
tota nutritiua, paratæ sunt aliqua cor-
poris particulæ ad superflui excretio-
nem, & eius expulsionem.

Panis fermentatus ex sano frumen- 68.
to arte debite coctus & conditus, &
conuenienti tempore comestus, galli-
narumque caro, & caput annualis hæ-
di, piscesque non viscosi, duri carne, &
aquæ liberæ, oua sorbilia recentia, gal-
lorum iuuenum testiculi, carnis succus,
& odoriferum vinum, alimenta sunt
boni nutrimenti, inter crassum & sub-
tile temperata.

Ex volatilibus optimæ sunt perdi- 69.
ces, cum omnibus montanis auibus,
gallinæ & phasiani, collumbæque syl-
uestres, carnes quoque porcinæ in sal-
tibus enutritæ, & similiter hædi. Super-
fluitate autē abūdant omnia paludosa
& stagnæa, siue non exercitata. Frigida
enim

enim sunt animalia vetera & recens
nata.

70. Cibariorum omnium, ipsæ porco-
rum carnes maximè sunt nutritivæ: ve-
runtamen crassioris succi, ac viscosioris
multis aliis sunt generativæ tardioris-
que digestionis.
71. Plus est alimenti in carne, quàm in vlllo
alio cibo.
72. Corpora humida parum comedunt,
plurimum egerunt, difficulter curantur.
73. Præstat cum diætâ potiùs curare, si
fieri possit, quàm cum pharmacis.
74. Inter domesticas quadrupedes le-
uissima caro suilla est, grauiissima bubu-
la.
75. Omne ferû animal domestico leui⁹,
& quodcunque humido cœlo, quàm
quod sicco natum est.
76. Ex feris quò maius quodque animal
eò robustior ex eo cibis est.
77. Omne animal quadrupes, si lactans
est, minus alimenti præstat.
78. Bouinæ, vrsinæ, ceruinæ, ac leporum
carnes, & præsertim veterum anima-
lium,

lium, atræ bilis excitant morbos.

Carnes caprinæ iuvenes per æstatē 79.
optimæ; per autumnum verò pessimæ.

Carnes porcinae malæ, suillæ verò se- 80.
mota cute aliis sunt meliores, subfrigi-
dæ tamen edendæ sunt.

Masculorum carnes, (exceptis ca- 81.
prinis) fœminarum carnibus meliores
habentur: Castratorum verò inter v-
trasque mediant. At castratorū volati-
lium omnium ambulantium carnibus
laudabiliore sunt.

Exercitatorum animalium carnes, 82.
non exercitatorum carnibus saniores
reputantur.

Omnium animalium interiora, ce- 83.
rebraque, & aues in paludibus degen-
tes, ac cicera recentia, nec non fabæ vi-
rides, & caro lactantis animalis, siue
non exercitati, atque etiam pisces, &
carnes anserum multorum sunt excre-
mentorum.

Animalium omnium partes ex- 84.
teriores, partibus interioribus, dex-
træque sinistris, prævalere dicuntur.

Cere-

85. Cerebrum comestum humoris pituitosi generatium est, ac facile putrescit, cui adeps & medulla non longè assimulantur.
86. Aurium, narium, cutis, gutturis, & similia cartilagineorum carnes pinguedine priuata cum labore decoquuntur, sanguinemque pessimum gignunt, ac modici nutrimenti. Labra tamen auribus laudabiliora fiunt. Lingue quidem nutrimentum mediocre, & lactantium etiam cures pauci viscosique alimenti sunt.
87. Peditantium, volatiliū, natatiliū oculi, ut pituitosi nutrimenti sunt; ita tardi descensus.
88. Pedes quadrupedum & genua, animaliaque vsualia in siccis desertis paucitia, paucorum sunt excrementorū.
89. Licet cor dum viuit sit plus cæteris membris calidum & sanguineū: mortuum inter cæteras corporis particulas vilissimas computatur, duræque substantiæ est, difficilis concoctionis, & tardè è ventriculo descendit.

Pulmo

Pulmo splene, iecore & renibus cõ- 90.
coctu leuior est, minùs tamen iis nutri-
mentum, & magis phlegmaticum præ-
tat.

Omnium animalium splenes mali 91.
sunt nutrimenti, atram bilem augen-
tes. Porcorum verò, cæteris minoris
sunt malitiæ.

Lactantium animalium iecora, plus 92.
veterum iecoribus approbantur, anse-
rum, anatum & gallinarum iecur,
quadrupedum iecoribus præsertim:
suillum verò cæteris peditantium plùs
laudatur à Medicis; difficulter tamen
digeruntur omnia, egerùturque tardè.
Digesta autem vbi fuerint, sanguinem
laudabilem gignunt.

Siccæ naturæ membra, velut cutis, 93.
nerui, venter, intestina, vterus, & alia
huiusmodi difficulter digeruntur, &
lentè à ventriculo exeunt, minùsque a-
liis corporis partibus nutrimentum, &
pituitosum gignunt, ob id dimittenda
sunt.

Vt erroris suspicio cuiuslibet rei 94.
cibalis

cibalis tollatur, quælibet cibaria debitis artibus præparari expedit, atque illis uti cum legitimis salsamentis; hac de re siccæ carnes & macræ elixandæ sunt, humidæ verò & pingues assandæ, nullæ verò frixandæ.

95. Fluuiatiles pisces, & præsertim petrii, si in aquis purioribus exerceantur, digeruntur ii facilè, & sanguinem medium generant.

96. Cibaria sua natura mala sunt: cæpe, allium, nasturcium, porrum, caules, vrtica, eruca, sinapi, & alia id genus.

97. Mali sunt omnia olera chymi, & pauci nutrimenti, augmentantes sæpè phlegma, interdum Melancholiam, & aliquando choleram.

98. Omnium frugum nutrimento maximè est ptisana; olerum sola lactuca; piscium, qui saxatiles dicuntur; panis qui fermentatus, & modicè durus atque salitus est, potio oxymeli, mulsa; vinumque tenue & album.

99. Excellentis qualitatis cibaria fugienda sunt penitus, aut contrariarum qualita-

qualitatum cibariis corrigenda.

Ciborum satietas nulli conuenit α - 100.

trati, multorum equidem corpora ad perniciosas deducit ægritudines, præsertim cum de malis cibis illata fuerit.

Lubrica, subtilia, concoctu facilia, 102.

ut cacochymica, velut fructus in eodẽ pasto cum crassioribus sumenda, ipsis anteponenda veniunt.

Cum priora semper sint præponen- 102.

da, & posteriora postponenda, eduliorum ad secessum velociora, digestu durioribus, & secessum tardioribus, legitime præponuntur.

Non sunt nociua vtilibus miscenda, 103.

um vtilibus solis absque nociuis possumus vti liberè.

Mensæ breuitas & bonorum cibo- 104.

um paucitas, magis quàm horum diuersitas, sana corpora faciunt.

In omnibus obseruanda est con- 105.

uetudo, ad mala duntaxat non perducit tandem accidentia.

Ut omnis suspicio corruptionis nu- 106.

trientium tollatur, ac sanitas cum pau-

H citate

134 *Aphorismorum Medicinæ.*

citare ac simplicitate seruetur, nihil quidem securius est, quam ciborum varietatem, & ipsorum multitudinem penitus effugere.

107. Nutrientia, quæ in regionibus conaturalibus crescunt, hominum illarum regionum temperaturis salubriora sunt, magis quam illa, quæ distantium ac diuersorum sunt climatum, ob id gallica vina Gallorum naturis, Italica Italorum conformiora putantur.

108. Cibus quò magis delectat cum accipitur, eò etiam maiori cum voluptate à ventriculo suscipitur, retinetur, meliusque quouis alio digeritur. Si vero abominabilis est, natura ipsum renuit, vomitus, fastidiumque causatur, & inflatio.

109. Horribilia in sapore vel odore humanæ complexionis aduersissima sunt, pessimique nutrimenti, ut excellenter styptica, acetosa, amara, acuta & salsa, eapropter si necesse fuerit his uti, modica quantitate, atque paucis vicibus ac repressis est utendum.

Vina

Vina naturæ aquosæ & substantiæ 110.
subtilis, urinas facilè mouent, purissi-
mum perindè dant alimentum corpo-
ri. Quæcunque verò crassa, potentiùs
nutriunt. Ad euehymiam, meliora odo-
riferæ, clara; sed caput feriunt. Recen-
tiora autem, & antiqua nimis, fugien-
da sunt penitus: illa enim superflue ca-
lesciunt, ista verò minime.

Vina aquosa omnia insensibiliter re- 111.
frigerant, urinam ac sudorem prouo-
cant, humectant, concoctionemque
iuvant, & paucissimum corpori nutri-
mentum afferunt.

Vetus vinum impinguatis contra- 112.
rium, album autem & subtile illis con-
uenit.

Dulce vinum non adeò, vt vinosum, 113.
capiti nocet, minusque mentem tentat;
iecur tamen & lienem infarcit, & in tu-
morem attollit, & iis qui amara bile ab-
undant, haud vtile est.

In ventriculo lacte existente, vinum 114.
bibendum non est, & econtrà.

Quoniam vinum ea, quæ in mem- 115.

H 2 bro-

136 *Aphorismorum Medicin.*

brorum ductibus inuenit, citò penetrare facit, ideò post pastum, aut laboriosum exercitium, siue cibos mali chymi, non est illicò assumendum.

116. Secundum varias corporum habitudines, varios mores, variosque affectus in ipsis vinum reddere solet. Nam id quidem immodicè bibiū alios iracundos, humanos alios, alios misericordes, audaces alios, alios eloquentes, aliosque taciturnos facit.

117. Dulce vinum albo minus vrinam cit, sed nullum aliud efficacius sputum promouet.

118. Fuluum vinum, nigrum & austerum, capitis grauitatem inducit, mentem tentat, & vrinæ, atque sputi exitum impedit.

119. A vino albo, & reliquis id genus, tum maximè abstinendum, cum alui excrementa & mollia, & ramentosa fuerint.

120. Cum vinum in acetum conuertitur, eius vinosæ partes acquirunt frigiditatem, & eius superfluitas aquosa, quando

quando ipsum putrefit, acquirit caliditatem. Hanc ob rem acerum est res composita ex partibus contrariis vltima contrarietate.

Aqua, cuius fons est ad orientem 121.
Solem, erumpens per liberum transi-
tum, & mundum, & quæ per puram
colatur arenam, caletque & friget ocys-
simè, omni ætati cæteris aquis longè sa-
lubrior & præstantior æstimanda est.

Aqua leuissima pluuialis est, deinde 122.
fontana, cùm ex humine, tùm ex pu-
reo, post hæc ex niue & glacie, granior
his ex lacte, grauissima ex palude. Eò
melior quoque est, quò celerius calefit
& frigescit.

Aqua quæ citò calefit & citò refri- 123.
geratur, leuissima.

Aqua frigida per se tardiùs permeat, 124.
& distribuitur, sed cum vino commix-
ta optimè penetrat, & sitim miti-
gat.

Incommoda aquæ hæc potissimùm 125.
sunt: Lienem & iecur attollit, fluctuat,
supernatat, tardè transmittitur, vtpote

H 3 li fri-

138 *Aphorismorum Medicin.*

si frigida, & concoctu difficilis est, non ducit aluum, nec urinam ciet.

126. Lac præbere capite dolentibus, febriculosis, & quibus hypochondria e-lata, aut murmurantia, & siticulosis ma-lum. Malum item quibus biliosæ deie-ctiones, febres acutæ, & copiosa san-guinis vacuatio facta est. Conveniunt verò tabidis non admodum valde febricitantibus, & febribus longis & lan-guidis, dum nullum ex supra dictis si-gnis adsit, & præter ratione extenuatis.

127. Quibus noctu bibendi est aviditas, iis admodum sitientibus obdormiscere bono est.

128. Æquali cibo & potu virtuti, debent vires corporis refici, & non superfluo opprimi.

129. Epularum amplitudo, & ipsarum di-uerſitas, frangunt corpus, & eneruant vires, hanc ob rem dimittendæ sunt. Varii namque cibi edantur licet faci-lius, grauius tamen decoquantur.

130. Saporum & embammatum delecta-menta, ad voluptatem magis, quàm ad
vtili-

utilitatem à cupidinariis primitùs ad-
inuenta fuerunt, quæ interdum pluri-
ma adferunt incommoda.

Cùm omnis excessus sit fugiendus, 131.
maximè hunc fugere oportet, ex quo
non modò corpori, verumetiam animi
damnum accidere potest.

Quoniam hominum corpora con- 132.
tinuò dissoluuntur, non solùm ab innat-
o calore, sed etiam extrinseco, necesse
est id, quod ab iis dissolvitur contin-
uò restaurari, & hoc cibus & potibus fit
crasi suæ similibus.

Nullum cibi genus adeò naturæ si- 133.
mile est, quin in se aliquid excrementi
habeat, ob id quodlibet corpus aliquo
semper indiget, quo tale secrementum
ab ipso educatur.

Quoniam omne simile suo nutritur 134.
simili; calida calidis, frigidaque frigi-
dis, & similia similibus nutriantur o-
porret.

Cùm vnusquisque secundum suum 135.
viuendi modū regendus sit, vsitata sto-
macho his assueto meliora iudicantur,

140 *Aphorismorum Medicin.*

et si multis inassuetis deteriora sint.

136. Temperata corpora cibis temperatis conseruantur : Distemperata verò contrariis ac distemperatis.

137. Omnia cibaria plus æquo superfluitates generantia, aut humores plus iusto augmentantia, ab omnibus sunt dimittenda, minuenda, aut ad minus non continuanda.

138. Secundum hominis naturam, ætatem, exercitium, anni tempus & morbi genus, victum mutare debes, modò addendo, modò demendo.

139. Calida & humida corpora cibum cæteris melius commutant, sibi que assimulant: Frigida autem & sicca, cæteris deterius.

140. Vt à liquore fœtido vas mundum inficitur, & contrà: sic à corpore mala qualitate affecto, boni succi cibi corrumpuntur.

141. Ægritudines acutæ & breues, tenuem diætam sustinent: chronicæ verò renuunt.

142. In quolibet morbi tempore, secundum

dum virtutis robur, ægri reficiendi sunt.

Virtute decoquendi cibaria debili 143.
existente, appetitusque carentia, varietate sollicitandus patiens non est, ut plus ciborum assumat, quam concoquere possit.

Quoniam nefas est augere malum 144.
malo, regimine morbis contrario diætabis ægrotantes.

Ciborum potuumque cibaliū me- 145.
dicatio illa, quæ fit medicinis puris, longè melior tutiorque esse creditur.

Multum laborantibus, cibi plures & 146.
crassiores conueniunt, parum pauci & subtiles, & mediocriter mediocres.

V.

De regiminis mutatione secundum quadrifariam temporum anni diuersitatem.

Hyeme cibi plurimum, potusque 147.
minimum sumere oportet. Sit autem

H s vinum

142 *Aphorismorum Medicin.*

vinum quàm meracissimum. Cibi panis, & omnia obsonia assa, oleribus per id tempus parcissimè vtendum est.

148. Vere potu largiore, vino diluto, cibis mollioribus, & parcioribus vti cōuenit.

149. Æstate molli cibo, potu dilutiore & largiore, & omnibus obsoniis elixis ali expedit; Oleribus etiam coctis & crudis, vt corpus refrigeretur & emolliatur.

150. In autumno cibi plures debent esse & sicciores, obsonia sicciora, pro temporis ratione, potus autem fortiores & meraciores.

151. Anni temporum discrimen diætæ varietate indiget, in frigidis calida, & frigida in calidis administranda.

152. In hyeme nutriendum actu calidum assumendum: in æstate actu moderatè frigidum.

153. Vespere & mane corpora reficienda sunt, æstate præsertim, cùm digestiuus calor his horis ab externo frigore roboretur.

Man-

Manducandi appetitu insurgente, 154.
illicò manducandum est.

Secunda mensa bono stomacho ni- 155.
hil nocet, in imbecilli acescit.

Leuior piscis inter saxa editus, quàm 156.
in arena, leuior in arena, quàm in
limo.

Pingua, quàm macra, recētia, quàm 157.
falsa, noua, quàm vetusta plus alimenti
habent.

Res eadē magis alit iurulenta, quàm 158.
assa, magis assa, quàm frixa.

In morbis acutis ptisana rectissimè 159.
cæteris, quæ ex frugibus constant, pul-
mentariis antefertur.

Non dabis ptisanam his, quibus ci- 160.
bus adhuc recens conclusus est, quibus
laterum dolor continuus, atque calidis
fomentis non leuatur, neque procedit
sputum; sed lentum & incoctum est.
Ptisanam quoque ministrare vetāt ve-
næsectio, medicamentum & clyster.

Aqua mulsa pulmonem inprimis 161.
lenit, sputum mediocriter educit, &
propter abstergēdi facultatem tussien-

H 6

tibus

144 *Aphorismorum Medicin.*

tibus quoque utilis est. Urinam efficaciter cit, nisi viscosum aliquid obstiterit, alui biliosa excrementa educit.

162. Aqua mulsa à ptisanæ sorbitione epota vehementer replet & inflat, visceraque in præcordiis lædit.

163. Mulieribus ficcior victus ex usu est, etenim cibus ficcus, ac potio meracior, carnes molliores habentibus idonea sunt.

164. Ex itinere fatigatis, vel laborantibus, aut à balneo venientibus, frigidus potus perniciosissimus est.

VI.

De Confortantibus.

165. Confortatiuæ confectiones, cum cibo, ante cibum, & post cibum, ad libitum ægrotantis sumi condecenter possunt.


166. Alimenta resumptiua, humectantia balnea, & quies mentis, corporis habitudinem reparant, accidentaliter diminutam.

Faci-

Facilius est potu refici,quàm cibo. 167.

Sobrietas & perfecta digestio cor- 168.
roborant membra conualescentis.

In confortantibus Electuariis & 169.
confectionibus malancholicis affecti-
bus, semper quoque vna humectans
medicamentum, vt conserua viola-
rum,&c.coniungatur.



APHORISMO-
RVM MEDICINA-
LIVM,

SECTIO SEPTIMA.

I.

De Medicamentis.

REmedia cognita non sunt nouis 1.
postponenda.

Fidere experimento citra ratio- 2.
nem,periculosum est.

Scelus esse, Arnoldus pronunciat, 3.
compositis medicamentis vt,cùm sim-

H 7 plicia

plicia iuvare possunt.

4. Sine noticia certa virtutum medicinarum, quibus indies utimur, impossibile est debite auxiliari iis, qui ipsis indigent.

5. Ad usum auxiliorum scire expedit Medico membrorum corporis situm, substantiam, colligantiam, usum, compositionem, numerum & magnitudinem.

6. Plurimum refert Medicum malignarum & incolumium medicinarum differentias ac virtutes scire, ut malignarum malitiam, dum iis uti convenit, dextere corrigere; Incolumitatem verè bonarum & salubrium roborare, & ad loca illis egentia apte dirigere sciat.

7. Ne pharmaci malitia nocumentum membris purgandis inferat, antequam exhibeantur, quibusdam ea confortanda sunt, atque viæ ipsorum aperiendæ, & materia peccans præparanda, quò virtus adiuta pharmaco ipsam è corpore faciliùs excludere valeat.

8. Qui methodum in omnibus nimium pertina-

pertinaciter exquirat, pariter cum morbo plerumque hominem de medio tollit.

Ad extremos morbos, extrema ex 9.
quisitè comparata remedia optima.

Satius esse anceps remedium, quàm 10.
nullum experiri, Celsus censet.

Ne cibus & medicina mutuò se im- 11.
pediant, altero in ventriculo existente,
alterum ministrare non licet.

Ægrotantis animum cùm videas 12.
medicinæ repugnantem, & ab ea planè
abhorrere, ad hanc accipiendam noli
ipsum inuitum compellere.

Cùm solutium aliquod recusaue- 13.
rit patiens, aliud, quò eandem materiã
peccantem euacuare possis, ministra-
bis.

Non omnibus eadem remedia con- 14.
ueniunt. Quid verò conueniat, videre
prudentis Medici est.

Opiata, nisi purgato corpore, siue 15.
hoc à natura fiat, siue etiam ab arte, &
nisi urgente necessitate adhiberi non
debent.

Capiti

16. Capiti frigidum epithema, emplastrumue, aut aliud simile applicatum, priusquam à cerebro calefiat, remouendum. Calida verò antequam frigescant.
17. Iecoris epithemata, & quæ fronti applicantur remedia extranea, cæteraque localia (vt vocant) remedia, purgato corpore, & ea particula, cui applicantur, tutius admoventur.
18. Peregrina remedia semper quærere, ostentationis indiciū. Chemicis verò uti, nisi chemica intelligas, periculosū.
19. Cū virtus illa sit, quæ morbos adimit corporis, si impotens, aut nimium debilitata fuerit, medicinam ad actum deducere non potest, quare refocillanda erit.
20. Semper cauendum, ne medicamenti calidum innatum, humidum radicale, vel princeps membrum laedatur.
21. Cū solutiūorum doses virtuti, naturæque indigentium semper debeant æquari, certam dosin cuiuslibet solutiui, ac

tiui, ac ipsius potentiam exactè scire
Medicum oportet, alioqui multos per-
ducet experiundo ad interitum.

Etsi pharmacorum doses determi- 22.
natæ à Medicis describantur: robur ta-
men virtutis & eius imbecillitas, alui-
que facilitas aut difficultas illius, fre-
quenter has variare solent.

Debita medici ordinatio nihil pro- 23.
dest ægrotanti, si vitio medicinæ, vel
pharmacopolæ vitietur.

Cùm sensus gustus exactiùs, quàm 24.
visus, aut olfactus, medicinarum facul-
tates apprehendat, ex saporibus certio-
ra ipsarum indicia, quàm ex coloribus,
vel odoribus, habentur.

Theriaca, similiaque antidota, seni. 25.
bus oppilationes habentibus, ventri-
bus præpurgatis, congruè ministran-
tur.

Vnica quandoque & simplex medi- 26.
cina melius morbis occurrit, quam ex
multis & diuersis composita.

Inter cibum & medicamentum hoc 27.
discriminis est: Nam ipsa medicina
corpus

corpus ipsum alterat, cibus verò corporis substantiæ similis ipsum corpus nutrit.

28. Frequens vsus pharmaciæ vires corporis frangit, seniumque accelerat.

29. Cùm fortis medicina recens tibi deficit, duplum veteris debilis loco eius erit administrandum.

30. Vna sæpe medicina in corporibus diuersis varios producit effectus, & hoc propter variam corporis dispositionem.

31. Torsionem ventris faciens, & non competenter soluens pharmacum præsumptum, clystere subductiuo, portione uè decocti mastice, aut aqua tepida iuuatur.

32. A pharmaco solutiuo succi peccantes moti, & non euacuari, alteram succorum massam citissimè inficiunt.

33. Quæ inter corpora, & medicinas concurrunt proprietates, experimento solo à Medicis dignoscuntur.

34. Quale est pharmacum epati absinthium; tale est spleni capparis cortex.

Et

Et quale epati eupatorium: tale est sple-
ni scolopendrium.

Natura repugnante Medicina nil 35.
prodest.

Medicamentis vti non urgente ne 36.
cessitate superuacaneum, & nocium
est.

Cognitis medicamentis vtendum 37.
est, quorum haberi copia potest, & quæ
non es expertus omitte. At hodiè pere-
grina quæque delectant.

Medicamenta pauca tibi tenenda 38.
sunt, & quorum operationes, & vires
iam multoties es expertus. Totius e-
nim multitudinis noticia est incom-
prehensibilis, ne cum per singula vo-
lueris inquirendo discurrere, multipli-
ci diuersitate distractus, nescias cui de-
beas adhærere.

Creber vsus pharmacorum, præfer- 39.
tim in primis annis, celerem inducit se-
nectutem.

Peccat is, qui cum possit mederi sim- 40.
plicibus, ad compositiones confugit.

Quantò plura confunduntur in 41.
com-

152 *Aphorismorum Medicina.*

compositione medicamina : tantò he-
berior laud dubiò eius redditur effe-
ctus.

42. Quæ naturæ amica sunt medicamina,
na, copiosiora & liberaliùs; quæ vero
aduersaria, administrato parcius. Est enim
Medicus adiutor tantùm naturæ
non destructor.
43. Sicut medicamenta, quæ propin-
qua membra respiciunt, in minori : ita
quæ remota concernunt, maiori quan-
titate donantur.
44. Fortis Medicina recidivam facit.

II.

*De tempore, & modo exhiben-
di medicinas.*

45. Lenitiuæ medicinae, non sunt hu-
morum agitatiuæ, ideò tutò in morbo-
rum principiis exhibentur.
46. Electuaria solutiua, simile suè medi-
cinæ, quouis modo exhibeantur, sunt
cibo præmittendæ, quia antequam ab-
soluant operationem, nunquam is
allu-

sumendus est. Vomitiua verò stomacho variis cibis repleto, tuti⁹ exhibētur.

Debilibus catharticiis superdormiē- 47.
dum non est. Talium enim vires, quæ
alioqui debiles sunt, somnus deprimit.
Fortia verò somnum admittunt, ut eo-
rum fortitudo debilitetur.

Medicinam solutiua crudam morbi 48.
existente materia, non oportet exhibe-
re, neque ipsam commouere in ipsius
principio, dum ipsa non furiat. Si verò
multa fuerit, aut etiam furiosa, ante sui
coctionem legitimè administratur. Nā
notus humiditatum in corpore vigen-
tium adiuuat Medicinam, quæ tunc
illas faciliè trahit.

Ne cibus indigestus à stomacho ad 49.
par ducatur, ipso cibis repleto, siue ca-
chochymico, syrupos, iuleposuè, nequa-
quam ministrabis: sed vacuo vel pur-
gato.

Tardiorē syrupi, vel iulepi descensū 50.
ventriculo fieri si cupias, pulueres ali-
quos prius administrato: si verò velo-
ciorē, ipsos pulueribus præpones.

Ca-

51. Catapotia inueterata & desiccata priusquam deglutiantur, humectanda sunt per noctem in aqua calida.

III.

De quantitate medicamentorum.

52. Cū prauos & superfluos succos volueris à cerebro, & membris à ventriculo remotis extrahere, maiores exhibebis pillulas, aut fortius pharmacum. Cū verò ab intestinis & viis communibus, minores & leniora cathartica.
53. Ne pharmaci præassumpti malitia in stomacho remaneat, lauatiuum iusculum aliquod, solutione completa optimum est propinare.
54. Omnia somnifera, soporifera uè per duas horas post cibum à peritis propinantur.

IIII. De

IIII.

De Purgatione.

Inter medicinas & corpora sunt 55.
proportiones, quæ non comprehen-
duntur nisi experimento, ergo multa
experimenta sunt experiunda, donec
inuenias, quod iunet.

Vbi pluribus egemus vacuationi- 56.
bus, debemus semper à mitioribus in-
choare, & tandē ad valētiora ascēdere.

Perpetuò vniuersalis euacuatio par- 57.
ticularem præcedat, ne aliunde in affe-
ctam sedem humores noxii raptantur,
vnde fiat nouissimus error peior prio-
ri.

Semper potius vtendum medica- 58.
mentis purgantibus in minima dosi,
quam summa. Quia tutius est peccare
in defectu, quàm in excessu.

Qui tempestiuè expurgari volunt, 59.
collecta in dies maiori humorum co-
pia; postea grauiùs cruciantur.

Cùm succum superfluum expur- 60.
gare

gare velis, ipsum solutione præpares, cum medicinis propriis, cibisque medicinalibus.

61. Solutiua fortia materiæ soluendæ concoctionem expostulant. Incoctam tamen euacuare satius est, quàm impedire naturam in succi peccantis æquatione.

62. Chronicorum morborum purgationes, peccantis materiæ coctionem expectant.

63. Cùm non minus ex humorum paucitate, quàm ex ipsorum abundantia nascantur ægritudines, qui confestim ad pharmacias confugiunt, in errorem incidunt manifestum.

64. Per intestina purgantur ea, quæ in sima iecoris parte sunt, quæ verò in gibba per vrinam, quæ in pulmone sunt, pertussim. Cerebri verò excrementa per nares.

65. Rectè inquit Mesue noster, istum esse gradum sapientiæ, vt ad medicinas fortes non deueniamus, nisi vbi debiles non contulerint.

Pur-

Purgantia, sine ratione, magna sæpè 66.
adhibere temeritas.

Natura semper intendit mundifica- 67.
re sanguinem, cum secernit quod offi-
cit.

Eucrasata & sana corpora nulla in- 68.
digent pharmacia, neque venarum se-
ctione: Discrasata verò earum altera,
aut ambabus sæpissimè.

Imbecilli existente virtute, ipsa ex- 69.
quisitam abhorret purgationem, o-
mniaque superflua. Natura igitur fortis
existens probè sustinet omnia: Imbe-
cilli verò facta, à minimis læditur, &
contristatur.

Quibus imbecillis ventriculus est, 70.
alui subductionem haud faciliter susti-
nent. Ii igitur clysteribus, vitiosos suc-
cos educantibus, soluendi sunt.

Malos succos habentibus, ac phar- 71.
macia, aut venarum sectione egenti-
bus, vacuationis repetitio tutior est,
quàm superflua simul, & semel facta.

Medicina calida alicubi admota, 72.
succos trahit à toto corpore, velut ven-
I rosa

158 *Aphorismorum Medicin.*

tolā sanguinem; hac de re si non præcefferit totius corporis purgatio, & membrum acutis curetur, ad illud materia adducitur manifestè, illicque firmatur, ut ab ea extrahatur tardiùs.

73. Flava bile peccante euacuationes fieri promptiores expedit. In phlegmate autem & melancholia tardiores.

74. Euaporatiua pharmaca multitudine existente in toto corpore, quibusdam particulis admota magis implēt, quàm euacuant. Hanc igitur & alias curans ægitudines, ac etiam phlegmones, nullo uti audeas euaporatiuorum, priusquàm totius corporis euacuatione usus fueris.

75. Succus graues deorsum tendentes per inferiora, leues autem per superiora purgandi sunt.

76. Ut maiorum venarum sectio minorum præcedere debet: sic materiarum communium euacuatio particularium solutionem præcedat.

77. Robustis existentibus virtutibus audacter utere euacuatiuis auxiliis, inu-

uali-

ualidis verò timidè. Solutiua enim fortia cum succis exuperantibus magnam spirituum faciunt solutionem.

Crudos succos habentibus torsiones plures inducit purgatio, nec multum dignum ratione euacuat. 78.

Humida atque calida corpora alui deiectionem faciliùs ferunt. 79.

Hyeme atque æstate ægrè venter soluitur. 80.

Secundum caulis decoctum ventrè soluere, substantiam verò eius eandem adstringere, compertum est. Quantò autem plus decoquitur: tantò fit eius aqua plus soluens, & substantia magis stringens. 81.

Terebinthi lacrymæ ad nucis ponticæ quantitatem datæ, non modò aluum citra noxam soluunt: sed viscera omnia, iecur scilicet, lienem, renes, pulmonefque abstergunt. 82.

Pinguioribus & humidioribus viris clysteres cōueniunt saliores, & tenuiores, senioribus autem, & qui astricto corpore, & tenuiore valetudine sunt, 83.

160 *Aphorismorum Medicin.*

expediunt pinguiore & spissiores.

84. Purgationes vt interdum necessariae sunt: sic vbi frequentes sunt, periculum adferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit.

85. Corpora oportet, vbi quis purgare voluerit, fluida facere, & si supra, sistere aluum, si verò infra, humectare.

86. Pueri & senes etiam si pleni humoribus: tamen non debent solui fortiter. Temperatè itaque procedendum est.

87. Immodica exinanitio vel plurimum febre excitat.

88. Aluus si vehementiùs fluat, aut saepiùs ducitur, hominem infirmit.

89. Ventrem deicere, vbi intestina apostemata sunt, damnatur.

90. Quibus praecordia tensa sunt, cathartica assumpta nocent.

91. Praegnantem citra quartum, aut ultra septimum mensem purgare, metus est.

92. Venam incidere, & simul pharmacum propinare eodem die, piaculum est, sed ne duo pharmaca propinare eodem

dem die conuenit.

Præcipuum tempus euacuandi est 93.
Ver: Extrema tamen necessitas legi ob-
noxia non est.

Sicut æstas cholerae: ita hyems phleg- 94.
mati euacuando, idonea est.

In alleuiatiua euacuatione non est 95.
opus digestionem. Fit autem clysteribus
ut plurimum, aut lenientibus medici-
nis.

Qui à fecum duritie constipantur, 96.
nisi clysterem præmiserint assumptis
pharmacis, torminibus vexabuntur.

Antequàm pharmacum perfecit 97.
operationem suam, comedendum aut
bibendum non est.

Frigidi humores vehementioribus 98.
pharmacis faciliùs euincuntur, calidi
verò temperatioribus.

Fortes, corpulentos valentioribus 99.
euacuato, pueros, fœminas, senes, ma-
cilentos debilioribus.

Iuuat ante pharmaci porrectionem 100.
percunctari laborantem, an vnquam
pharmacis vsus sit, promptè quoque, an

162 *Aphorismorum Medicin.*

difficulter resoluatur; Nam ad huiusmodi pharmaca potissimum sunt contemperanda.

101. Antequàm pharmacum propines, primum digerere materiam, conuenit, nisi in morbis pestiferis, & qui intra triduum perimunt.

102. In æstate vomitus magis prouocatur, hyeme verò pharmacis atque clysteriis opus est.

103. Qui in re Medica peritiores hodiè habentur, tempore æstiuo ante diem, brumali verò in die, exhibent medicamina.

104. Laborantes vitio intestinorum, aut internis abscessibus, aut ex præcordiis dolentes, fortibus pharmacis ne purgato.

105. Qui difficulter excernunt, & frigidis humoribus turgent, calidis & lenibus cibariis sunt reficiendi, scilicet carnibus pinguibus, cum petroselino, aut feniculo recenti coctis. Qui verò calidis humoribus sunt repleti, his attriplicem, mercurialem, betam, & brassicam cum

cum carnibus pinguibus dato.

Stomacho ieiuno pharmaca sumen- 106.
da sunt. Quod si calidi fuerit tempera-
menti, aut stomacho debiliori, ante
medicinā modicum aquæ hordeaceæ,
aut vini granatorum bibere iubeto. Et
si pedes frigeant, pannis calidis calefa-
cere prius procurato.

Si remissius fuerit pharmacum, lice- 107.
bit paululum indormire: si verò forte,
vnica tantum hora permittitur.

A pharmaci sumptione non statim 108.
est comedendum: sed lentè & tenuibus
cibis corpus est reficiendum.

Dum alius soluta est, nisi restringe- 109.
re velis, dormiendum non est.

Qui inter excernendum fame tanta 110.
urgentur, adeò vt videantur debilitati,
his nonnihil panis in vino infusi dare
permittitur.

Medicina si non operetur, per cly- 111.
sterem, aut per alia lenientia profligan-
da est.

Vbi pharmacum diarrhæam, aut dy- 112.
senteriam induxerit, statim syrupum

164 *Aphorismorum Medicin.*

myrtinum, cydoniorum, aut Rhabarbarum propinato.

113. Indicium est perfectæ euacuacionis, cùm siti immodica premitur patiens, & tormina multa torquent, aut spasmus.

114. Medicinam reuomentibus cum o-uo ad gulam adhibito succurrimus, aut tosto pane aceto priùs humectato. Iuuat etiam acetosum quippiam masticare; sunt qui extrema ligent, & stomacho cucurbitulas superimponant.

115. Celebrata excretionem brodium pul-
li cum saccharo ad abluenda intestina
dato, indè, qui optimè nutriunt ci-
bos.

116. Semper expedit paulatim ducere
quàm subitò.

117. Operosum est, quorum sana sunt
corpora, purgare. Torquentur enim
& subuertuntur, confestimque dissol-
uuntur.

118. Antequàm pharmacum demus, ex-
pedi priùs extenuare crassos & gluti-
nosos humores, vt faciliùs deiiciantur.

Inepti

Inepti sunt purgationibus, quicun- 119.
que obesi, quique multi sanguinis sunt,
& continuò animo deficientes, diffici-
les, & qui confestim, quavis oblata oc-
casione vomunt. Item pueri & senes,
mulieres, multum menstruis purgatæ,
quique puro sunt corpore.

Corpora aduersa valetudine diu ex- 120.
hausta periculose euacuantur.

Inturbationibus alui, & vomitibus 121.
qui spontè fiunt, si qualia oportet pur-
gentur, confert, & facilè ferunt: sin mi-
nus, contrà fit. Sic & vasorum deple-
tio, si qualem fieri oportet, fiat, confert,
& facilè ferunt: sin minus, contrà acci-
dit. Proinde & regionis & temporis, &
ætatis & morborum habenda est ratio,
pro quibus talia vacuari conueniat,
nec ne.

Athletarum plenior corporis habi- 122.
tus, si ad summum plenitudinis gradū
perductus sit, lubricus est. Neque enim
eodem permanere aut consistere po-
test: quum verò non consistat, nec iam
possit in melius proficere, superest vt

I s reci-

recidat in deterius. Quamobrem plenior illa corporis habitudo haud cunctanter est soluenda, quò corpus nouæ nutritionis initium capiat. Non tamen vsque eò vacuando pergi velim, vt vasa penitus in se confidant. Hoc enim tutum non est: sed quatenus natura ferret, eò vsque progredi oportet. Sic & extremæ vacuationes periculosæ: contraque repletiones, extremæ si fuerint, similiter periculosæ.

123. Quæ decernuntur decretavè sunt iustè, nec mouere, nec aliud quicquam nouare, siue medicamentis, siue aliis irritamentis fiat, sed omittere oportet.

124. Quæ educere oportet, quò maximè vergere videbuntur, ducito, viis ac locis vtiliter eò ferentibus.

125. Quæ matura, cocta que sunt, medicari ac mouere oportet, non cruda, nec per initia, nisi suapte cieantur impetu, id quod perrarè fieri solet.

126. Quæ vacuantur multitudine metienda non sunt, sed si quæ oportet, vacuentur,

entur, & facilè ferant: atque vbi ad ani-
mi deliquium educere conuenit, faci-
endum, si ægrotus par esse possit.

In morbis acutis rarò, & per initia, 127.
medicamento purgante vti oportet.
Nec verò id inconsideratè facien-
dum.

Si qualia oportet purgentur, con- 128.
fert, & facilè ferunt; si contraria, diffi-
culti.

Corpora cùm quis purgare volet, ea 129.
auxilia faciat oportet.

Incipientibus morbis, si quid mo- 130.
uendum videtur, moue. Vigētibus au-
tem quiescere, multò præstat.

Qui corporum salubritate sunt præ- 131.
diti, si purgante hausto medicamine
statim deficiunt, vt & qui prauo alimē-
to vtuntur.

Qui integra sunt corporis valetudi- 132.
ne, medicationes ægrè molestè que fe-
runt.

Prægnantes purgabis, si materia vr- 133.
geat, quadrimestres, & vsque ad septi-
mum mensem, sed has parciùs. Minore

168 *Aphorismorum Medicin.*

verò aut grandiore conceptu abstinerebis.

134. Purgantium medicamentorum vsu talia è corpore educenda, qualia spontè etiam prodeuntia, iuuant : Contrario verò modo exeuntia, sistenda.
135. Æstate superiorem potiùs, hyeme inferiorem purgare conuenit.
136. Sub caniculâ & ante caniculam difficiles sunt purgationes.
137. Graciles & ad vomendum faciles per supernâ purgare, nisi hyems adsit.
138. Ægrè vomentes, & modicè carnosos, quos eufarcos appellant Græci, infernè purgato, deuitans æstatem.
139. Obnoxios phthisi suprâ ne purgato.
140. Melancholicos infra vehementiùs purgabis, eadem ratione contrariam iniens vacuandi viam.
141. Purgandum in valdè acutis, si ad sui excretionem inuitet materia, eodem ipso die. Differre enim in talibus, malum.
142. Quibus propter læuitatem ventres cibi sunt incontinentes, hyeme suprâ

prà purgare, malum.

Qui ad veratrum non facilè suprà 143.
purgantur, eorum corpora ante potio-
nem copiosiore alimento & quiete prę-
humeçtanda.

Poto elleboro corpus mouendum 144.
potiùs, quàm somno tradendum, aut
quieti. Nam vel nauigatio indicat mo-
tione turbari corpora.

Cùm elleborum citare voles, moue 145.
corpus: cùm verò sistere, somnum con-
cilia, nec moue.

Elleborus periculosus, sanas carnes 146.
habentibus. Conuulsionem enim in-
generat.

Non febricitanti cibi fastidium, cor- 147.
dis dolor, vertigo tenebricosa, & oris a-
maritudo, purgatione per superiora o-
pus esse significant.

Supra septum transuersum dolores, 148.
quicunque egent purgatione, per su-
perna purgandum esse significant. Qui
verò infrà sunt, per inferna.

Qui potione medica, dùm purgan- 149.
tur, non sitiunt, ipsorum purgandi finis

I 7 non

170 *Aphorismorum Medicin.*

non fit, donec sitiuerint.

150. Si citrà febrim tormina adsint, & genuum grauitas, & dolor lumborum, inferna purgatione opus esse significant.

151. A medicamento poto cōuulsio mortifera.

152. Si senibus suprā modum purgatis singultus accidat, non bonum.

153. In morborum principiis, quando materia est multa, vel cū materia valdè est maligna, ipsa est minuenda euacuatione minoratiua, ne natura ob materiæ copiam succumbat, vel, ne ob materiæ malitiam natura prosternatur. Nam materia iam minore facta natura reliquias faciliùs superare, & conquerere potest.

154. Eradicatiua euacuatio sæpè etiam per plures perficitur euacuationes minoratiuas.

155. Nullum deiectorium medicamentum, antequàm humorum crassities sit attenuata, & digesta, & viæ per quas expurgari debet apertæ sunt, exhibendum est. In

In morbis acutis materiæ purgatio 156.]
in principio conceditur, quia materia
tenuis est, fluxilis & cathartico obse-
quens. In diuturnis verò detestatur, an-
tequàm humores frigidi sint attenuati,
dissecti, deterfi & fluxiles redditi, ac
meatus reſerati.

Aleuioribus incipere, & procedere 157.
ad fortiora, est ordo sapientum.

Ne æger assumptum catharticum 158.
vomitu reiiciat, panis assus in aceto
maceratus, naribus admoueat, extre-
ma deligentur, & cucurbitula umbilico
affigatur.

Quando urinae inter initia febrium 159.
fuerint tenues, ægrum non purgabis,
sed potiùs, si videbitur, clysterem ad-
hibebis. Si verò in principio urinae ex-
istunt crassæ, habentes nebulam albam,
hîc annuëtibus cæteris purgabis. Nam
urinae tenues cruditatem insinuant,
crassæ verò materiam aliquo modo co-
ctam esse indicant.

Medicus in curandis morbis Naturã 160.
ducem sequi debet. Hæc nunquàm
in princi-

in principio commodè humorem exuperantem, dùm crudus adhuc est, euacuat, expellitque. Sic & Medicus principio humoris coctionē instituat, postea euacuet, & in declinatione sudorē prouocet, naturam Ducem imitatus.

161. Quandò pura cholera exuperat, illa statim à principio est euacuanda, nulla præmissa digestionē, quia materia turgēt, furiosa & circumflua est. Postea refrigerantia & humectantia offerantur, ut inspissetur, quia est humor calidissimus & siccissimus. Si enim hic attenuantia offers, humor fit tenuior & fluxibilior, vnde periculum est ne caput petat, & fiat soda aut phrenitis, aut altius in poris membrorum immergatur, ut postea difficulter possit curari.

162. In morbis chronicis, si à principio fortioribus utimur catharticis, tùm id, quod subtile est, euacuatur, crassum verò in corpore relinquitur. Sic in epate effcimus maiores obstructiones crassis humoribus ad angustas vias attractis.

Post

Post catharticum exhibitum vri- 163.
nam contemplato, hæc si fuerit tenuis
& pauca, & si fuerit grauitas seu dolor
in aliquo loco, insinuat oppilationem
esse factam. Præterea humores prau
moti permiscantur cum bonis, vnde &
boni corrumpantur necesse est.

Præu succus si sanguini est permi- 164.
xtus, primùm humor ipse digeratur,
postea euacuetur, tandem vena secetur.

Humorem vitiosum sanguini esse 165.
immixtum, aut exuperare cum sangui-
nis copia, constat ex vrina multum ru-
bea & crassa, & ex colore corporis ru-
beo, habitudine carnosâ, & venis reple-
tis.

Aluo constipata nequaquam pharmacum 166.
purgatorium offeratur, sed prius aluus
clystere suppositorio, vel cibo hume-
tante emolliatur.

In capitis dolore, & oculorum affe- 167.
ctibus, quam diu capitis grauitas ad-
fuerit, tam diu per interuallum eua-
cuatio est repetenda.

Quando membrum, à quo purgare 168.
inten-

174 *Aphorismorum Medicin.*

intendis, dolore intenso molestatur, non offeratur catharticum, donec dolor mitigatus sit.

169. Quando post catharticum assumptum succedit aliqua alleuiatio, signū est humorem noxium esse euacuatum. Facilitas enim euacuationis significat materiam fuisse coctam & digestam, quæ euacuata est. Sic etiam constat, materiam sufficienter esse euacuata, vbi nulla grauitas in loco affecto amplius sentiatur.

170. Macilentia & raritas corporis, euacuationem corporis prohibent.

171. Die secundo à purgatione æger ingrediatur balneum, vt fumi ab humore moto ad cutem eleuati, euacuētur per cœcam trāspirationē. Prætereà balneū humectat corp⁹ à cathartico desiccātū.

172. Qui cathartico vti vult, ille præcedente die vtatur diætā humectante, & leniente aluum.

173. In tussī vehementissima, ob catarrhū orta medicamētis purgatoriis opii gr. ii. addantur, vt materia sic crassior fiat,

fiat, & somn⁹ prouocetur. Idē facias in
ileo & colica, vt dolor sic mitigetur.

In morbis chronicis paulatim & sæ- 174.
pè euacuatio est repetenda, & digestio
vna cum membri confortatione: sem-
per enim à leuioribus est incipiendum,
& ad fortiora procedendum.

Cùm stomachus solus est affectus, 175.
cathartica vehementia detestantur, le-
uissimis itaque vtendum purgantibus,
ne plùs prauorum humorum ad sto-
machum attrahatur.

Quando ægri neque venę sectionē, 176.
nequealui purgationem admittere vo-
lunt, tùm diætā tenui vtantur, clysteres
iniiciantur, Epompholica vmbilico
imponantur, ac suppositoria ventri in-
dantur.

A sanguinis missione, aut purgatio- 177.
ne, æger boni succi eduliis nutriatur, ne
rursus in corpore aut crudi, aut prauī
humores coaceruentur.

A purgatione absterfuo aliquo vre- 178.
re, vt iusculo pisorum, vel prodio pulli
cum

176 *Aphorismorum Medicin.*

cum saccharo, vt sic abstergatur, & deorsum trahatur, quod orificio stomachi adhæret, & vt medicamento qualitas calidior temperetur. Sic etiam refert post absterfuum, succum aliquē stypticum exhibere, vt granatorum, vel arantiorum acetosorum, ne stomachus materiam aliundè recipiat.

179. Vbi purgatio cœpit, à ptisana abstineto. Indè enim pharmaci vis exoluitur. Quia abstergendo & abluendo præcipitat catharticum, vt ampliùs suo officio fungi non possit.

180. Post cathartica assumpta loco abluendi, offeratur brodium macri pulli, & nō aqua hordei, ne ad vrinæ vias transeat.

181. Quandò post fortem vacuationem aluus adstringitur, tūm simplici tantūm oleo iniecto aluus leniatur.

182. A sumpto cathartico æger quiescat parum vt natura amplectatur pharmacum, agatque in istud, tandem confert mediocris motus, vt humores fundantur,

tur, fluxilesque fiant, & expultrix vis excitetur.

Quàm diu medicina operatur, non 183.
dormiat, nisi effrenitet, & voluntas fuerit, ut restringatur.

Quando humor ille, qui infestat, 184.
purgatur, confert, & æger se ipso leuior fit. Quando verò alterius humoris, & non eius, qui molestat, & noxius est, fit euacuatio, sequitur anxietudo, & æger fit debilior, ac quandam afflictionem sentit.

A sumpto cathartico æger in tem- 185.
perato degat loco, & nequaquam superdormiat quando medicina operari incipit, quia somn⁹ retinet omnes fortes euacuationes, excepto sudore.

A sumpto cathartico æger neque bi- 186.
bat neque comedat, donec pharmacū suam perfecerit operationem, ne natura à sua operatione ad cibum ac potum auertatur.

Horis quatuor elapsis à cathartico 187.
assumpto, cibum sumere conceditur à Medicis.

Cathar-

178 *Aphorismorum Medicin.*

188. Cathartica comòdè in aurora offeruntur.

189. A sumpto cathartico patiens maneat in camera fenestris clausis, vsque quò compleatur medicinæ operatio. Quia ex præsentia luminis cathartici operatio impeditur, debilitaturque. Est enim pharmaci proprium trahere à circumferentia ad centrum, aëris autem luminosi, auertere sanguinem & spiritus à centro ad circumferentiam.

Quando peracta purgatione accidit tenebræ, tunc clyster lauatiuus ex aqua hordei administratur, vt sic cathartici reliquiæ, quæ adhuc in recto intestino vniuersæ sunt, abluantur, ne amplius virtutem expultricem irritent.

In tempore calidissimo, & frigidissimo, nequaquam fortia purgatoria medicamenta exhibeantur.

Immodica ventris euacuatio fit, aut ob materiæ multitudinem ad fluxum iam paratæ, ac dispositæ, quæ modica commotione facta, cumulatim prorumpit, aut venarum debilitatem, aut ori-

orificiorum venarum amplitudinem, aut catharticum acutum adhærens, aut aërem frigidū, materiam ad interiora repellentem.

Spasmus fit ob cathartici venenosam 193.
qualitatem pertingentem ad nervos, quam refugientes contrahuntur, vnde spasmus. Aut fit ob immodicam inanitionem nervis scilicet exiccatis.

In colica, & ventris obstructione, 194.
seu aluo dura existente, nequaquam solutiva per os exhibeantur, donec alvus clystere lenitus sit. Si enim statim à principio aluo constipata existente, catharticum per os offers, tūc materia attracta ad intestina vbi per inferiora non potest excerni, tūc plerumque regurgitat ad membra nobilia, aut materia mota euaporat ad cerebrum.

Cathartica quæ melancholiam pur- 195.
gare debent, semper debent esse, cum lenientibus & humectantibus, permixta.

In Melancholicis affectibus purga- 196.
mus comodiùs potionib⁹, quā pillulis.

In

180 *Aphorismorum Medicin.*

197. In hecticis, phthisicis, & extenuatis corporibus fortia cathartica detestantur, sed benedicta pharmaca, infusiones, & leues clysteres admittuntur.
198. Quando humores crudi in corpore exuperant, neque vena secanda, neque purgandum, neque exercitandum, neque etiam lauandum est.
199. Pillulas capitales, quæ maiores reliquis esse debent, per duas horas à leui cœna circa introitum lecti offerimus.
200. In vlceribus, apostematibus ac vitiis renum & vesicæ, materia a viis vrinæ est auertenda, ad intestina lenitiuis vt flore cassiæ, & hoc in forma boli, & non in forma potionis. Nam potus mouet ad renes.
201. Medicina eradicatiuè euacuans nūquam exhibeatur, donec apparuerit materiam fuisse digestam, quod constat ex mediocritate coloris & substantiæ vrinæ, & eius nube seu hypostasi.
202. Hydragogis vtimur & in ascite,
& in

& in albis menstruum profuuiis, & in his, qui fluidis vlceribus affecti sunt.

In morbis acutis aut peracutis, materia vt plurimum est mobilis, ideò statim à principio eradicatiuè euacuare licet, vel saltem bonam minorationem facere, & postea residuum digerere & euacuare.

Cathartica cum aqua hordei nequam offerantur. Quia aqua hordei abstersione sua efficit, vt catharticum nihil operetur.

Quando timetur fluxus hæmorrhoidum, ob vsum aloes, tùm modicum addatur tragacanthi, ne ano noceat.

Eradicatiuè purgare non licet, anrequàm materia sit digesta & cocta, quod ex vrina cocta constat. Quando verò materia est valdè furiosa, tùm statim materia eradicatiuè est purganda. Materiam autem valdè esse furiosam constat, vbi morbus in vltimeo est acutissimus, id est, vbi morbus acutissimus est. Hic enim humores sunt subtilissimi & fluxiles.

K

Eua-

207. Euacuatione minoratiua vtimur in principio ante digestionem. Eradicatiua vera in statu completo ; hic enim materia est concocta.
208. In omni euacuatione melius est infra subsistere, quàm exquisitissimè euacuare.
209. Rhabarbarum in substantia damus, quando post solutionem querimus stypticitatem ventris. In infusione verò non est stypticitas.
210. Scammonium stomacho, febrientibus, & cordi est infestissimum.
211. Cathartica cum aqua hordei non sunt offerenda, quia eorum operatio inde impeditur. Abstergit enim cathartici vestigia, ac qualitatem eius obtundit. Ideò Mesue dicit, si Medicina soluit ultra, quàm oportet, aqua hordei calida inter cætera frangit medicinæ audaciam.
212. Catapotia & bolos formamus, cum à longinquis partibus trahendum est. Potiones potiùs, cum vias alimenti primas inanire studium est.

Gra-

Gracilibus, qui non aluntur, ac pur- 213.
gatione indigent, his omnibus serum
exhibendum, nec sale, nec quopiam
medicamento adiecto.

Qui euacuatus est, non debet festi- 214.
nare ad cibos multos ac crudos capiē-
dos, quoniam natura eos incoctos tra-
het, quòd si aliqua vi cogimur id face-
re, id quidem sensum ac paulatim fiat,
adeò vt ordinatè res procedat, & quod
corp⁹ ingrediatur sic optimè cōcoctū.

Pharmacū purgatorium inducit vo- 215.
mitum, vel ob stomachi debilitatem,
vel medicinæ horribilitatem, quòd sci-
licet abominabilis sit, vel immodera-
tam alui excrementorum siccitatem,
vel canalium angustationem, vel deni-
que ventositatem subleuantem.

Balbutientes sunt fluxui ventris ex- 216.
positissimi, ideò fortissimum medica-
men solutivum his offerendum nō est.

Qui pharmaco non fuit antea vsus, 217.
neque ipsum potauerit, nequaquam
debet medicus exhibere ei medicami-
na vehementer soluentia.

K 2

Si

184 *Aphorismorum Medicin.*

218. Si quis validum hauserit catharticum, satius erit post illud dormire antequàm operetur, quoniam tunc melius suo fungetur officio. Si verò id debile fuerit, satiùs erit à sumpto pharmaco non dormire, quoniam natura medicamentum id concoquet.
219. Omne catharticum soluit primò humorem sibi proprium, deinde cum qui magis exuperat, tenuiorque est, ridentem & reliquos, iuxta hunc ordinem, præter sanguinem, quem quidem natura postponit atque custodit.
220. A sumpto cathartico refert odorare mentham, rutam, citonium, aquam rosaceam, addito nonnihil aceti, hæc enim nauseam prohibent.
221. Quando pharmacum purgationem nō fecerit, malique casus subsequuti fuerint, incidere venam postea par est, imò etiam post duos aut tres dies: Nam nisi id fiat, timédum erit, ne humores ad aliquas principes partes se conuertant.
222. Agaricus, in paralyfi & neruorum passionibus, singularis est medicina.

Agar-

Agarici infusio tutior est, quàm ipsius substantia, nisi velimus prouocare vomitum. 223.

Cùm digestio in vrina apparet, tùm oportet materiã euacuare per eam partem, ad quam declinare videtur. 224.

Particulares euacuationes sequi, & non præcedere debent vniuersales euacuationes repletione præsentē. 225.

Clysteris vsus summè confert, non tam in acutis, quàm mitibus febribus. 226.
Clyster enim lenitiuus febris acumen remittit, vt alui excrementa, quæ sua euaporatione cor & caput offendunt, euacuet.

Et si fortes clysteres in febribus de-
testantur: tamen in mitioribus febribus, vbi magna adest frigidorum & crudorum humorum copia, aut si periculum adest apoplexiæ, tùm coactè licet vti acutioribus clysteribus: sic etiam fortioribus clysteribus vti licet, vbi alui excrementa fuerint vehementer exiccata, & magna obstructio adest in intestinis. 227.

K 3

Quando

228. Quando enemata iniicis aluo, tùm
semper cura, vt de liquore ad minus
duæ vnciæ maneant in sacculo, ne ven-
tositas vnà impellatur intra intestina
vndè dolor. Antequàm autem enema
iniiciatur, canalis sacculi benè priùs o-
leo inungatur.
229. Stomacho ieiuno nequaquàm cly-
steres iniiciantur, ne clyster ad superio-
ra, ad stomachum scilicet, trahatur, ne-
que etiam stomachus sit nimium re-
pletus, ne cibus crudus ad inferiora tra-
hatur. Clysteres itaq; iniiciantur, quan-
do stomachus non multum est cibo re-
pletus, neque etiam nimium inanitus.
230. In conualescentibus, quando aluus
adstricta est, his aluus ducenda est, solo
oleo oliuarum per inferiora infuso.
231. Clysteres non sunt vltra vnā ho-
ram in ventre dimittendi.
232. Corpore crudis succis repleto, ne-
quaquàm acutum iniiciatur enema, ne
commota materia fiat euaporatio, &
ad cor ac caput, indè aut syncope, aut
foda.

Fortia

Fortia clysteria & suppositoria iniiciantur in apoplexia & paralyfi, quia virtus est sopita. 233.

Ultra tres clysteres per diem non iniiciantur. 234.

Enema non sit actu frigidum, hoc enim ano, vesicæque nocet, ac flatus excitat. 235.

Iniecto clystere tussis & sternutatio detestatur. 236.

Clysteres ubi nolunt egredi, reuocentur suppositoriis ano insertis. 237.

Clysteres calidi iniiciendi. Eorum verò calor sit, qualis est urinæ modò emictæ, aut lactis modò mulcti. 238.

Accidit nonnunquam quòd clyster non vult ingredi ob flatus in intestinis existentes, repellentesque enema, hîc caue violenter impellas enema, sed bis aut ter iniectionem eius iterabis. Sicque fortassis ventositas emissâ excretaque fuerit. 239.

Quando in intestinis magna est opilatio, tûm non acuti: sed tantùm mollificantes iniiciantur clysteres. 240.

K 4

Per

Per os verò lenientia medicamenta exhibeantur, extrinsecus autem mollificantia & humectantia administrantur.

241. Clysteres nequaquam frequententur, imò intercedant inter ipsos tres vel quatuor horæ.

242. Quibus intestina sunt acuti sensus, hîc clysteribus parum salis iniiciendum est, si verò hebetis, plus.

243. Accepto clystere æger cubet in dorso, si lumbi dolent, aut in latere, si latus: aut in ventre, si venter.

244. Suppositoria non excedant longitudinem septem digitorum in transverso.

245. Non probantur suppositoria, quæ tres aut quatuor tantum digitos longa sunt, sic enim horum virtus non potest pertingere ad superiora, incitando expultricem.

246. In morbis Melancholicis Melancholia sæpius est purganda, donec humor euacuatus sit, quia atrabilis propter suam frigiditatem & siccitatem difficulter purgatur & mouetur.

In

In Melancholia ut plurimum simul 247.
peccat phlegma cum melancholico hu-
more, & hoc accidit ob eorum indige-
stionem: Idèd autores plerumque cum
solutius eorum permiscet vnà phleg-
ma euacuantia.

Lienis excrementa solum per aluum 248.
sunt euacuanda, & non per sudorem,
sicuti materiae epatis.

Omnia quę siccandi vi prędita sunt, 249.
in omnibus melancholicis morbis de-
testantur, ut sunt balnea aërea, thermæ,
fortes fricationes, vigilię, diuretica, ci-
bi acuti, ut piper, sinapi, &c. & vehe-
menter salita.

Quando in ventris cruciatibus cly- 250.
stere iniecto dolor non mitigatur, tum
certum est, aut materiam seu flatum in-
ter intestinorum membranas, aut in in-
testinis superioribus existere.

Quando clysteres fortes, antequam 251.
materia cocta est, iniiciuntur: accidit sæ-
pè soda, syncope, & difficultas anhel-
tus, ob materiam motā & non euacua-
tā, à qua fit euaporatio ad cor & caput.

K 5

In

252. In principio nequaquam fortia enemata iniiciantur, ne pravi humores in ambitu corporis existentes retrahantur ad intestina, hi si acuti fuerint, excoriant plerumque intestina, unde dysenteria.
253. Quando in clysteribus colocynthide uti volueris, tum in decoctione in petiam illigata imponatur, ne scilicet intestinorum tunicis adhæreat.
254. Quando enema injectum non operatur, ob virtutem sensitivam hebetem, tum suppositoria attrahentia clysterem adhibeantur.

V.

De Curatione in genere.

255. Principiis obstandum, & occasiones auxiliorum nunquam negligendæ.
256. Multum ad curationem ægri natura & corpus faciunt, nec omnes qui se curari passi sunt, continuo convalescunt. Morbi enim à medicis omnes curari non possunt. Aliàs enim anteirent D E I
omni

omnipotentiam Medici.

Omnes infirmos sanos facere, est 257.
impossibile.

A fortioribus morborum indica- 258.
tionibus, ipsorum curatio semper au-
spicanda est.

Quot sunt morborum species: tot 259.
sunt curationum variationes.

A ratione certa nunquam discedē- 260.
dum, etsi nihil prodesse videatur.

Corpus medica materia curatur: spi- 261.
ritus autem aëreus, sanguinis vapor, &
quasi corporis & animæ vinculum, aë-
reis odoribus, sonisque & cantibus tē-
peratur & alitur.

Satius est aliquibus membrum pu- 262.
tridum auferre, quàm permittere, ut
morbi vehemētia reliquum corpus in-
ficiatur.

Prætorum inquisitio in morbo- 263.
rum cognitione, multum iuvat Medi-
cum.

Abque certa morbi noticia vix, aut 264.
nunquam securè & salubriter potest
curare Medicus.

265. Indicatio, id est, morbi & remedii collatio, actioni prælucere debet. Nihil igitur Medico instituendum absque indicatione.
266. Qui calidam infrigidat ægritudinē, ultra id quod oportet, sanatiuam excelsens temperaturam, alteram inducit ægritudinem, nimirum frigidam. Vt igitur hoc non fiat, eius corporis, quod curatur, temperaturam nouisse oportet, ut quantum amota est eius ægritudo à recta temperatura, adhibeatur ei æqualis medicinæ mensura, qua suo auxilio æqualiter infrigidetur.
267. Ignorantibus gradum distemperaturę corporum, aut medicinarum morbis appropriatarum, rectè curandi viis prorsus concluditur.
268. Quot sunt naturales corporum, vel membrorum functiones: tot curis conseruatiuis & restauratiuis egent.
269. Quoniam cum pituitosum, tum ferosum excrementum in corporibus senum facile colligitur, sæpius ipsorum
vrinas

vrinas mouere, & aluum soluere conuenit.

Etsi in senili corpore aliquatenus ^{270.} fulciri possit imbecillitas: tamen ubi totum collabi cœperit, nihil agitur remediis.

Quoniam remota causa, facile re- ^{271.} mouetur effectus in omni morbi genere causam morbum facientem, prius abscindere decet.

Quanto gradu à medio corpus dis- ^{272.} temperatum distat: tanto gradu medicina contraria, vt ad illud reducatur, indiget.

Ægrotantis proprietates nosse, & ^{273.} quæ vel amica, vel inimica sint naturæ, intelligere oportet.

Membris affectis, qualitatibus di- ^{274.} uersis existentibus, vtpote iecore calido, & stomacho frigido, necessaria est medicina composita contrariis qualitatibus, vt valeat contrarios membrorum affectus alterare. Similem autem dyscrasiam habentibus, omnibus corporis partibus similis est curatio. Dissi-

milen verò dissimilis.

275. Methodica curatio ista censenda, dum Medicus quid primò, quid secundò, quid tertio agendum sit, ut aegrum ad optatam sanitatem perducatur, intelligit.
276. Iisdem remanentibus, eadem iuvantia semper continuanda sunt. Novis verò morbis nova conveniunt antidota parare.
277. Quaecunque iam factos curant affectus, hæc & antequàm fiant prohibent.
278. Simplici morbo medela convenit in virtute simplex: composito autem, composita; Nam secundum causæ compositionem medela componi debet.
279. Curatiuæ morborum intentiones ex corporis complexione, ipsiusque ægritudine, & aëris circumdantis natura, semper accipiendæ sunt.
280. Non minùs ex animi, quàm ex corporis vitio morbi multi oriuntur, ea de re videndum est, antequàm morbum curemus, è corpore ne, an ex animo nascatur infirmitas. A causis enim
inci-

incipiendum est, vt arboris interitus
non ex ramis: sed ex radice petatur.

Exigui affectus, separatis causis effi- 281.
cientibus, illicò finiuntur, natura ipsos
videlicet sanante. Illi quippe externo
indigent auxilio: quos ob sui magnitu-
dinem natura vincere nequit.

Morbi qui sensim oriuntur, & quo- 282.
rum causæ cognitu faciles sunt, tutissi-
mos appellare licet, proinde si talium
morborum causis præsentissima cura
quamprimùm occurratur, morbi illi
absque negotio, & facili mē discedunt.

Maxima in medēdo difficultas, cūm 283.
contraria auxilia indicantur.

In frigido morbo à vino haudqua- 284.
quàm abstinendum est. Concoquit e-
nim id semicrudos succos, quantū a-
liud, tūm sudorem, tūm vrinam per-
mutat, ac somnum conciliat.

Quibus in diuturnis morbis venter 285.
sistitur, quales in hyeme potissimūm
cōtingunt, quibusque post longam in-
firmitatē similis affectus incidit, sanis-
que adstrictis, iis aliud non acribus: sed
oleo

196 *Aphorismorum Medicin.*

oleo tantum deicienda est.

286. Quibus nervorum à dorsi spina & nucha ortorum aliquis fuerit affectus, ipsorum origini adhibenda sunt remedia.
287. Diminutas corporis partes non est Medicis possibile generare: sed naturæ soli. Superauctas verò secundum numerum, aut quantitatem, interdum auferre possunt.
288. Tutius est mederi somno morbis, cibisque abstinencia, vel exercitio, quàm scammonio aut euphorbio.
289. In superioribus intestinis vlcus si fuerit, ab epotis medicamentis præsidium petendū est. Si verò in inferioribus, clysterem subiicere magis expedit.
290. Initia morborum primū famem, sitimque desiderant, neque vlla res iuvat magis laborantem, quàm tempestiua abstinencia.
291. Optimum medicamentum est, cibus opportunè datus.
292. Cū omnia ferè medicamenta stomachum lædant, non sine causa Medici,

dici his ipsam victus rationem longè præferunt. Verùm vt hæc in plerisque morbis vtilior est: sic multa admodùm corporibus nostris incidere consueverunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt.

Oxymel, quod non adeò fuerit acidum, 293.
fauces humectat, sputum euocat, sitim compescit, præcordiis, visceribus cæterisque id genus partibus amicum est, flatus discutit, & vrinam ciet.

Vehementi malo, vehementi omnino auxilio opus est. 294.

Longinquior materia difficiliùs attrahitur. Vehementiora itaq; medicamenta membris remotioribus conueniunt. 295.

Superiora intestina supernè, inferiora iniecto clystere commodè sanantur. 296.

Vitando nociua, & vtendo iuuantibus, prosperatur in ægris opus curationis. 297.

Antequam ægritudinis species, aut proxima causa cognoscantur, temperatis 298.

ratis aut neutris regendus est patiens.

299. Morbi, qui citra humorum intemperantiam proueniunt, alteratiuis tantum medicinis iuuantur, atque corriguntur.

300. Inueterata dyscrasia transit in habitum, & respuit extirpari.

301. Quod iuuatur ab infrigidantibus, calidum est, quod verò humectantibus, siccum & è conuerso.

302. Sæpè lauare caput & pedes cum aqua calida, in qua bullierint melissa, folia lauri, chamomilla, & similia, memoriæ, capiti & oculis valdè confert.

303. Omne simile superueniens morbo acuit ipsum, & augmentat. Omnè verò contrarium morbo, compescit ipsum & minuit.

4. Qui à plenitudine morbi fiunt, vacuatione curantur: & qui ab inanitione proficiunt, sanantur plenitudine. Cæterorumque contraria sunt remedia.

5. Semel multum & repentè, vel vacuare,

Seçtio Se

are, vel re-
 e, vel calefacere, vel re-
 are, vel re-
 e, aut alio quouis modo corpus
 ouere, periculosum. Omne siquidem
 mium naturæ inimicum. Paulatim
 erò quod fit tutum, cum aliàs tum
 maximè; vbi ab vno ad aliud facienda
 st mutatio.

Non si recta ratione gerenti omnia 306.
 eundem eam minus succedat, pro-
 inus est ad aliud transeundum, mo-
 dò illud constet, quod ab initio visum
 iuit.

Quibus venæsectio aut purgatio 307.
 rodest, his Vere secanda vena, aut pur-
 gatio imperanda.

Quando crudi succi in corpore exu- 308.
 perant, requiritur subtiliatio absque
 calefactione intensa, vt subtile non sta-
 tim resoluatur, & ne per intensam cali-
 ditatem commotio fiat à materia.

In morbis diuturnis in principio nō 309.
 sunt offerenda digestiua vehementer
 calida, vel frigida. Vehementer enim
 calida materiam fundunt & colliquāt,
 & obstructions aut apostema in
 inte-

200 *Asp. ~arum Medicin.*
interioribus efficiunt.

fortia cathartica in principio ^{faciunt}
Frigida verò materiam reddunt crudi-
diorem, compactiorem, & digestionem
magis rebellem, unde morbus prolon-
gatur. Ideoque temperatis digestiuis
à principio vtendum.

310. Medicus semper à leuioribus debet
incipere, & ad fortiora procedere, in
morbis, qui dant inducias, sed in vehe-
mentioribus morbis, qui non dant in-
ducias, vt in apoplexia, & epilepsia præ-
fertim, in qua paroxysmi sunt frequen-
tiores, statim à principio incipias à for-
tioribus, ne à materiæ multitudine &
copia, virtus extinguatur.

311. In diuturnis morbis tantùm expe-
ctanda est concoctio, non in aliis.

2. Antequàm purgatorium pharma-
cum offeras, cura priùs, vt humores
sint tenues & fluxioni parati, deinde vt
sint æquari, hoc est, vt non sint crassi &
lenti, postremò vt meatus sint aperti,
per quos purgatio fieri debet.

3. In morbis frigidis ac inueteratis,
& com-

& complexione frigida, simplicia in vino fuluo ac tenui decoquantur. In morbis verò calidis, & in complexione sanguinea, ac cholericis, in aqua, aut vino albo tenui decoquantur.

In declinatione & post probam corporis euacuationem, diuretica offerenda. Et si corpus est crassum & phlegmaticum, tùm audacter fortiora usurpantur. Si verò corpus est macrum, extenuatum & cholericum, tùm mitiora offerantur, & frigidis diureticis, vt seminibus melonum, citrullorum, &c. temperentur, ne scilicet sanguis in iis aduratur, & corporis extenuatio augeatur.

Medicamenta crassitiem humorum attenuantia & dissecantia, sic diuretica, sæpè sunt causa doloris capitis, quia hæc vias aperiunt & dilatant, vt vapores copiosius caput petāt. Sed propterea ab horum usu & recta via non desistas, etiamsi æger & assidentes de medicamento exhibito conquerantur, quod excitarit dolorem capitis, sed
proce-

202 *Aphorismorum Medicin.*

procedas & pergas sic, quoniam sic recte operando sequetur sanitas, & manifesta fiet omnibus Medici prudentia.

316. Alio constipata ubi digestiua offeruntur, accidit inde dolor, quia materia absterfa cum non possit excerni, in flatus conuertitur.

317. Dissecantibus & abstergentibus digestiuis clysterem, ut via aperta sit, premittere, & post horas tres haustum aquæ pisorum, ut id quod à digestiuo attenuatum est, abstergatur, exhibere oportet: si enim hæc in corpore manerent ob aluum durum, stomachum, cor & caput euaporando lædere possent.

318. Crassi & prauī humores ideò sunt in principio attenuandi & dissecandi, ut materiæ exuperantes, per angustas vias ad stomachum & intestina à cathartico, attrahi, & sic excerni possint. Nam materia, quæ per angustas vias expelli debet, necesse est, ut sit tenuis, & non crassa, aliàs nouas efficeret obstructions.

319. Quando iam crudi & prauī humores
res

res lenibus catharticeis sunt imminuti
& lenibus medicamentis nonnihil atte-
nuati, tùm fortibus vtire pharmacis
deiectionis & digestiuis, & cùm signa
coctionis in lotio iã apparent, tùm diu-
retica, fortia aperitiua, & quæ sudorem
prouocent, ac per halitum degerant,
offerantur.

Vsùs diureticorum in principio ante 320.
purgationem corporis, non tam in ple-
thoricis, quàm cacochymicis corpori-
bus detestatur.

In morbis melancholicis aperitiuis 321.
& diureticis; semper humectantia ad-
dantur, vt est succus liquiritiæ, saccha-
rum violaceum, pruna vngarica, passu-
læ, semen lactucæ, &c. Quia acuta &
fortia diuretica in melancholicis affe-
ctibus ratione exiccationis detestatur.

Diureticis & menses prouocantibus 322.
semper associetur humectantia in cor-
poribus emaciatis & extenuatis, vt se-
men melonum, citrullorum, &c. ne
sanguis in eis aduratur, & siccitas cor-
poris augeatur.

Lithron-

323. Lithontribis etiam, in corporibus extenuatis, adduntur humectantia, ut syrupus violatus, vel syrupus de liquiritia, ne partibus subtilibus resolutis & consumptis, materia crassa in calculum conuertatur, aut ne calculus durior fiat. Idem intelligatur de topicis, quæ extrinsecus admouentur.

324. Digestiua in diuturnis morbis per dies quinque continuentur, & bis per diem exhibeantur, ut manè in aurora, & super dormire licet, & à prandio per duas horas ante cœnam: somnifera verò & digestiua capitis, vesperi circa introitum lecti offerantur.

325. Digestiua benè calida offerantur, nisi intensa febris adsit, aut stomachi intemperies calida. Nam & hoc ad humorum facit concoctionem. Tepida nunquàm sunt offerenda digestiua: Tepida enim stomachi robur exoluunt.

326. Dùm æger concoctricibus utitur potionibus seu medicamentis, semper interim in calidiusculo degat loco, & tenui utatur diætâ. Nam & hoc

ad

ad humorum crudorum coctionem facit. Frigus enim humores densat, & poros cutis adstringit, & sic materiae resolutio inhibetur.

In digerenda seu præparanda materia melancholica, duplex est intentio: 327.
Vna est attenuare, & dissecare humoris crassitiem, moderatè tamen calidis, ne id quod subtile est, resoluatur, & crassum in corpore relinquatur; altera est, humectare & lenire humoris siccitatem & terrestritatē, sed in materia adusta vtimur refrigerantibus, dissecantibus & humectantibus.

Iulepis potiùs vtimur in alterando, 328.
quàm in digerendo.

Pillulas, quæ à cerebro & iuncturis 329.
euacuare debent, magnas esse oportet.

In morbis calidis saccharo, in frigidis verò melle vtimur. 330.

Porionibus concoctricibus semper, 331.
quæ stomachum confortent, indantur,
vt cinamomum, semen feniculi, &c.
quia stomachi actio toti communis
L est:

est: Sic semper quoque adiiciantur ea, quæ cor confortent, eò quòd Vitæ sit fons & basis, vt flores borraginis, buglossæ, rosarum, melissæ, &c.

332. In medicamentis pectoralibus præparandis, fugiendus est fumus, vel ignis fumans, ne acrimoniam aliquam medicamentum acquirat.

333. In vitiis pectoris, medicamentis pectoralibus semper memineris humectantia & lenientia pectus adiicere, ne partibus tenuioribus resolutis & exiccatis, materia in pectore fiat viscosior, & crassior, vt minimè possit tussi reiici. Ideò si offers oxymel scilliticum, adde syrupum de liquiritia. Item si syrupum de hyssopo, de calamento, de prassio, adde syrupum violaceum aut hæc cum decocto humectante offerantur.

334. Materia existente in epatis gibbo, vel in vrinæ viis, hæc nequaquã à principio diureticis est euacuanda, sed priùs materia communis, quæ in epatis concoctio, & venis meseraicis existit, lenitio aliquo pharmaco est euacuanda, & mino-

minoranda, ne eiusmodi materia communis per aperitiua, & diuretica medicamenta ad epatis gibbum, vel urinæ vias deriuetur, auertaturque & efficiat obstructionem.

Vbi materia peccans est euacuanda 335. per gibbum, vel urinæ vias, & in his locis aliqua est exulceratio, tùm tutius est materiam per aluum, & intestina euacuare; & vicissim, si in intestinis existunt vlcera, tùm melius est, materiam in concauo epatis existentem, per urinæ vias, quàm per intestina, ne augeatur malum, expellere.

Verum tempus vtendi Theriaca nō 336. in principio morbi est, sed cùm perfecta concoctio in vrinis apparet.

Mel naturis calidis & siccis est in- 337. commodum: frigidis verò & humidis accommodatissimum.

Humor melancholicus tripliciter 338. peccat: scilicet, crassitie, oppilando, & siccitate. Ideoque poriones digestiue parantur primò ex his, quæ attenuant & dissecant eius crassitiem, deinde

L 2

quæ

quæ obstructionem reserant, postremò ex humectantibus.

339. Quando calor aliquis præter naturam adest, tùm diuretica quibusdam refrigerantibus, ne calor intendatur, temperentur: si enim calida mera offeruntur, tû augetur & febris & putredo.

340. Quando nausea absque vomitu adest, hoc insinuat materiam viscosam parietibus stomachi tenaciter adhærere. Quare hîc, quæ materiam attenuent, dissolvent, & abstergant, offerenda sunt. His etiam hieræ picræ simplicis Galeni vsus optimè confert.

341. Oximelle simplici, syrupo acetoso simplici, & oxyfaccharo, minimè per se immodicè vtendum, ne intestina rodant, ac vehementer abstergendo vulnerent, & tussim excitent.

342. Digestiua, aperitiua, diuretica, & omnia diaphoretica in aurora debent offerri. Tû enim venæ remotæ Epatis, & meseraicarum sunt inanitæ, & chylus in eis contentus tû est concoctus.

Quando

Quando aliquis febre, & hydrope 343.
simul molestat, tùm cibi, & medica-
menta tempore minoris afflictionis of-
ferantur.

Diuretica in diabete, & renum vlce- 344.
ribus, detestantur. Hic potiùs mate-
ria influens ad partem oppositam, cly-
steribus, & exhibitione floris cassiæ re-
uellatur.

Quando aperitiua, & diuretica of- 345.
ferre vis, tùm priùs lenitium exhi-
beatur, vt recrementa circa primas ve-
nas existentia sic prius euacuentur.

Si non videtur in vrina sedimentum 346.
manifestum, & signa coctionis appa-
rent, non oportet vt dentur in potu for-
tia digestiua, aperitiua, & subtiliatiua,
propter fortem humorum commotio-
nem.

Euacuatione minoratiua vtimur 347.
materia adhuc cruda, vt in morbi prin-
cipio & augmēto. Eradicatiua verò ma-
teria cocta, vt in statu & eius fine.

Quando fortia diuretica exhiben- 348.

L 3

tur,

tur, admisceatur syrupus violatus, aut syrupus de liquiritia, ad remittendam harum siccitatem, ne materia crassa in lapidem conuertatur.

349. Nonnunquàm ex usu fortium diureticorum accidit sanguinis mictus: Hæc enim suo acumine vias urinæ exulcerant.

350. Nonnunquam ex usu digestiuorum ac cathartorum dolores, & accidentia augentur, ob humores scilicet commotos, sed ideò minimè deterrearis, vt propterea curationem intermittas.

351. Quando post usum digestiuorum accidit vomitus, nequaquàm deterrearis: Hoc enim indicat, materiam viscosam parietibus stomachi adhærentem, esse absterfam, disiectamque.

352. Cholera æruginosa & prasina, non expectant digestionem, sed statim debent euacuari, tanquam materia venenosa furiosa.

353. Cholera vbi exuperat, nulla indiget digestionem, sed tantùm opus habet alteratione ne sæuiat, furiatque.

Oxy-

Oxysaccharum non detur eis, qui 354.
tussi molestantur, debiles nervos ha-
bent, & qui dysenteria vexantur. Exco-
riat enim intestina; Idem intelligatur
de syrupo acetoso simplici, & oxymel-
le simplici & composito: sed si cum ali-
quo reprimente offeruntur, tùm in his
casibus admittuntur.

Euacuatio debet quidem regulari- 355.
ter præcedere alterationem, tamen nõ-
nunquam, vbi febris intensissima est,
oportet nos vti alterantibus & refrige-
rantibus ante materiæ purgationem: sed
hic refrigerantibus cum humectatio-
ne vtendum. Refrigerantibus enim sty-
pticis ante materiæ digestionem & eua-
cuationem vtendum nõ est. Hæc enim
oppilant, & transpirationem prohibet.

In duobus casibus stypticis ante ma- 356.
teriæ digestionem vtimur, primò, quã-
do causa febris est fluxus vètris, aut vo-
mitus virtutem prosternens: deindè,
quando sudor immodicus affligit.

Post materiæ digestionem & eua- 357.
cuationem, frigidorum & stypticorum

usus est securus. Nam extinguit calorem febrilem, & membra à febrili calore laxiora facta, vniunt & confortant.

358. Plethora sanguinis missione, cacochymia veròalui purgatione tollitur.

359. Vomitus nequaquam prouocandus est, in habentibus paruum & angustum pectus, longum & macrum collum, in alatis, & gracilia crura habentibus, & quibus debile cerebrum est, & oculi debiles.

360. Errhinis vtendum est ter in septimana ieiuno stomacho, per horam vnam ante prandium, tepidè in modum lactis iamiam emulsi, attrahanturque naribus, facta prius corporis purgatione.

361. Masticatoriis vtimur per spacium quartæ partis vnius horæ, ieiuno stomacho, manè per duas horas ante prandium. His verò vtendum non est, vbi catarrhus ad pectus decumbit.

362. In paratis ad phthisin, & in catarrho, non tutum est vti gargarismis attenuantibus, detrahentibusque pituitam.

tam. Sic quoque non tutum est errhinis & sternutatoriis vti in paratis ad ophthalmiam, oculorum lacrymas, & cataractam.

Errhina, apophlegmatismi, nullo 363.
modo administrentur, donec materia prius probè sit digesta & euacuata, alioqui metus est, ne materia irritata, & liquata defluat ad pectus, & suffocet ægrum, aut ad cerebri ventriculos, & fiat epilepsia.

Quando vteris errhinis fortibus, 364.
tùm attrahe ipsa, & postea stringas nares, vt melius ascendant in caput, & os repleatur aqua frigida, ne errhinum descendat ad palatum, & ipsum suo acumine lædat.

Turbith per se euacuat pituitam subtilem, cum zinzibere verò crassam. Idcoque in paralyfi parum, in spasmo verò multum zinziberis addatur.

Pessaria in virginibus adhibenda 366.
non sunt. Vfus autem horum optimus est, vbi balneum rerum molificantium præcesserit. Debent verò filum lon-

L 5 gum,

gum, vt pro arbitrio, ne propter longam moram matricem exulcerent, extrahi possint, habere.

367. Quando timetur descensus catarrhi ad pectus, gargarismi omittendi sunt, ne catarrhus ad pectus auertatur, eoque vel æger suffocetur, vel pulmo, si acutus ille est, exulceretur. Sed si fuerint gargarismi, catarrhum inspissantes sistentesque, tùm horum vsus conceditur, commendaturque.

368. In Angina in principio gargarismi solummodò in ore teneantur, & non gargarisentur, ne materia moueatur, conciteturque.

369. Quæ oculis imponuntur actu frigida sunt, moderatè tamen. Intensè enim frigida materiam inspissant, & poros claudunt.

370. Quæ auribus induntur, illa tepida esse debent, & in parua quantitate instillantur, vt vix tres aut quatuor guttæ. Antequàm autem iniiciantur, aures priùs à suis sordibus repurgandæ sunt, & medicamento iniecto, æger primò
in aure

in aure sana, per vnam vel duas horas cubet, post verò aliquantulum temporis se rursus in affectam aurem reuoluat, vt medicamentum iniectum rursus effluere possit.

Pillularum vsus in paralyfi probatur, 371.
sed lenitiuorum & cassiæ vsus impro-
batur.

Acetum in auricularibus morbis nō 372.
competit, nisi parum admodum. Quia
acetum neruis nocet.

In morbis singulis vide, nūm labo- 373.
rent ob mensium, seu hæmorrhoidum
suppressionem, aut semen retentum:
Hæcque inprimis prouocentur. Item
nūm morbus exortus sit ob vlcus anti-
quum consolidatum. Hoc enim refri-
candum, & de nouo aperiendum est.

In melancholia, infusiones præfe- 374.
runtur solidis medicamentis, & pillu-
lis.

In die paroxysmi neque est phlebo- 375.
tomandum, neque medicamentum
purgatorium exhibendum.

Cū refrigerantia offers, tūm 376.

aduertas, ne stomachi concoctio inde debilitetur. Concoctionem verò inde esse debilitatam, constat ex appetitus prostratione, lenteria & flatibus. Idem intelligas de medicamentis refrigerantibus epati extrinsecus adhibitis.

377. Quando calida medicamenta offeruntur intra corpus, vt diuretica fortia, sic vbi extrinsecus epu hemata, seu inunctiones calidæ adhibentur, vide ne epar intemperie indè calida afficiatur, quod dignosces, vbi sitis succedit, & vrina coloratior fit.

378. Ne ex vsu frigidorum medicamentorum oblatorum stomachus offenda-
tur, extrinsecus interim calorificis in-
ungi debet.

379. In morbis chronicis, variis vtendum est medicamentis, manente intentione, ne natura iis assuescat, quia à consuetis nulla fit passio.

380. Vini, aquæ frigidæ potus, Balnea-
quæ dulcis, Diaphoreticorum, fricatio-
num, & inunctionis corporum vsus cō-
fert, in morbi scilicet declinatione,
vbi

vbi signa concoctionis in lotio manifestè apparuerint. Sic enim materia circa capillares venas, & circa carniū cavitates expellitur.

Epithematum & reliquorum refrigerantium medicamentorum vsus, est 381.
in vigore paroxysmi, & non in principio, & incremento eorum, calore nondum per vniuersum corpus explicato, sic enim ad interiora calor repellere-
tur, & augeretur.

Antequā multitudo phlebotomia, 382.
seu materia lenitiuo est imminuta, nequaquā epithemata refrigerantia adhibenda sunt.

In principiis febrium detestantur omnia styptica, non tam extrinsecus, q̃ 383.
intrinsecus exhibita. Hæc enim augent obstructions, & materiæ putridæ evaporationem & transpirationem prohibent, & vapores in corpore detinent, compinguntque. Tamen vbi calor modum excedit, frigida humectantia administramus, ne virtus prosternatur. Melius enim est morbum augeri, quā

L 7 virtutem

virtutem deficere.

384. Ad prouocandum sudorem vtimur aqua hordei calida, ad sedandam sitim, frigida, ad prouocandum vomitum, tepida.

385. In oxyrrhodinis fit oleum recens, non antiquum, quia tempore acquirit acedinem.

386. Aceti vsus suspectus est, vbi adest siccitas, dolor, inflammatio, vlcus, adstrictio, dolor à neruis, & vigiliæ.

387. Vfus oxyrrhodini detestatur in dolore capitis puerorum, mulierum & decrepitorum, quia in his calor natiuus debilis est & exiguus: sic in iis, qui somnolenti sunt, & catarrho molestantur.

388. Qui antequàm corpus probè euacuatum est, vtuntur fomentis aut frictionibus, aut cataplasmate circa hypochondria, aut circa pectus, illi sæpiùs in iis partibus inflammationes pariunt, aut in epate, aut in ventriculo, aut in aliquo è visceribus. Nonnunquam etiã in ipso fomentandi tēpore accidit anhelitus difficultas, totum scilicet id, q̃ redundat,

redundat, ad præcordia trahente caliditate. Attrahit enim cataplasma cucurbitulæ instar totius corporis excrementa. Cucurbitulis itaque & discutientibus, relaxantibusq; non, nisi vniuerso corpore exinanito, vtendum est.

Post frigidum medicamentum hy- 389.
pochondriis applicatum, alium difficilis confestim anhelitus, alium verò subita tussis corripit, eo autem remoto, paulò post vtrunq; nocumentum cessat.

Quando duo morbi complicantur, 390.
tùm ab eo curatio est inchoanda, qui causa existit alterius, & sine quo alter curari non potest.

Quando epar adest calidum, & sto- 391.
machi dolor ex causa frigida vnà adsit, tum extrinsecus epatis intemperies cum cerato Galeni alteretur, & æger nequaquam in dextro latere dormiat. Intrinsecus verò, quæ flatus dissipent, & stomachum contortent, offerantur, & crassiusculè contusa sint, ne per angustas vias ad Epar pertingant, aut conficias medicamentum, quod vtrumque mem-

membrum respiciat.

392. Quando aliquis laborat calculo & catarrho simul, tùm principio catarrho subuenias, & diuertatur per nares errhinis, & confortetur cerebrum, postea calculo leuibus diureticis succurras, postremo fortioribus vtere.

393. Quibus stomachus nauseabundus, & aluus adstricta, his primò, quæ aluum emolliant, offero, ad postremum verò, quæ stomachum corroborent, & eius os adstringant, exhibero. Hæc enim quæ ventri innatant, deorsum propellunt.

394. Quando Lien crassis & viscosis afficitur humoribus, pulmo verò à tenui & acri destillatione molestat: tùm quæ fluxum condensent, & catarrhum sistant exhibeantur. Lien verò epithemata attenuantia imponantur, postremo verò Theriacæ recentis vsus optimè valet.

395. Quando cum febris paralyfis complicatur, tùm febris principio curanda est, non neglecta tamen paralyfi. Ideò
hîc

hic vsus syrupi acetosi simplicis cum melle rosato colato, plurimum valet.

Quando cum dysenteria complica- 396.
tur tussis, tùm styptica cum lenientibus
pectus commisceantur.

Quando in Diabete vnà adest cor- 397.
poris extenuatio seu phthisis, tùm circa
lumbos & vesicam adhibemus frigida,
spinam verò vsque ad medium dorsi, &
pectus inungimus refrigerantibus, hu-
meatantibusque.

Quando aliquis laborat calculo, & 398.
mictu sanguinis, tùm modò stypticis,
modò diureticis alternatim vtere, vel
q̄ meli⁹ abo simul permixta offerantur.

Quando circa caput epithemata, & 399.
inunctiones refrigerantes, & hume-
tantes, vel etiam eiusmodi medicinæ
immodicè intra corpus offeruntur, tū
plerumque succedit, aut lethargus, aut
obliuius, aut somnus: sic vbi immodicè
non tam intra, quàm extra corpus vti-
mur calorificis medicamentis, acci-
dunt vigilæ, aut soda.

Quando stomacho vehementer ca- 400.
lida

lida vnguenta, & emplastra admini-
strantur, accidit coctio corrupta, vnde
cholerae prasinae, & æruginosae vomitu-
tus, sic ructus nidorosi, ac foetidi, item
appetitus prostratus, ob os rarefactum
relaxatumque. Idem accidit in febre
intensa, quare refrigerantia styptica
pro stomachi confortatione hinc exhi-
benda sunt.

401. Quando pectori seu cordi vnguen-
ta vel epithemata vehementer calida
adhibentur, vnde cor supercalefiat, ac-
cidit inde pulsus, seu spiratio aut ma-
gna, aut celeris, aut frequens.

402. Quando pectori seu cordi immodi-
cè refrigerantia adhibentur, tunc acci-
dit pulsus parvus, tardus, ac rarus, sic
etiam difficilis spiratio.

403. Curatus nequaquam in frigidius-
culo degat loco. Facile enim ob corpo-
ris raritatem concoctio debilitatur. Ad
duos autem menses per diem sæpius,
parum tantum cibi semel offerendo,
cibetur, sitque ea cibi quantitas, quæ
minimè stomachum grauet.

In

In reconualescentia palpebrarum in- 404.
flatio, aut appetitus corruptus, vel pro-
stratus, aut frequens nausea, aut stoma-
chi inflatio, aut si vrina sedimentum
non habet, hoc signum est recidiuæ.

In reconualescentia, vini vsus opti- 405.
mè confert. Coitus verò detestatur.

Quando sudor in conualescentia 406.
multiplicatur propter materiæ reli-
quias, bonum est paruam facere mino-
rationem.

Diæta reconualescentium in hoc 407.
consistit, vt restaurentur vires & hume-
ctetur corpus.

Regimen conualescentium, tribus 408.
completur intentionibus: prima est, al-
terare dyscrasiam relictam, secunda,
confortare principalia membra, &
præcipuè nutritiua, tertia, materiam re-
lictam, seu de nouo coaceruatam, dige-
rere, & euacuare.

Quando ad locum remotum mate- 409.
riam reuellere intendis, mitiga priùs
dolorem loci affecti. Sic enim minor
fiet tra-

fiat tractionis violentia, cum dolor ipse
trahat.

410. Humor fluens sursum, reuellendus
seu retrahendus est deorsum, si deorsum,
sursum, si intus, foras, intrò, si ad
dextram, ad sinistram, si ad sinistram, a
dextram, si retrorsum, antrosum, &
antrosum, retrorsum.

411. Reuulsio siue retractio causæ antec
cedentis, id est, materiæ influentis, fit an
liquando cum euacuatione, vt vel scar
rificatione, vel venæsectione, aliquan
do sine euacuatione, vt vel deligatura
vel fricationibus, vel cucurbitulis.

412. Reuulsiones cum euacuatione semper
sunt efficaciores, quàm reuulsiones
sine euacuatione.

413. Reuulsio nunquàm fiat, nisi per v
num diametrum, vt à dextra ad sinist
ram, vel à deorsum sursum, aut econ
trà. Secundum autem duos diametros
non est fienda phlebotomia, nisi maxi
ma adesset plenitudo.

414. Reuulsio nihil aliud est, quàm ma
teria

eriae influentis ad membrum, à quo
venit, hoc est, ad membrum mittens re-
tractio.

Reuulsio pertinet ad causam ante- 415.
cedentem, hoc est, ad materiam influē-
tem. Derivatio verò ad causam con-
iunctam, hoc est, ad materiam fluxam.

Repellentium vsum, si succedit do- 416.
lor aliquo in loco, indicat materiam eò
esse repulsam, & vide, ne apostema ibi
sit, quod ex febre manifestum fiet: Si
autem corruptio & denigratio mem-
brum, significat calorem nativum esse ex-
inctum, & membrum immodicè esse
refrigeratum. Si verò apostematis du-
rities materiam ibi congelatam con-
cretamque esse denotat.

Ex vsum repellentium sæpè dolor au- 417.
getur, intenditurque ob fuligines mor-
daces, & humores acutos in loco affe-
cto detentos, conclusosq; qui ob poros
cutis adstrictos, transpirare nō possunt.

Prohibemur vti repellentibus in sex 418.
casibus; primò apostemate in emun-
torio enato: secundò, si materia est ve-
nenosa,

226 *Aphorismorum Medicin.*

nenosa, vt in peste, hîc enim potiùs attrahentia adhibenda: tertio, vbi materia fuerit crassa & tenax, ne hæc ex vi repellentium crassior, & resolutioni diuiniò inepta reddatur, quarto, apostolice mater ratione crisis enato: quinto, antequam corpus pharmaco, vel phlebotomia, inanitum sit: postremo, vt senio confectis.

419. Sic quando materia existit in profundo, vt in sciatica, nequaquam repellentia adhibeantur, ne sanguis ex vicinis & ambientibus musculis ad conuexum in alto situm impellatur. Quare in principio opus est pharmacis lenitiuis quæ neque omninò refrigerent, neque fortiter calefaciant. Etenim quæ refrigerant, ad conuexum materias impellunt, quæ verò vehementer calefaciunt aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus attrahunt.

420. Quando materia iam est fluxa, vt in mur relaxantibus medicamentis cum repellentibus permixtis. In augmento autem repellentia prædominantur. In statu

statu verò exuperant relaxantiâ.

Quando post vsum Diaphoretico- 421.
rum dolor augetur, signum est corpus
adhuc immundum esse, ideoque plus
materiæ esse attractum, idè redeun-
dum est ad mittentium euacuationem,
& confortationem.

Quando materia iam fluxa est, et- 422.
iam derivatione vtimur, vel in parte af-
fecta, vel in maximè vicina.

Nunquam nec intrinsecùs, neque 423.
extrinsecùs vtere resolutiuis & atre-
nuantibus vehementer calidis, ne pars
subtilis resoluatur, & crassa exiccetur,
petrificeturque. Ideo cum resolutiuis
semper commisceantur humectantia,
lenientia, mollificantiaque, ne tumor
in scirrhum conuertatur.

In declinatione meris resolutiuis v- 424.
timur, vt balneis, thermis. Horum au-
tem vsus improbatur in his, quibus ca-
lidum epar est, & renes calidi sunt, vn-
dè vrinæ ardor aut ascites.

Vbi materia in profundo existit, 425.
vtin

228 *Aphorismorum Medicin.*

vt in sciatica, tùm euocetur, & resolua-
tur emplastris attrahentibus, vesicato-
riis, sinapismis, & cauterio.

426. Circa declinationem tutò vinum &
diuretica exhibentur.

427. Vbi materia fluxa non potest resol-
ui, sed iam tendit ad suppurationem,
adhibe medicamenta pus mouentia,
sed horum vsus sit moderatus, ne mē-
brum putrescere & corrumpi inci-
piat.

428. Fortis maturatio membrum ad pu-
trefactionem gangrænosam disponit.

429. Quando anodynus & resolutiuus, vt
decet adhibitis, dolor non mitigatur,
sed potius febris, & dolor indè augetur,
signum est apostema tendere ad sup-
purationem, ideò maturatiua adhi-
be.

430. Rupto abscessu vtere absterfuiis, sed
vide ne adeò fortia sint, vt cavitatem
augeant & fluxionem excitent, postea
cavitatem replere carne studeas.

431. Nota sufficientis absterfionis est, vbi
nihil saniei ampliùs effluit.

Sarco-

Sarcoticis ante perfectam mundifi- 432.
cationem vtendum non est.

Dùm sarcoticis vteris medicamen- 433.
tis, diēta sit euchyma, vt bonus sanguis,
qui materia est carnis, regeneretur.

Nulla topica medicamenta, ante 434.
corporum euacuationem administran-
da sunt.

Calefactoria & resoluentia, ac cata- 435.
plasmata, vbi refrigerari incipiunt, cō-
festim auferenda sunt, ne sua actuali
frigiditate materiam inspissent, & po-
ros claudant.

Quando administrantur calorifica, 436.
seu diaphoretica, seu anodyna, si indè
dolor intenditur, tùm auferantur & di-
mittantur, & redi ad materiæ exupe-
rantis euacuationem, & membri mit-
tentis, seu generantis confortationem.
Hoc enim indicat, corpus esse aut ple-
thoricum, aut cacochymicum.

Emplastra, vnguēta, sacculi, embro- 437.
chæ, epithemata, caput purgia; hæc o-
mnia calidè, & ieiuno stomacho adhi-
beri debent.

M

Quan-

438. Quando intēctiones sumptæ à febrī,
& causā eius non concordant, consen-
tiuntque ut febris, quæ, cum intensā sit,
requirat refrigerantia & humectantia.
Causa verò eius sit frigida & phlegma-
tica; & ideò requirat calefacientia, at-
tenuantia & exiccantia, tūm rei magis
periculosa succurrere memento. Vbi
enim febris sæua & intensā sit, primò
refrigerantia & humectantia offeras,
ne ex usu calidorum & siccorum medi-
camentorum virtus prosteratur, post-
ea verò & causæ attendas calorificis
medicamentis. Melius enim est protra-
here morbum, quàm virtutē succum-
bere. Sed quando virtus fortis est, &
corpus aptum ad resistendum resolu-
tioni, ex parte eius cōpositionis, quod
scilicet sit crassorum humorum, stri-
ctorum pororum, & phlegmaticæ cō-
plexionis, tūm potius causæ, quàm fe-
bri, attendendum est. Hic enim rarò
adeò intensā adest febris, quæ rectam
curationem impediat. Quare in fe-
bribus putridis, in nostris regionibus,
prior

prior intensio sit ad causam, quàm ad febrem.

Nonnunquam accidit, quòd febris 439.
causa, & etiam symptoma ipsum inui-
cem contrariantur, vt in febre synco-
pali humorosa. Febris enim exigit re-
frigerantia, causa verò, calorifica & at-
tenuantia, syncope verò, cibi oblatio-
nem. Quare, quod magis inter hæc pe-
riculosum est, huic imprimis succurra-
tur, reliquis non neglectis. Melius e-
nim est, morbum protrahere, quàm na-
turam deficere.

Quidam nonnunquam corripiun- 440.
tur acuta febre, & stomachum habent
frigidum valdè. His extrinsecus sto-
machus inungatur calorificis; Intrinse-
cus verò temperata, ad frigidum tamē
nonnihil declinantia offerantur.

Antequàm administras alicui mē- 441.
bro resolutiua & relaxantia medica-
mēta, tūm in primis membrum aliquo
resolvente fomētetur, aut prius mem-
brum calefiat pannis calidis, aliquoties
impositis, vt sic pori aperiuntur, &
M 2 postea

postea vnguenti vis melius penetrare possit, membroq; inuncto rursus panni calidi superponantur.

442. Quælibet symptomatica excretio facta cum regulatione naturæ, nequaquam est cohibenda. Est enim bona per viam causæ, quam minuit, & quandoque eradicat. Sed excretio symptomatica, quæ absque regulatione naturæ fit, illa est sistenda.

443. Hydromel non detur iis, in quibus calor est præter naturam; quia calorem auget. Neque detur iis in quibus cholera exuperat. Facile enim in choleram cõuertitur: Sed in materia frigida, crassa, abstergendo & concoquendo, valet optimè.

444. Oxyfaccharum valet, vbi oppilatio est cum caliditate, oxymel simplex, vbi cum frigiditate, syrupus acetosus verò simplex, vbi cum caliditate vel frigiditate.

445. Quando confortatium aliquod plura respicit & confortat membra, vt Dianthos confortat cor, cerebrum, stoma-

Stomachum, &c. tùm ex speciebus eius facias, aut Electuarium, aut rotulas, addendo vehicula, quæ respiciant membrum illud, quod confortare intendis. Vt si Dianthos præcipuè debet confortare caput, tùm accipe species Dianthos, quibus adde pulverem nucis Moschatae, cubebarum, semen pæoniae, & cum aqua salviae formentur rotulae. Idè de syrupsis, qui indiscriminatim totum respiciunt corpus, intelligendū est.

Quando materia in profundo corporis, & in remotis existit, tùm medicinae quantitas est augenda, ne eius vis, antequàm ad locum affectum perveniat, resolvarur. Deindè, cùm eiusmodi medicina commisceatur dirigens seu vehiculum aliquod, quod medicamēti vim ad locum affectum traducat, perferatque. 446.

Vomitus lædit eos, quibus pectus 447. strictum est, longum collum, & spiritalia debilia, sic phthisicos & insolitos vomere, præpingues seu crassos, qui ad anginam, vel sanguinis sputum parati sunt,

M 3

sunt,

sunt, & quibus oculi sunt debiles, & cerebrum infirmum.

- 448. Vomitiuum non detur, vbi stomachi adest fortitudo, vbi fames adest, & quando aluus lenis est.
- 449. Macilentis conuenit vomitus, ob eorum biliosam naturam.
- 450. Post vomitum nonnunquam succedit singultus, ob materiam motam, & ad stomachum attractam.
- 451. Post vomitum, os & facies abluantur aqua rosacea, aut vino bono styptico, aut aceto & aqua tepida, quibus si cinnamomi aliquid addideris, nihil erit melius.
- 452. Sanguinis missio à vomitu, differenda est vsque ad tres dies.
- 453. Ventriculum valdè debilitat vomitus. Quare stomachus inde aromaticis stypticis, aut vino cum cinnamomo, confortandus est.
- 454. Cauterium partibus capitis adhibitum, est res eximia ad exiccandū catarrhum, & ad absumēdos corruptos humores in cerebro existentes, & sic præseruat

seruat à phthisi, tussi, asthmate, angina, ozæna, Noli me tangere, & vlcere pulmonis. Valet etiam in epilepsia, ad dolorem capitis antiquum, & ad intercipiendum oculorum fluxum.

455.

Cauterium nunquam administretur nisi corpus probè euacuatum sit, vel phlebotomia, vel cathartico, vt Medico expedire videtur.

456.

Cauteria administranda sunt in aurora, aluo & vesica priùs exoneratis.

457.

Quando cauterium adhibemus ad euacuandum, tùm apertum teneatur per quadraginta dies, & quotidie locus mundificetur semel, aut bis, interdum lauetur locus cum decoctione foliorum hederæ terrestris & arboreæ, vt locus cauterisatus non fœteat. Sed quando adhibetur cauterium ad restringendū, tùm non teneatur apertum.

458.

Cauteriorum vsus detestatur in infantibus, propter membrorum nimiam mollitiem: sic in senibus, propter nimiam membrorum siccitatem.

M 4

Cau-

459. Cauteria non administrentur tempore valdè calido, nec tempore valdè frigido, vel sicco.
460. Cauteria non fiant super musculos.
461. Caue ne cauteriũ pertingat ad nervos, chordas & ligamenta iuncturarum, ne accidat spasmus.
462. In intemperie membri calida & sicca, detestatur cauterii vsus: Sic enim calor calori, & siccitas siccitati adderetur. Sed ad intemperiem membri frigidam & humidam alterandam corrigendamque summè commendatur cauterii vsus.
463. Cauterium optimè facit ad interficiendam venenositatem, vt in carbunculo, anthrace, &c.
464. Cauterium optimè valet in sphacelo, & membri corruptione. Sic & in osse corrupto: separat enim os putridum à sano.
465. Inter metallica instrumenta ignita, quibus adustio fit, præstantius est aurum.
466. Caueat ille qui vrit, ne ferramento
illo

illo ignito, vsque ad nervos & tendine^s pertranseat. Cauteria itaq; nequaquam supra iuncturas ponenda.

In vicino loco circumponatur de- 467.
fensuum, ne vicinę partes corrumpantur.

Stupefactiua, neque in colica, neque 468.
iliaca sunt offerenda, nisi periculum de syncope adsit, propter doloris vehementiam, tamen in causa calida iis tutius vtimur.

In iliaca & colica ex materia frigida; 469.
propter narcotica exhibita, materia fit crassior, & compactior, indè obstructio maior fit, & dolor intenditur. Ideò quidam cum narcoticis solutiua commiscent, vt simul & dolor mitigetur, & materia peccans euacuetur.

Emplastris, quę ventri administrā- 470.
tur, parum aceti addi debet, vt virtus emplastri penetrare possit.

Quando aliquis percussus aut ictus 471.
est, aut ex alto decidit, tūc considera-
num intestina sint dislocata, vel an
Matricis adsit dislocatio, aut vesicę,

M s vel

vel nùm locus epatis sit dislocatus, unde vehemens dolor in loco affecto exoritur. Hic etiam vide, nùm sanguis exeat, vel per vrinam, vel per aluum, vel vomitu aut tussi reiiciatur. Hoc enim indicat, venam aliquam ruptam esse. Item, nùm in loco icto aut percusso, aliqua adsit nigredo, seu liuor. Hoc enim insinuat, sanguinem ibi esse concretum.

472. Quando lapsum ex alto, seu ictum succedit febris, tùm insinuat apostema abortum esse.

473. In morbis chronicis, in quibus longa facta est impressio in membris, non tam in declinatione, quàm in conualescentia refert multum, diu administrare leuiter purgantia, pharmaca, & leuia aperitiua, & cōfortatiua membrorum, ne accidat recidiua.

474. In medicinis spleneticis, semper admiscendum est acetum.

475. Quando adest vomitus immoderatus, aut fluxus ventris modum excedēs, tùm vomitus aut fluxus ventris sistendus est stypticis, etiamsi materia corrupta

rupta & praua in corpore detineatur, ne virtus omninò proſternatur, & ſyncope ſuccedat. Ideò inprimis debemus intendere conſeruatiōi virtutis, & eius reſtauratiōi, & fluxus reſtrictiōi, etſi materia mala non ſit euacuata. Sed virtute reſtaurata refocillataque, per quinque aut ſex dies poſt pharmacum deiectorium offeratur, vt materia praua & corrupta, retentaque expurgetur.

Quando locum aliquem calido oleo inunxeris, tūm calidis manibus oleum infricetur, & pannus calidus ſuperponatur. 476.

In cauſa calida vbi adeſt vomitus, aut fluxus ventris modum excedens, tūm medicamenta intra corpus exhibita, actu frigida offerri debent, quia caliditas rarefacit, & laxas reddit ſtomachi partes. Frigiditas verò vnit & denſat ſtomachi partes, & ſtomachi intemperiem calidam, ac ſitim minuit, & appetitum incitat, corrugando ſcilicet ſtomachi partes. 477.

M 6

In

240 *Aphorismorum Medicin.*

478. In morbis chronicis, digestiua, solutiua & confortatiua, sæpè sunt repetenda, & semper à leuioribus incipiendum, & ad fortiora procedendum. Interdum tamen, vsus medicamentorum intermittendus, vt natura non obruatur, & eis affuescat. A consuetis enim nulla fit passio.
479. Olea, antequàm administrantur, calefiant priùs in duplici vase, & non apud ignem: sed in aqua calida. Nam apud ignem eorum virtus dissoluitur.
480. Aromatum odor, stante repletionè, detestatur, vt in morbi principio.
481. Quando aliquis sanguinem reiicit vomitu, aut tussi, tùm obserua, nùm succedat color faciei citrinus, aut liuidus, & debilitas, seu casus pulsus, vel syncope, vel inflatio stomachi, hæc indicant sanguinem in corpore esse concretum, coagulatumque. Igitur, quæ sanguinem concretum dissoluant, offerantur.
482. Ad restringendum, sistendumque vomitum, fomentationes, inunctiones, emplastra, cerata, debent præcipuè
ori-

orificio ventriculi applicari. Ad ventris verò fluxum sistēdum, hæc potiùs fundo, quàm ori, applicanda sunt.

Quando plures ægritudines inui- 483.
cem complicantur, tùm curatio inci-
pienda est ab ea ægritudine, quæ harum
vnam habet proprietatem. Prima est,
quando vna non potest sanari, ante-
quàm altera curetur, vt quando cum
vlcere coniungitur apostema, tùm cu-
ratio ab apostematis curatione inci-
pienda est: Altera, quando vna ægritudo
est causa alterius: Tertia, quando cum
apostemate dolor vehemens compli-
catur, tùm enim à doloris mitigatione
curatio incipienda est.

Nullus criticus fluxus est restringē- 484.
dus, qui confert, quemque natura benè
tolerat. Quòd si verò superfluous fuerit,
tùm est cohibendus, quia sæpius natu-
ra inchoat ad bonum, sed materia mo-
ta, aut propter multitudinem sui, aut a-
cuitatem effrenitat, ita vt non possit à
natura regi.

Fluxus diuersorum colorum, nun- 485.

M 7

quàm

242 *Aphorismorum Medicin.*

quàm restringendus est, constante virtute, quia ex hoc arguitur diuersitas & multitudo humorum à toto.

486. Localia non debent administrari, nisi post probam corporis euacuationem, & in statu, vel declinatione ægritudinis, & non in principio, vel augmento, neque ante purgationem corporis, ne virtute sua actuali, & virtuali caliditate, plus materiæ attrahatur, & auertatur ad locum affectum, & error posterior fiat peior priori.

487. In fluxu liquefactiuo, in febribus acutis, & pestilentibus, phtisi ac febre hectica, calor liquefaciens, mitigetur moderatè refrigerantibus, ne debilis calor fortioribus extinguatur, sic etiam moderatè stypticis, ne forti adstrictione oppilando, prohibeant transitum nutrimenti ad membra.

488. In sanguinis narium profluentia, mictu, & mensium fluxu, cum phlebotomiæ reuulsivæ vsus confert, quando corpus plethoricum est, sed quando corpus mali est coloris, vt citrini, cum
omit-

omittatur phlebotomia. Est enim nota epatis imbecilli & frigidi, ob immodicam sanguinis euacuationem. Ideò medicamentis sanguinem sistentibus adiciantur, quæ epar confortent, sicut est spica, squinanthum, mastix, corallia, rosæ, &c.

In sanguinis profluio, in principio 489.
frigida, & adstringentia medicamenta extrinsecus administrare, non est tutum. Sic enim sanguis intrò compellitur, ac venæ, quæ in alto sunt, implentur, vnde hæmorrhagia augetur, sed postquam sanguinem aliò, aut sanguinis missione, aut frictione, aut deuinctione auerteris, tùm refert, si sanguis ex pulmonibus reiicitur, thoraci hæc administrare, si vomitu redditur, ventri, si verò è naribus sanguis profluit fronti ac capiti admouere.

Pulueres, quibus ad sistendum sanguinem 490.
vtimur, subtilissimè debent esse puluerisati.

In quolibet sanguinis profluio & 491.
spuito, non est tutum, statim à principio extrin-

244 *Aphorismorum Medicin.*

extrinsecus corpori administrare refrigerantia. Sic enim sanguis & calor fugiunt & perunt inferiora, unde sanguis tenuior & calidior & fluxibilior fit, unde sanguinis fluxus intenditur.

492. Medicamenta exquisitè mollientia, membris principalibus, & quæ iis vicina sunt, administrata, magnum vitæ periculum adferunt.

493. Curatio à morbi causa semper est incipienda, nisi sæuū aliquod symptoma obstet. Oportet enim Medicū semper respectum habere dextro oculo ad ægri vires, sinistro verò ad morbum. In primis enim virtus seruanda est.

494. In scirrhis affectibus adhibeto medicamenta, quæ tepido calore, ac modicè emolliendi vi prædita sunt. Quæ enim vehementer calida & sicca sunt, id quod tenue est, resoluunt, digeruntque, quod verò crassum est, relinquunt, & in lapideam duritiem cōuertunt. Si vero vehementer mollientibus utaris, nihil resolues, sed potius membrum

brum corrumpes. Idem de melancholicis quoque affectibus intelligendum est.

Topica sæpius sunt mutanda, præsertim, si nullum succedat leuamen. Accidit enim sæpè, ut vna hora medicamentum aliquod ægro commodo sit, altera verò hora noceat, & dolorem excitet. 495.

Odoramenta frigida ex rebus refrigerantibus composita, ut pomum ambræ, semper aliquid odoriferi calorigfici admixtum habent. Quia calida maiorem habent cognationem cum spiritu, quàm frigida. Ad hæc calida sunt, quasi frigidorum vehicula: Faciunt enim ut frigidorum vis melius ad interiora penetret, deferaturque. 496.

Emplastra ad materiam in capite existentem resoluendam, adhibemus, pilis prius nouacula detonsis. Debet autem post abrasionem caput prius panno calente demulceri, ut sic remoueatur frigiditas, soliditas & oppilatio cutis, per ferrum inducta. 497.

Narcotica, corpore inanito & euacuato, 498.

cuato,

246 *Aphorismorum Medicin.*

cuato, offerantur, in vino calido, f
enim celerius ad actum deducun
tur.

499. Narcotica, vesperi, circa introitum
lecti offerantur. Refert autem cœnare
eo die omittere, ne cibus corrumpatur.

500. Embrochis ubi vti volueris, tam æ
gro prius corona ex panno conuoluta
& contorto facta, imponatur capiti, ne
embrocha infusa confestim defluat.
Administrentur autem in anteriori ca
pitis parte, circa coronalem commissu
ram.

501. Repellentia extrinsecus medicamē
ta adhibere in pleuritide, periculosum
Metus enim est, ne materia repellatur
ad cor, aut ne materia crassior, & ad ex
pulsionem ineptior fiat: Ideò semper ab
aiodynus est incipiendum. Sed hic me
mineris, quòd curatio semper à phle
botomia sit auspicanda, & tùm pri
mum anodyna administrentur.

502. Reconualescentes plarunque aliu
durant

luram habent, ob immodicam ciborum in corpus ingestionem.

Quando vteris fomentis, tū sic coo- 503.
beriantur, ne fumus fomenti à pulmo-
ne inspiretur, attrahaturque: quia fu-
ni inspirati calefaciunt, & implent pe-
tus, & faciunt angustiam & calidita-
tem, & febrim augmentant.

Quidam morbi præsertim febres, 504.
libenter per fluxum sanguinis narium
criticant. Ideò cautè agendum est, vbi
caput dolere incipit, cum oxyrrhody-
nis, & aliis medicamentis refrigeranti-
bus, ne impediatur crisis.

Emplastra, vnguenta, & alia topica 505.
medicamenta ad vitia vesicæ, ani, pu-
dendi, matricis, calidè administranda
sunt. Nervosis enim membris frigidum
est inimicum.

Emplastra seu epithemata refrige- 506.
rantia, si administrari debent nobili
membro, tū non actu frigida, sed te-
pida imponantur: nisi intensus admo-
dum calor adsit. Tū enim actu frigi-
da adhiberi possunt.

Quam-

248 *Aphorismorum Medicin.*

507. Quamprimùm refrigerans medicamentum calefit, & deliccatum fuerit, tùm mutetur, & aliud adhibeatur, inque tam diu facias, donec sentias caliditatem membri esse alteratam, & refrigeratam. Si enim vltra modum medicamentum in loco immoretur, tùm supercalefit, nec amplius refrigerat: sed calefacit sua acquisita caliditate.

508. In omnibus vnguentis, ceratis, emplastris, generaliter semper debemus addere aliquid aceti, aut vini medicum, ratione penetrationis, hoc in causa frigida, illud in causa calida.

509. Omnia vnguenta debent administrari calida aut tepida. Ante applicationem verò vnguentorum, debet locus cuius fricari cum pannis calidis, ut porus si aperiantur.

510. Vbi post frictionum, cucurbitulorum, cataplasmatum, fomentorum sum, dolor intenditur, aut grauias fit dolor, aut anhelitus difficultas subsequitur, tùm certum est, corpus non esse sufficiens.

insufficienter purgatum, & aliquid re-
crementorum esse attractum, & si suc-
cedit febris, tunc suspicio adest ab apo-
plemate oborto. Ergo hic, ad membro-
rum mittentium purgationem, & con-
portationem, redeundum est. Hocce-
nim significat corpus esse aut plethori-
um, aut cacochymicum.

Maturatiua, si immodicè vsurpen- 511.
tur, membrum ad gangrænosam pu-
refactionem deducunt.

Sarcoticis ubi vsus fueris, observa 512.
tum parcius, aut nimium siccauerint.
si parcius quàm debent siccauerint,
pusculum fordis adfuerit, & vlcus hu-
midius redditur: si verò nimium sicca-
uerint, vlcus purum absque humore
pernitur.

Loci dolor ubi ex inunctione oleo- 513.
rum augetur, signum est ex olei vsu in-
flammationem augeri.

Vomitu, cholera, dysenteria, & Di- 514.
arrhæa, antequàm corpus sufficienter
purgatum est, cohibita, sæpè succedit
capitis dolor, Melancholia, apo-
plexia,

250 *Aphorismorum Medicin.*

plexia, angina, hydrops, lethargus, phrenitis, arthritis, podagra, aut urinae ardor.

515. Quando in cutis defœdationibus a scabie, corpore purgato, balneis, ac in unctionibus æger non curatur, signum est multitudinis humorum, & eius crassitie. Quare materia de nouo digeratur, purgetur, inungatur & balneetur & curabitur.

516. Humor aut flatus vbi continetur in iuncturarum cauitate, vel rodendo, vel alterando membri complexionem, vel distendendo neruos, musculos ac chondros, excitat intensum dolorem; vbi vero continetur inter os & panniculum ipsum circumadantem, tunc efficit dolorem intensissimum. Quod verò dolorem diu duret, in causa est tenacitas, & crassitudo humorum in densa pellicula inclusorum, & à viribus debilibus segnitè correctorum.

517. Ex immodico adstringentium medicamentorum vsu, intra corpus oblatum, ut in Diarrhæa & ruptura, accidit

idit, aut ventris constipatio, aut vena-
um meseraicarum obstructio. Ventr
aque constipatio tollatur, cum mol-
entibus clysteribus, venarum verò
ppilatio, cum aperientibus, vt decet.

Nonnunquàm ex casu seu ictu, rum- 518.
itur vena cava aut venæ emulgentes,
um sanguis defluit, aut in pectoris cõ-
auitatem, & suffocat ægrum, aut in
entris concavitatem, vnde ventris
umor aut hydrops.

Affiduis curis, meditationibus, iugis 519.
tudiis, laboribus ac vigiliis, principes
partes nonnunquàm plùs æquo inca-
lescunt, præsertim iecur ac caput, qua
ex causa succi, qui in eas partes suapte
natura, vel transmittuntur, vel illíc gi-
gnuntur, earum calore assantur, & ad a-
ræ bilis naturam deueniunt.

In alcola acutus humor & saliuæ ad 520.
tomachum & intestina delata, ac vir-
tutem expultricem irritantia, ventris
fluxum excitant.

De

V.

*De morbis indeterminatis siue
totius, ac primum de febribus.*

521. Vrinae ac pulsuum iudicia atque differentias, exactè scire Medicus tenetur. Quoniam febrium genera, causarum & temporum ipsarum differentiae, his duobus cognoscuntur.
522. Mitioribus factis febribus, aut à suo paroxysmo distantioribus, naturali calore tunc pedibus calefactis, emissio prius lotio, & corpore sudore non madente, atque in hora diei frigidiori, sorbitionem solutivam exhibere poteris, alioqui perniciosum est.
523. Si propter multitudinem materiae, vel eius acuitatem, ante signa digestionis, febricitans incompletè critica avertit, cum pharmaco eradicatio seu scammoniaco, residuum eius materiae non educes: sed facili ac benigno.
524. In febribus acutis incocta morbi materia

materia à syrupis compositis, aut subtiliantibus, omninò abstinendum est.

Fuluum vinum, & nigrum austerrum, acutè febrientibus, capitis gravitatem inducunt, mentem turbant, sputi quoque exitum impediunt, & lotii.

Furor quidam & fletus, ira, tristitiaque, & sollicitudo amplior, quàm oportet, & vigiliæ, quæ super his fiunt, febrim & aliarum ægritudinum sunt principia.

Flava bilis, humoribus cæteris calidior, & siccior, exquisitam sortiens tertianam, si ad ventriculum repat, per vomitum educatur, si verò ad inferiora declinet, per alui subductionem. Urina etiam huiusmodi febrem patientium, potionibus, in quibus apium aut anethum maduerit, prouocanda est. At ubi cōcoctionis signa monstrantur iam, cum fiducia absynthii cremorem exhibere poteris.

Si febrem curaueris cum his, quæ causam eius adaugent, nulla tibi spes erit, per quam hæc febris tollatur. Nam

N

morbi

254 *Aphorismorum Medicin.*

morbi causa adaucta, morbum crescere certum est.

529. Secundum febrium simplicium curam, cura sit compositarum.

530. Alium solvere solutiuis lenibus, & non cum laboriosis, multum iuuat febrientes.

531. Acute febrientium fauces, cum frigidis humectare, haud parum iuuat ægrotantes.

532. Cum in febribus putridis non sit possibile sanari, nisi cesset materiae putredo, quam cessare impossibile est illius causa manente, ob hæc ipsam prius abscindere decet, postea putredinem.

533. Ultra debitam naturæ temperiem, spirituum inflammatio, febrem facit ephemeram: sed ipsorum corporis humorum, intensus feruor putridam febrem gignit, & solidorum membrorum hæcticam.

534. Ex primitiuis causis Ephemera febris, (quam Diariam appellant) dependet. Putrida verò ab antecedentibus, & hæctica à coniunctis.

Febri-

Febrilis caloris generatio, ob calidi 535.
effluuii suppressionem, oritur, aut pro-
pter excessuum motum, succorum vè
putredinem, aut propter caloris extra-
nei cum innato mixtionem,

Febrilis caloris cor sedes esse dici- 536.
tur, quia, si cætera membra priùs inca-
luerint, donec ipsum efferbuerit, nus-
quam febris oritur.

Exuperantes humores, cuiusvis ge- 537.
neris sint, antequam putrescant, febrim
nequaquam faciunt.

Interpolatarum febrium, quælibet 538.
typum habet sibi proprium, ab aliisque
differètem. Rigor enim tertianam, fri-
gus quotidianam, & horripilatio quar-
tanam præcedit.

Tertianam puram pura cholera fa- 539.
cit, cum phlegmate verò mixta, gene-
rat ipsam notham.

Flaua bilis putrescens, caufonem fa- 540.
cit, crocea tertianam, vitellina hemitri-
tæum dat. Prasina autem & æruginosa
in solo stomacho genitæ, nec ipsum
transeunt, nec etiam putrescen-

N 2 tes,

256 *Aphorismorum Medicin.*

tes, nunquam febrim faciunt.

§41. Ex putri pituita, quotidiana febris nascitur. Ex bile solùm tertiana, ab atra verò gignitur quartana.

§42. Vt quantum succi diuersi in corpore ægro accessionum circuitiones euariant: sic tantum error ipsius ægri in regimine factus circuitionis ordinem corrumpit.

§43. A principio primæ accessionis pituitosæ febris, affligentis quotidie, ad principium vsque secundæ eius accessus, inter sunt quatuor & viginti horæ. Tertianæ verò quadraginta octo. Quartanæ autem septuaginta duæ.

§44. Humoris abundātia, aut ipsius crassitudo, si adsit virium corporis debilitas, aut ipsius densitas pororum, longiorem febris accessionem faciunt, contrariis verò accidunt contraria.

§45. Neque incipientibus, nec etiā presentibus, siue appropinquantibus febriliū paroxysmis, cibis erit exhibendus.

§46. Ne virtus à morbi materia concoquenda diuertatur, subtili diætā & cōueni-

uenienti diatabis ægrotantes.

Labore aliquo febrientes, vino suffi- 547.
cienti probè refici possunt.

Vinum, balneum, & epithemata, a- 548.
cutè febrientibus disconueniunt.

Acutæ febris terminus est dies deci- 549.
mus quartus, peracutæ verò septimus.

Ob id quilibet febriens secundum
suæ febris acumen, aptè diætandus
est.

Ventriculum frigidum, pituitosum, 550.
aut ventosum habentes, in acutis febribus,
ab herbis, fructibus, aqua hordei,
& hordeo cocto, penitùs abstinere o-
porteret.

In exquisitis tertianis, à vino, prius- 551.
quam morbus concoquatur, omninò
abstinendum est, at vbi decoqui cœpe-
rit, dandum est ab initio aquosum &
paucum. Vbi verò non propè est, vt
morbus soluatur, largiùs est offerendū.

Hectici semper infrigidandi sunt, 552.
priusquam in marasum, aut in tabem
deueniant, iis tamen melicratum, &
mel, omninò sunt deneganda.

N 3

Cau-

259 *Aphorismorum Medicin.*

333. Causone febrientes, quorum os amarulentum, & desiccatum est, lingua arida & aspera, atque oculi ignei, signis digestionis materiæ peccantis cognitis, permittentibus virtute, tempore, & cōsuetudine, aquam frigidam securè sumere possunt.
334. Ut modicum aquæ igni inspersum vehementius excitat incēdium: sic modicus potus intensè febrienti porrectus sitim vehementiorem facit.
335. Aluo siccata, donec soluta fuerit, nō est cibandus febriens.
336. Inanito stomacho febris accessus veniens, siue exacerbatio, minus ægrotum offendit: repleto verò grauius.
337. Omnes fructus recentes, & multus crudarum herbarum esus, crassaque cibaria, acuta, aut impura, viscosa, vel citò putribilia, dulcia vè, aut styptica, (dū non adsit alui fluor) febrientibus maximè nocent.
338. Inter acutè febrientium cibaria, ptisana colata principatum obtinet. Hordeatum autem post illam, & ipsius hordei

hordei aquæ potus est conuenientiffi-
mus.

Quibus febrium accessus longiores 559.
sunt , aut eorum crises remotiores à
principio , & virtutes plus æ quo debi-
liores , crassiori diætâ , & ampliori hos
refici oportet : Quibus verò cōtrâ, sub-
tiliori.

Febres quæ velociter fiunt , ac ce- 560.
leriter crescunt , etsi valdè tenuem vi-
ctum iis exhibueris , haud magnum ad-
feres detrimentum. Quæ verò sunt diu-
turniores , nisi ab initio grandiori cibo
reficias , hominem cum morbo pariter
perimes , aut intempestiuè victus mo-
dum commutabis.

Omibus acutis febribus sudor su- 561.
perueniens , bonum. Apostemata tamē
patientibus calida , post materiæ dige-
stionem veniens , parùm aut nihil pro-
dest.

Vera tertiana , quæ septem digeritur 562.
paroxysmis , absque periculo patientis
terminatur.

Quotidiana febrî laborantium 563.

N 4

vrina

260 *Aphorismorum Medicin.*

vrina candida, tenuis, spissa, vel turbulenta videtur. In tertianis verò croceatis aut rubicunda. In quartanis verò colore vario, maximè pallido, vel fusco tincta, & indigesta apparet.

§64. Cuilibet febriū generi sudores proprii sunt, maximè intendentibus. Iuvant autem non parū & efferuescentes inflammationes, si vnā cum coctionibus emanarint à corpore.

§65. Ex intermittentibus febribus brevissima quidē, ac mitissima est tertiana. Longior autem, ac quantum in ipsa est, non periculosa quartana. Quotidiana verò intermittens, longa, & minimè periculosa.

§66. Tertianæ febris accessionis brevissimum tempus est, quatuor aut sex horarum: at longissima, vndecim, aut duodecim horas complectitur. Et huiusmodi febrium vrinæ, tertio die, aut ad summum quarto, coctionis signum ostendunt.

§67. Febrium paroxysmi ordinariam horam anticipantes, febrilem materiam super-

superabundare significant, postponen-
tes autem, ipsam diminui.

Secunda febris interpolatæ accessio, 568.
aut continuæ exacerbatio, eadem hora
accedens, qua præcedens accessit, mor-
bi longitudinem indicat. Talium verò
postpositio, ipsius breuitatem.

Quartana febris non facilè homi- 569.
nem ingulat. Vetus verò rarò, nisi Vere
soluitur.

In prima febri protinus mentem ef- 570.
se turbatam, membrum aliquod reso-
lutum, malum.

Sudor frigidus in acuta febri, pesti- 571.
ferus est, atque in omni morbo vomi-
tus, qui varius & multorum colorū est,
præcipueque, si malus in hoc odor est.

Sanguinem in febri vomuisse, pesti- 572.
ferum est.

Ante febres, si caput graue est, aut 573.
ex somno oculis caligant, aut frequen-
tia sternutamenta sunt, circa caput
aliquis pituitæ impetus timeri po-
test.

N 5

Si

574. Si in continua febre puero venter nihil reddit, mutaturque ei color, somnus accedit, ploratque is assidue, metuenda neruorum distensio est.
575. Febris quæ subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè reuertitur.
576. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque causa apparet, vlcus in vulua est.
577. Quibus longæ febres sunt, aut abscessus, aut articulorum dolores erunt.
578. Si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in aliquam partem tandem id malum incumbit, hocque in iunioribus tantum: in senioribus verò ex huiusmodi morbo quartana ferè nascitur.
579. Febrim ardentem subitus horror exoluit.
580. Stridor dentium in febre insaniam significat, si verò iam deliranti accedit, valdè perniciosum.
581. In febre nō intermittente, si labrum, aut nasus, aut oculus, aut supercilium peruertitur, si non videat, si non audiat,

diat, & iam debilis sit, quicquid horum fuerit, mors propè est.

Febris vehemens, vbi rubet corpus, 582.
plenæque venæ tument, sanguinis de-
tractionem requirit.

Magna ex parte febres à bile fiunt. 583.

Febri continua laborans, si habeat 584.
venas latas, grossas & apparentes, &
absque malis accidentibus atque syn-
cope sustinet phlebotomiam, phlebo-
tometur: nisi quid aliud prohibeat, sci-
licet, constipatio ventris, nausea, vel fa-
stidium, dolor stomachi, rauedo vo-
eis. Nam in tali casu omnia ista confir-
mantur, & deteriora fiunt.

Terminus febris peracutæ est quar- 585.
tus dies, quare conuenit ei diætâ ma-
gis subtiliatiua, quia terminus eius bre-
uissimus. Vnde in tali febre solus potus
aquæ sufficit, & si aliter cibaretur, mor-
tis periculum immineret.

Medicina lenitiua, in principio 586.
februm acutarum conuenit, non e-
radicatiua. Materia enim, quæ nondum
est digesta, & in venis ebullit, ma-

N 6

gis

gis accenderetur, & indè mors immineret.

§87. Si febricitanti venter fluat, ne restringas, donec deficere videris ægrotum.

§88. Dolor capitis in febre continua, per clysteres, suppositoria, assumptionem cassiæ fistulæ, ligaturas crurum dolorificas, & pedum frictiones leues leuatur.

§89. Si lingua febricitantis nigra est, significat magnam adustionem materiæ, & sitit infirmus. Assumat igitur pruna in aqua præmollita, eaque teneat in ore, & aquam illam bibat.

§90. Inter sudandum, si anhelent febricitantes, significatur terminus sudoris illius, non etiam nimium cooperiantur, neque multum coacti sudent; sed semper permittantur in libertate, & post sudorem cum rosacea aspergantur, & detur ossa parisi in vino infusa ut recreentur.

§91. Si febricitans acutè patitur nauseam, & nihil potest retinere, indicium est,

est, infirmum stomachum phlegmaticum habere viscosum, & lumbricos, qui materiam commouent.

Si urinae febricitantis incipiunt dealbari, & quantitas urinae non diminuitur, & infirmus habet in se omnia accidentia bona, benè dormit, anhelat, & egerit, indicium est, quod illa febris criticabitur per apostema sub aure, vel in aliquo alio loco. 592.

Quando infirmi recidiuant, oportet cognoscere, an hoc propter malam materiam, quae remansit, aut propter malum cibum, quem infirmus recipit, aut propter aliud accidens contingat. 593.

In cholerice febribus vna vice sanguinis parùm euacuato. Si verò ex aliis humorib⁹ febris existeret, contrarium agito. 594.

Etiam atque etiam considerandum, utrum dolor aliquis pectus ipsum febrientis obsideat, asthma infestet, vel tussis, ne cum acrioribus potionibus, utpote syrupis, hisce in casibus exhiberi cōsuetis, nocumētū ægroto inducas. 595.

596. In febrium acutarum principio, atque fine, fortioribus medicamentis purgantibus nequaquam vtere. Nam materiæ febriles, in venis contentæ, plus æquo commouerentur, ad quod mors sequi solet: sed medicinas benedictas lubricantes, & lenientes securè exhibere poteris.

597. Medicus in principiis febrium ægroti venam incidens, aluumque enematis subducens, si deinde in facie ægroti appareant signa doloris capitis, è vestigio fronti, vel naso sanguisugas, vel cucurbitulas apponere iubeat.

598. Febriens si à ventris profluvio corripiatur, Medicus ne sistat aluum, nisi evidens signum debilitatis adfuerit ex eo. Cauendum quoque ne lingua nigricans efficiatur, quare pruna ex aqua frigida exhibenda, mucilagines seminum citoniorum, psyllii, semina quatuor frigidorum, & similia.

599. Febricitantium non omninò leuiter corpus sibi constare, nec minui, aut etiam plus æquo colliquefieri, malum.

Hoc

Hoc siquidem virium imbecillitatem,
illud morbi diuturnitatem significat.

Quibus per febres sanguinis vnde- 600.
cunque eruperit copia, conualescenti-
bus ventres humectantur.

Febricitantibus si sexto die rigores 601.
fiant, iudicationem habent difficilem.

Quibus accessiones fiunt, quacun- 602.
que hora febris dimiserit, eadem si po-
stero die repetat, iudicatu difficilis esse
solet.

Qui per febres lassitudinem sentiunt, 603.
iis ad articulos, & iuxta maxillas potis-
simum abscessus fiunt.

Si febre detento suffocatio derepen- 604.
tè superuenerit, nullo in faucibus appa-
rente tumore, est mortiferum.

Si febri detento repente collum in- 605.
torqueatur, ac vix deglutire queat, nul-
lo existente tumore, mortiferum.

Sudores febricitantibus boni, qui 606.
manare cæperint die tertio, quinto, se-
ptimo, nono, vndecimo, decimoquar-
to, decimo septimo, vicesimo primo,
vices-

268 *Aphorismorum Medicin.*

viceſimo ſeptimo, triceſimo primo, & triceſimo quarto, ii enim ſudores morbos indicant. Qui ſecus euenerint, laborem & morbi longitudinem, aut eiufdem reditum ſignificant.

607. Frigidi ſudores cum feбри quidem acuta, mortem, cum mitiore verò, morbi longitudinem ſignificant.

608. Febres, quę tertio quoque die vehementius affligentes, non intermittunt, periculoſiores: quoquo modo autem intermiſerint, periculum abeſſe ſignificant.

609. Quos febres longæ exercent, hiſ tubercula ad articulos, vel labores fiunt.

610. Si rigor, febre non intermittente, ægrum iam debilem inuadat, mortiferum eſt.

611. Excreationes, in febribus non intermittentibus, liuidæ, cruentæ, fœtidæ, bilioſæ, omnes malæ: commodè tamen ſi prodeant, bonæ: ſed eadem quoque eſt eorum, quæ per aluum & vrinæ excernuntur, ratio. Si quid verò quod nō iunet per hæc loca excernatur, malum.

In

In febribus non intermittentibus, si 612.
partes externæ algent, internæ vruntur
& sitiunt, lethale est.

In febre non intermittente, ubi diffi- 613.
cultas spirandi & delirium acciderit,
lethale.

In febribus abscessus, qui primis iu- 614.
dicationibus non solvuntur longitudi-
nem morbi significant.

Quib⁹ in febribus, aut aliis morbis, 615.
voluntariè illacrymant oculi, absurdū
non est. Quibus verò præter volunta-
tem, absurdus.

Quibus per febres circa dentes len- 616.
tor quidam obnascitur, iis vehemen-
tiores sunt febres.

Febricitanti sudor superueniens, fe- 617.
bre ægrotum non deficiente, malum.
Prorogatur enim morbus, & plus hu-
miditatis inesse significat.

Si febre ardente laboranti rigor su- 618.
perueniat, solutio fit.

Quibus per febres aures obsurdue- 619.
rint, iis sanguis è naribus profluens, aut
perturbata alius, soluit morbum.

Febri-

620. Febricitantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet reuerti.
621. Quibus in febribus certo die rigores repetunt, eodem febres soluuntur.
622. Quibus per febres morbus regius die septimo, aut nono, aut vndecimo, aut quartodecimo supervenerit, bonum, nisi dextrum hypochondrium durum sit: alioqui minimè bonum.
623. In febribus circa ventriculum vehemens æstus, & cordis morsus, malum.
624. In acutis febribus convulsiones, & circa viscera vehementes dolores, malum.
625. In febribus per somnum pavores, aut convulsiones, malum portendunt.
626. In febribus spiritus offendens, malum est, convulsionem enim significat.
627. Quibus non sine febre urinae sunt crassae, grumosae & paucae, si ab his tenues & copiosae meiantur, profunt. Maximè verò tales redduntur, in quibus statim ab initio, vel non ita multò post sedimentum apparuerit.

Quibus

Quibus per febres urinae turbatae, 628.
quales iumentorum, iis dolor capitis
vel adest, vel aderit.

Si febris sit non ex bile orta, multa 629.
aqua calida capiti superfusa, febrem
soluit.

Si febres tertio quoque die vehe- 630.
mentiores fiunt, nec intermittunt, pe-
riculosae: Quoquo modo autem inter-
miserint, periculo vacare significetur.

Quibus longa tubercula, aut in arti- 631.
culis labores à febre fiunt, hi copiosio-
re cibo utuntur.

Si quis febricitanti cibum præbeat, 632.
quem sano exhibet, valenti robur, æ-
grotanti morbus fit.

Rigores incipiunt mulieribus ex 633.
lumbis magis, & per dorsum perue-
niunt ad caput: sed & viris parte cor-
poris posteriore, magis, quam antero-
re, veluti ex femoribus & cubitis. Indi-
cio est cutis raritas, quam ipsam pilus
ostendit.

Æstivæ quartanæ plerunque bre- 634.
ves, autumnales longæ, & inter eas ma-
ximè,

ximè, quæ ad hyemem vsque pertinet.

635. Qui quartana corripuntur, non admodum conuulsionibus tentantur: si vero prius tentati fuerint, superueniente Quartana liberantur.

636. Quibuscunque in Quartanis febribus sanguis è naribus effluxerit, malum.

637. Quibus siccæ tussis paulum irritantes in febribus ardentibus perseverant, ii non admodum siticulosi esse solent.

638. Quibus in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluuntur.

639. Tertia exquiritur, septenis ad summum circuitibus iudicatur.

640. Somnus in principio paroxysmorum detestatur: In declinatione vero paroxysmi competit, confertque.

641. In acutis febribus detestatur multiloquium, membrorum in lecto disiectio, & in summa omnis motus: sic enim materia agitur, calor intenditur, siccitas augetur, & hectica acceritur.

642. Ingressus multorum hominum in cubiculum, ubi aeger decumbit, in acutis

tis febribus derestatur, quia aër cubi-
culi sic calefit, ob illorum expirationē.

Aër in febribus acutis arte, aut per 643.
se sit frigidus & humidus, vt sic cordis
calor per inspirationem euentetur.
Corpus verò pannis cooperiatur, vt sic
materiæ resolutio per poros cutis, &
venarum, promoueatur.

In febribus habentes corpora reple- 644.
ta, inflata, cum colore plumbeo, illis
inedia iniungenda est. Quia crudi succi
in iis exuperant. Sed illi, quorum oculi
sunt concaui, & cutis sicca & tensa,
paulatim sunt nutriendi & sæpè per
diem. Huic intentioni inseruit aqua ca-
ponis, & lactis amygdalorum vsus.

Situm tolerare in febribus est marty- 645.
rium sine iuuamento, quoniam virtu-
tem debilitat, febres inflammat, vigi-
lias cum angustia multiplicat, conco-
ctionemque retardat.

Somnus nocturnus in febribus in- 646.
ermittentibus competit, quia semico-
tum concoquit, & vtile reddit: Sed in
paroxyf-

paroxysmo detestatur.

647. Vinum in febribus tùm admittitur, vbi signa concoctæ materiæ in vrina manifestè apparent, & cùm febris est in declinatione, & sit vinum album tenue, non vetus, & non nouum, & aqua frigida mixtum. Sic enim omnes evacuationes promouet, & per vrinam, & per sudorem.

648. In febris intermittente, in die afflictionis neque digere, neque moue. At in continuis, exhibe pharmaca temporis, hoc est, tempore matutino, quia tempore frigidioris virtus est fortior.

649. Quidam libentiùs in febribus vtuntur decoctis, quàm syrupis, eò quod syrups sitim augeant, aut facilè inflammantur, & in choleram conuertantur.

650. In febribus digestiua in aurora offerantur: si verò paroxysmus manè inuadit, digestiua vesperi offerantur.

651. In febribus putridis, quicquid concoqui potest, concoquatur, & quod

iam

nam exultum est, nec ampliùs conco-
qui potest. euacuetur.

In febribus potiones pauco saccha- 652.
ro dulcorentur, quia dulcia augent ca-
lorem, & in choleram conuertuntur,
præterea ex dulcibus iecur, ac lien in-
tumescent.

In febrium principiis, quando vrina 653.
est crassa, pauca, habes hypostasim cras-
sam vel in globos, seu grumos confu-
sam, tùm vt ere attenuantibus, vt mate-
rias illas crassiores attenues, & id arte
efficies, quod natura longiori tem-
pore, nisi ab arte adiuta esset, effecisset.

In febribus phlegmaticis cautè agas 654.
in remittente materiæ minorationem, cum for-
mibus aperitiuis & diureticis, præsertim,
ubi ægro debile est caput, ne fortè pi-
uita, febrili calore & medicinis atte-
nuata, sursum ad caput rapiatur, & fa-
ciat lethargum. Quare confortetur ca-
put à principio temperatè stypticis ca-
refacientibus, & vt ere diuersionibus,
frictione, & fomento pedum, sic
clyste-

276 *Aphorismorum Medicin.*

clysteribus & suppositoriis in aluunt
iniectis.

655. In febribus putridis, debili existen-
te virtute, vena non est secanda: Intelligi-
ge, ubi ista debilitas fiat, propter humo-
rum penuriam, & spirituum resolutionem,
& non ob oppressionem virtutis ab
humorum copia. Hic enim vena secan-
da est, quia in tali debilitate virtuti
non restituitur, nisi humorum copia di-
minuatur.

656. In intermittentibus febribus, si sta-
tim à principio venam aperis, tunc ex
intermittente efficies continuam fe-
brim retractis putrescentibus humori-
bus intra venas inanitas, aut sanguine
oblitas, diuturniorem efficies morbum.

657. Nullum maius aut præstātius remedi-
um in febribus ardentibus est, quam ve-
næ sectio usque ad animi deliquium.

Non phlebotomabis, nec purgabis
658. eos, qui hæctica febre laborant.

In febribus putridis venæ sectio com-
659. petit, quando sanguis sua quantitate im-
modicè exuperat, & prædominatur, ut
i

in synocho : Vel quando humor sanguini est mixtus, vel non multum à natura sanguinis distet, absitque, hic urina rubet crassa que est substantia.

Quando in synocho ex sanguinis tantum copia oborto, non statim in principio vena secatur, tum sanguis propter moram fit malignior, & in chole- ram conuertitur.

In acutis febribus pillularum usus detestatur, sicut & alia medicamenta multum siccantia.

Thamarindi in febribus acutis pro- bantur, stomachum enim sua adstri- ctione confortant, & appetitum pro- uocant, vomitum cohibent, sed quia sicca sunt temperatura, ideo iplis pru- na & violæ associantur.

In acutis febribus tantum benedi- ctis medicamentis vttere, & non forti- bus, ne calor intendatur, & humorum bullitio ac putrefactio augeatur, & nectica accersatur, ideo hic infusiones commendantur: humectant enim cor- pus.

O

Cly-

278 *Aphorismorum Medicin.*

664. Clysteris vsus summè commenda-
tur in ardentibus febribus, ad aluum e-
molliendam, humectandam, & vapo-
res excludendos.
665. Myrobalani in febribus admittun-
tur, vbi fluxus ventris complicatur, &
in fine febrium, tùm enim membra cō-
fortant.
666. Rhabarbarum calorificum est, ideò
in aqua Endiuiaë maceratur in febribus
acutis.
667. In febribus acutis & causo detestan-
tur fortia solutiua, ne à materia acuta,
ad intestina retracta, & auersa, fluxus
ventris succedat.
668. In principio accessionum competit
leuis vomitus, in fine verò accessionum
somnus, ac sudor.
669. Vomitus, in omni febre chronica,
summè commēdatur ab omnibus Me-
dicis.
670. In febre continua phlebotomia præ-
cedat catharticum. In febre verò inter-
mittente catharticum, præcedat phle-
botomiam, ne indè fiat febris cōtinua.
- In

In febribus vtiliter clysteribus pur- 671.
gare, humectare, lenire & refrigerare
poteris.

Vomitus à cibo, diutiùs perseveran- 672.
te febre, adeò excellit, vt multos noue-
rim hoc vno præsidio exactè sanatos,
inquit Aëtius.

In febribus acutis, quando testiculis 673.
epithemata refrigerantia adhibentur,
idci nō potest, quàm subito totum cor-
pus indè refrigeretur. Habent enim te-
sticuli cum corde, & aliis membris, col-
ligantiam.

Quando febres producuntur ad 674.
duos menses, tū offerātur Trochisci
de eupatorio, de Rhabarbaro, de absyn-
thio, dialacca, &c. & quoque Diacur-
cuma, ne oboriatur cachexia, aut hy-
drops, ob epatis, cōcoctricis debilitatē.

In febribus acutis, & peracutis, mul- 675.
tū refert cordi epithemata adhibere
refrigerantia, & humectantia, vt sic ca-
lor febrilis extinguatur, & musculo-
rum pectoris exiccatio inhibeat. Ex-
iccatis enim musculis pectoris motus
O 2 impe-

impeditur, & cordis inflammatio maior fit, propter difficilem inspirationem & expirationem.

676. In febribus acutis, ubi calor est intensissimus, cogimur adhibere non tantum intrinsecus, quam extrinsecus refrigerantia, & humectantia, ut calor non nihil mitigetur, ne virtus prosternatur, cum tamen, regulariter operando a causa ablatione, curatio auspicienda foret.

677. Quando in declinatione paroxysmi sudor emergit, tunc omnia localia refrigerantia auferantur.

678. In principio febrium caput oxorrhodino inungatur, ne phrenitis, delirium, aut soda accidat. Si vero crassi vapores iam in capite fuerint collecti, quod ex capitis gravitate, somnolentia, & narium humiditate constat, sic si catarrhus adest, tunc eius usus detestatur. Si tamen metus est, ne accidat phrenitis, his audacter utere. Maius enim nocumentum est id, quod ex phrenitide impendit, quam id, quod ex catarrho nobis

his imminet. Collectis enim iam in capite crassis vaporibus, potius discutientia capiti admouenda sunt.

Aquæ frigidæ potus in syncho ac 679.
cholericis febribus optimè cōfert, post signa coctionis. Sed pura aqua ob suam crassitiem longo tempore moratur in stomacho, ideò facit rugitum, prætereà in magna copia est offerenda. Si enim parùm bibitur, tum à calore febrili vincitur, & in vapores acutos conuertitur, vndè febris intenditur, augeturque. Si verò in magna quantitate assumitur, tum cholera vincitur, refrigeratur, & inspissatur.

Syncope in febribus vbi assiduè affligit, propinamus vinum, etiamsi inde febris augeatur. 680.

Absinthii vsus in febribus conceditur, vbi signa coctionis in vrinis apparent. 681.

Quia membra ob febrilem calorem 682.
facta sunt laxiora, rarioraque, & quia membra etiam facta sunt debilia, ob immodicam spirituum inanitionem,

O 3 reso-

resolutionemque : ideò confortentur medicamentis refrigerantibus, de quadam vi astrictoria participantibus, ut sic membrorum substantia cogatur, detestetur, & spiritus uniantur, quò minùs & spiritus, & calor natiuus, exhalent, transpirentque. Horum usus in principio, antequàm materia euacuata sit, detestatur, sic enim recrementa in loco affecto, seu in corpore detinentur, cōpingunturque, ut minùs euaporare, transpirare, exhalareque possint.

683. Siquis, in conualescentia cuiuscunque febris, habuerit signa indigestionis: quæ sunt, os insipidum, fumosum, vel acetosum, & propriè cum prostratione appetitus, vel corruptione eius, sicut est appetitus carbonū, vel argillæ, significat recidivam, propter stomachum nō benè mundatum à noxiis humoribus: Redi igitur ad euacuationes, & digestiones, illi materiæ conueniētes.

684. Quādo epati, in acutis febribus, vehementer refrigerantia administrare intendis, tūm semper aliquod caloricum

cum epati appropriatum admisceto,
vt aquam absinthii, vel puluerem ab-
sinthii.

In febribus acutis, vbi timor est, ne 685.
succedat hectica, tùm pannus lineus,
in aqua violarum, aut lactucæ infusus,
toti dorso tepidè applicetur, vel inun-
gatur spina dorsi oleo violarum, aut la-
ctucæ. Quod si refrigerare volueris ve-
hementius, vtiliter olea ista cum aqua
violarū aut nenupharis lauare poteris.

In acutis febribus refert ægrum in 686,
manibus tenere frustum crytalli, sæ-
piùs in aqua frigida rosacea infusum.
Similiter etiam in ore tenere crystal-
lum aqua sæpiùs aspersum.

In acutis febribus sæpiùs accidit 687.
phrenitis, aut dolor capitis, propter e-
leuationem vaporum ad caput. Ideò
refert capiti administrare oxyrrhodi-
non, & collo epithemata frigida, facta
ex aqua rosacea, plantaginis, violarum,
lactucæ, santalis albis, & rubeis, spodio,
coralliis albis, rosis rubris, &c.

O 4

In

688. In febribus acutis secundum longitudinem spinam dorsi refrigerantibus, & humectantibus inungere, summum est remedium, eò quòd vena caua & arteria magna, ibi sitæ sunt.
689. In febribus acutis, quando linguæ adest asperitas, siccitas, & nigredo, tum plurimum refert inungere collum ac guttur oleo violaceo, & in ore ea, quæ os humectant, gestare, & sub ceruice non habere puluinar ex plumis, sed potius ex corio.
690. Circa balneum eorum, qui habent febres putridas, tria sunt obseruanda: Primum, vt non accidat rigor, seu horror, in balnei introitu: secundum, vt nullum membrum principale debile sit: tertium, vt non existat crudorum humorum circa primas venas quantitas multa.
691. Febrem quotidianam impossibile est esse absque stomachi læsione, sicut impossibile est esse quartanam absque ægitudine splenis.
692. Saccharum rosaceum recens optimè

mè confert in febribus acutis, quia est lenitium & confortatium, sicut & iuleprosarum.

In febribus acutis, res saluberrima 693. est, refrigerare epar, epithematibus, & fomentis.

Hectica, quando procedit ex lique- 694. factione, in qua apparet vinctuositas in egestionem, tùm offer in potu gelidam aquam velociter, & cibaria refrigerantia, humectantiaque, & aër hic frigidissimus inspiretur.

In hectica febre semper cordi occurrendum est, non tam intrinsecis, quàm extrinsecis. 695.

Plurimum refert in febribus, epithemata refrigerantia pectori, seu cordi imponere. Nec obstat, quod quidam dicunt, fuligines, & vapores in pectore detineri, vnde calor intendatur. Hoc enim in pectore non est timendum. Quia in pectore non est necessarium, ut acuti fumi, & vapores per poros cutis transpirent, cum vapores continuo per asperam arteriam transpirent. 696.

VII.

*De Febris pestilentibus, seu
de Peste absolutè.*

697. Smaragdus, in febris pestilentibus, si non potest vincere morbum, frangitur.
698. Pestiferis morbis inchoantibus, virtute consentiente, digestio peccantis materiæ non est expectanda: sed eradicatio euacuatione, celeriter vacuanda.
699. Pestilens aëris constitutio, febrem lethalem adfert, ob id, in aëre infecto aliquantulum versari, aut illis, qui iam infecti sunt, vicinari, periculosum est.
700. Apostema pestiferum, si febrē præcesserit pestilentialem, in sui principio, dum virtus adhuc fortis est, exigat phlebotomiam, de proximiori vena, ad syncopem usque, ut de materia venenosa, quantum possibile est, (vita salva) educatur, & febris aduentus prohibeatur. Si verò hoc apostema ad talem febrem sequatur, aut cum ea simul
inci-

incipiat, phlebotomia tunc mediocris sufficit, quæ citò facienda est, alioqui plùs nocet,quàm proficit.

Nausea, in pestilentia, malum præ- 701.
sagium est.

Potiones, in pestilentibus febribus, 702.
non actu calidæ offerantur. Sic enim febrilis calor intēditur, appetitus pro-
sternitur, corpus rarefit, spiritus exha-
lare facit, & virtutem sic debilitat.

In febribus pestilētialibus stultè fa- 703.
ciunt Medici, qui, antequàm materia
putrida phlebotomia, aut cathartico,
aut sudorem prouocantibus, sit immi-
nuta, nō tam intrinsecùs, quàm extrin-
secùs frigida styptica administrant, sic
enim materia putrida venenosà in cor-
pore detinetur, & non euentatur. Vn-
dè febris intenditur, & malæ qualitatis
venenosæ in corde sic fit impressio.

In pestilentiali febre statim à prin- 704.
cipio, constante adhuc virtute, ve-
na secetur, postea euacuetur mate-
ria cathartico styptico, & fiant confe-

288 *Aphorismorum Medicin.*

ctiones, & Electuaria ex his, quæ veneno aduersantur.

705. In febribus pestilentialibus venæsectione adhibita, cor extrinsecus epithematibus refrigerantibus est confortandum, ne à venenosis vaporibus lædatur.
706. Camphora humores præseruat à putrefactione, ideò competenter offertur contra morbos epidemiales.
707. In peste orto carbunculo, anthrace, bubone, aut alia venenosa pustula, nullo modo repellentia medicamenta administrentur, ne materia venenosa repellatur ad principalia membra, sed potius attractiua imponatur, vt sic materia venenosa euocetur, & à membro nobili ad ignobile auertatur.
708. Tempore pestis, vel in pestilentiali feбри, vbi dolor emergit secundum aures, aut sub axillis, aut circa inguina, tū apponantur emplastra calida attractiua, sic etiam affigantur cucurbitulæ absque scarificatione.
709. In medicamentis præseruatiuis, tem-

tempore pestis exhibendis virginibus, ac mulieribus, omittantur bolus armena, terra sigillata, camphora, &c. hæc enim menses remorantur, quibus retentis, facilimè febre pestilentiali corripiuntur: sed eis exhibeantur medicamenta, quæ sint concinnata ex rebus eiusmodi, quæ simul & veneno aduersentur, & menses euocent.

Ex bubone febres omnes malæ, 710.
præter ephemeræ.

Defensiuæ & repellentiæ medicamenta nequaquàm in circuitu Bubonis in peste administrentur, donec materia tota sit fluxa, & collecta.

Quando apostema in febre pestilenti 712.
obortum, est valdè nigrum, nequaquàm vehementia adhibeas ruptoria & caustica, ne materia accendatur, & fiat acrior, maligniorque. Et cum vlcus consolidare volueris, tum semper & sæpè medicamenta purgantia, & pulueres venenum expellentes, & cor confortantia, offeras, ne cor de nouo inficiatur.

O 7 In

713. In peste, variolis, ac morbillis, & morbo gallico, in principio nequaquā frigida & styptica sunt neq; intrinsecus neq; extrinsec^o exhibēda, ne ebullitio, q̄ accidit, vt videre est in musto, vbi natura fortis est, & humori exuperāti dominatur, & ipsum expellere vult, extinguatur, & sanguis impurus reddatur, detentis in corpore superfluitatibus, vndē plerunque mors, sed materia expulsa, & pustulis exortis, tūm audacter frigida dētur, ne ex ebullitione perfectiua, fiat ebullitio corruptiua. In principio enim ebullitio perfectiua est promouenda Diaphoreticis, & nō frigidis impedienda. Quando itaque obortis variolis, pustulis, vel apostemate pestilenti, vides symptomata peiora fieri, scilicet, fieri maiorem febrem, sitim, angustiam, linguæ nigredinem, hæc enim signa sunt certa corruptiue ebullitionis. Quare refrigerantia audacter offeras, ne æger pereat.

714. Ebullitio duplex est, vna depuratiua, seu mundificatiua sanguinis, altera corru-

corruptiua sanguinis. Hæc autem fit, vbi ebullitio est superflua, & excedit modum.

Omnis rei putredo à calore fit non 715. natiuo : sed extraneo. Proprius enim conseruat, alienus verò corrumpit.

VIII.

De Venenis.

Medicinæ venenum attrahentes, 716. sua caliditate, vel totius substantiæ suæ similitudine, id præstare dicuntur.

Venenosorum animalium morfibz 717. impositæ cucurbitulæ, venenum extrahunt. Eadem impositæ emunctoriis, materiam pestiferam à membris principalibus attrahunt.

Mortiferam potionem bibentibus, 718. viridis eorum cutis, aut nigra efficitur, statimque putrescit.

Quando aliquis est morsus à rabio- 719. so cane, aut vbi ictus est à venenoso animali, tùm confestim optima theriaca, ad quantitatem castaneæ, in vino

vino odorifero exhibeatur, & loc⁹ ict⁹ supra & infra corrigia ceruina theriaca illita, fortiter deligetur, & scarificetur profundis vulnusculis, & affigatur cucurbitula, vel admoveatur cul⁹ gallinæ deplumatus rostro clauso. Vtilissimum etiam est, locum ictum cauterizare cū candenti ferro, aut cum oleo sambucino feruenti. Quotidie aliquid, quod cor confortet, & bezoarticum sit, offeratur, & extrinsecus etiam cordi epithemata adhibeantur.

720. In principio, quando aliquis à rabioso cane vulneratus, aut venenato serpente ictus est, æger arceatur à somno, sic etiam non fiat phlebotomia, nec administretur clyster, nec vomitus prouocetur, neque pharmacum deiectorium exhibeatur, nec sudor prouocetur. Post spacium autem trium dierum, purgetur atra bilis cum decocto epithymi in sero caprino, & vtatur diæta humectante ac Melancholicorū. Quando verò locus incipit denigrari, signū est, quod punctura seu morsus sit venenosus,

nosus, ideò si fieri potest membrum re-
secetur, si verò id fieri non potest, tùm
sine mora cauterisetur, & hîc, vt in
sphacelo, procedas.

I X.

De Doloze.

Quoniam dolor acuit rheuma, & at- 721.
trahit humores à sedibus affectis, ante-
quàm prauos succos educas, dolorem
priùs compesces.

Quamuis aliquam noxam sciueris 722.
ex narcoticis medicamentis membris
patientibus affuturam, nihilominùs ad
id, quod magis vrget, accedas, & homi-
nem ex nimio dolore animo deficien-
tem, parua cum noxa liberares. Sequenti-
bus namque diebus si magnam noxam
membris illatam videris, hanc emen-
dare tùm licebit.

Infantum dolores tribus modis le- 723.
uantur: nutricis papilla ori eorum ap-
posita, motu mediocri, & vocis modu-
lamine.

Si

724. Si virtus à dolore dissoluatur, & periculum immineat, propter hoc quidē oportet mitigare dolorem, roborareque naturam, ut repugnare possit, & ad tempus sufficere medelæ.
725. Dolor per essentiam ægrum affligens, ipsum tam diu molestat, quam diu completam receperit curationem, Is autem, qui propter alterius affectus membri consensum acciderit, sedis affectæ soluto vitio, facile soluitur.
726. Medicinæ dolorem verè sedantes, subtilis sunt substantiæ, & in primo calidæ, quæ rarefaciendo, maturando, & subtiliando, à membris coarctum evacuant humorem, atque ipsum resolvunt.
727. Ex duobus simul doloribus non eundem locum occupantibus, qui vehementior est, alterius sensum obscurat.
728. Dolor duo ostendit, aut continui solutionem, aut subitam alterationem, & malam complexionem.
729. Dolor ubi sævit, semper in primis mitigetur, aliàs enim seipsum auget
attra-

attrahendo & ad se humores auertendo.

Dolor nonnunquã est causa syncope, 730.
pes, auertendo scilicet immodicè à
corde sanguinem & spiritus, vnde cor-
dis refrigeratio, & vitæ extinctio.

Nonnunquàm accidit dolor frangi- 731.
tius & acutus, perinde ac si ossa fran-
gerentur, cum scilicet humor vel ven-
tositas existit inter os, & panniculum
os ambientem, ipsum separans.

Dolor fortis vbi membrum aliquod 732.
affligit, tùm inprimis dolor mitigetur,
ne plus materiæ attrahatur, & crudi
succii in corpore coaceruentur, auerso
spiritu & sanguine à stomacho, vnde
cruditas seu vomitus.

Dolorem quemlibet mitigamus, 733.
aut temperaturam malam alterando,
aut materiam resoluendo, scilicet ano-
dynis, aut sensum stupefaciendo, vide-
licet narcoticis.

Anodyna & dolorem mitigantia, 734.
actu calida, & non frigida administrā-
da sunt.

In

735. In dolore spatulae, non debemus adhibere fortia repellentia, ne materia repellatur ad pulmones & cor, & subita indè succedat mors.

X.

De Doloribus arthriticis.

736. In sui principio sciatica mitigantibus pharmacis, non multum infrigidantibus, aut calefacientibus eget. Chiragra autem & Podagra reperiuntur. Omnium autem curatio præcipua est, causantium humorum euacuatio.
737. Vomitu sciaticos magis, quam alui fluore, ab initio euacuando, iuuabis.
738. Enemata fortia cum colocynthide facta aut cucurbitula loco dolenti admoda, auxilium sciaticis maximum adferunt.
739. Quibus articulorum dolor certis temporibus reuertitur, hos antè & curioso victu, & crebro vomitu, ne inutilis

tilis materia in corpore supersit, cauere oportet.

Articulorum vitia, vt podagræ, chi- 740.
ragræque, si iuuenes tentâriat, neque
callum induxerint, solui possunt.

Articuli si sic dolent, vt super eos tu- 741.
bercula quædam innata sint, nunquàm
liberantur.

Vinum ieiunis potum, articulis no- 742.
cet.

Podagræ veteres, quæ vario humo- 743.
re proueniunt, sanari non possunt.

Articularius morbus membra resol- 744.
uit, quæ, si non mouentur, & macres-
cunt, in pristinum habitum non reuer-
tuntur, magisque, si vetus malum est,
vel senectuti acciderit.

Nux indica, & saluia parùm cocta, & 745.
crebrò sumpta in fine refectionis, iun-
cturis & neruis, præ cæteris terra na-
scentibus multipliciter sunt amica.

Qui sæpiùs calcât vuas, ac musto re- 746.
centi balnear pedes suos, rarissimè Po-
dagra laborat.

Articulorum tumores & dolores 747.
absque

298 *Aphorismorum Medicin.*

absque vlcere, atque etiam podagricos
& conuulsiones magna ex parte frigi-
da largè effusa, leuat, & extenuat, sol-
uitque dolorem. Nam modicus torpor
doloris soluendi vim habet.

748. Eunuchi podagra non laborant, nec
calui fiunt.

749. Qui podagrici morbi fiunt, sedata
inflammatione intra dies quadraginta
conquiescunt.

750. Dolores podagrici Vere & autumnò
ferè mouentur.

751. Quibus longo coxendicum dolore
conflictatis, femoris summum coxa ex-
cidit, rursumque recidit, iis mucosa i-
bidem pituita colligitur.

752. Quibus diurno dolore Ischiadico
vexatis femoris, caput coxa excidit, iis
femur contabescit, & claudicant, nisi
vrantur.

753. In arthritide pillularum vsus magis
probat, quàm solutiui deco-
ctum. Quia pillulæ diutiùs in ventre
morantur, & à remotioribus euacuant.

In

In podagra & chiragra, quando dex- 754.
tra manus molestat, tùm reuellendi
gratia in principio secetur vena dextri
pedis. Tamen, si pedes à natura essent
debiles, tùm potius epatica sinistrae
manus tundatur, ne fluxio ad pedes a-
uertatur.

In iuncturaru dolore, vt in podagra, 755.
vbi vrina est inculcata & naturalis, tùm
certum est, materiam antecedentem,
quæ est in venis, esse digestam & co-
ctam. Ideò hîc nulla digestiua amplius
intra corpus sunt offerenda, sed mate-
ria coniuncta, quæ extra venas in iun-
cturis existit, emplastris & cataplasma-
tibus discutientibus est digerenda & e-
vacuanda.

Quando dolor iuncturarum seu po- 756.
dagra in febris acuta ratione crisis fit,
tùm materia non est ad superiora re-
pellenda, & auertenda ad membra sci-
aticæ principalia, nec repellenda cum
fortibus repellentibus.

Quando in sciatica accedit iunctu- 757.
ræ dislocatio, ob humorem mucilagi-
nosum,

300 *Aphorismorum Medicin.*

nosum, ibi contentum, qui ligamenta
immodicè humectat, vnde prolongan-
tur, & iunctura dislocatur, hîc confertur
vsus cauteriorum plurimùm, sic vesti-
catoria & rubificantia.

758. In sciatica immodicè mollificanti-
bus nequaquam vtaris, quia indè, ner-
uis mollificatis relaxatisque, coxa exci-
dit prolabiturque. Sic non vtendum
est fortibus ac nudis resolutiuis, ne par-
tibus subtilioribus resolutis, materia
incrassetur, petrificeturque, & quasi as-
setur. Consent itaque medicamentis
ex mollificatiuis, resolutiuisque simul
mixtis.

759. In regimine præseruatio à Poda-
gra non tutum est offerre digestiua, &
solutiua fortia, quia hîc non opus est
materiam à pedibus euacuare, quando-
quidem nullus adsit dolor, & materia
lædens in pedibus non existat. Nam si
materia in pedibus iam existeret, iam
non esset intentio ad præseruandum
sed ad curandum. Sic enim boni succi
membris vtiles, exhauriuntur, vnde pe-
de

des debiliores redduntur, & ad recipiendum aptiores. Ideò turpiter errant, qui in præservando pillulas de hermodactylis exhibent. Hic etiam refert ante horum vsum crura debilia stypticis confortare, ne materiam à cathartico motam recipiant, admittantque.

Ex immodico discutientium medicamentorum vſu in arthritide, accidit membrorum incurvatio, ſeu in motu & progreſſu difficultas, ob neruorum, lacertorum, & chordarum nimiam exiccationem, vnde membrum ob horum duritiem difficulter flecti & extendi poteſt.

Quando in arthritide accidit colica, tum tollitur articulorum dolor, quia humor cauſans arthritidem ad inteſtina ſublatus eſt.

XI.

*De Morbis internis, ac primò
supremi ventris siue
capitis.*

762. Sanguineo, biliosoque dolori capitis, cucurbitulæ occipiti cum scarificatione appositæ, conferunt.
763. Cucurbitulæ scarificatæ inter scapulas, & ad cubitos, ad manusque exteriores, & sub mento admotæ, pustulis, ruboribusque faciei, maximum adferunt remedium.
764. Habentes calidum epar faciliè patiuntur dolores capitis.
765. Dolores capitis, quibus oculorum caligo & rubor cum quadam frontis prurigne accedunt, sanguinis profusione vel fortuita, vel etiam petita, summoventur.
766. Si caput in febris continenti dolet nec quicquã reddit, malum atque mortiferum est, maximeque id periculosum in pueris, à septimo usque ad decimum

num quartum annum.

Si sine causa longus dolor capitis est, 767.
& in ceruicem, & scapulas transit, rur-
susque in caput reuertitur, perniciosus
est, nisi vomitam aliquam excitauit, sic
ut pus extussiretur, aut nisi sanguis ex a-
liqua parte prorupit, aut nisi in capite
multa prurigo, totovè corpore pustulæ
ortæ sunt.

E parte capitis posteriore laboranti, 768.
in frontem rectà excurrent, vena incisa
prodest.

Capite dolenti & vehementer labo- 769.
ranti, pus, vel aqua, vel sanguis per na-
res, aut os, aut aures effluens, morbum
soluit.

Qui valentes, capitis repentè dolo- 770.
ribus corripuntur, & protinùs muti fi-
unt, & stertunt, intra septem dies inter-
eunt, nisi febris interuenerit.

In capitis affectibus ad intemperiem 771.
eius alterādam, non tantum utimur in-
unctionibus, fomentis, epithematibus,
& emplastris, sed & talia per nares & au-
res iniicimus, & odoramentis utimur.

772. Sacculi, qui ad confortandum caput administrantur, in anteriori parte capitis debent applicari, quia in communi sutura coronali, cranium tenuissimum & rarissimum est, sic tamen ut prius si calefacti vapore resoluti ab aqua vitæ calente, lateri inspersa.

773. In capitis affectibus nequaquam sternutatio est prouocanda, antequam corpus probè sit euacuatum, ne si perfluitates omninò ad caput auertantur.

774. In dolore capitis, in morbis acutè agendum est cum localibus, circa caput adhibitis, in diebus criticis, & crisis per profluium sanguinis intercipiatur, impediaturque.

775. Quibus diuisum est cerebrum, hanc febrem & biliosum vomitum superuenire est necesse.

776. Quibus cerebrum syderatum est, intra dies tres intereunt: si verò hos superauerint, sani sunt.

777. Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussum, mutatur.

nutos procius fieri est necesse.

In intemperie capitis calida, nequa- 778.
quàm intensè refrigerantia adhibean-
tur, ne modicus calor extingatur, vt
in senibus, mulieribus, eunuchis, pue-
ris, albis, hoc est, phlegmaticis, sic in ca-
pitibus catarrho obnoxiiis. Hic remis-
se refrigerantibus vtere.

Ventrem mollire, capitis doloribus 779.
tile est.

In omnibus cephalæis quotidiana 780.
ecum expulsio iuuat ægros.

In omnibus capitis passionibus fri- 781.
atio pedum, & tiliarum, præstans re-
medium.

In cephalalgia optimè cōferunt my- 782.
robalani, si non adest febris. Si verò fe-
bris adest, non conferunt, quia hoc in-
dicat, materiam peccare in ambitu to-
tus. Si verò non adest febris, compe-
unt mirobalani, quia vi sua adstricto-
ria comprimunt vapores deorsum, id-
cò in vertigine optimè conferunt.

Quando caput intemperie laborat 783.
calida, & stomachus frigida, vnde ex

P 3 capite

capite ad stomachū catarrhus defluat
 calidus, aut quando stomachus laborat
 intemperie calida, caput verò frigida &
 à capite frigidus catarrhus ad stoma-
 chum procumbat: In isto casu vitanda
 sunt omnia vaporabilia & fumosa, & in
 fine mensæ assumantur ea, quæ arceant
 ascensum vaporum ad caput, sicut sunt
 citonium, coriandrum, mastix, &c. Po-
 tiones verò nonnunquam respiciant
 caput seu catarrhum, nonnunquam ve-
 rò stomachum, nonnunquam vtrum-
 que simul. Quæ verò horum intempe-
 riem emendent, illa potiùs extrinsecùs
 adhibenda sunt. Si verò necessitas requi-
 rit intrinsecùs offerre ea, quæ membro
 in primis affecto & læso conferant, tùm
 interim extrinsecùs membro minùs af-
 fecto ea administrentur, quæ ipsum
 confortent, ne ab assumptis per inte-
 riora lædatur offendaturque.

784. In dolore capitis vinum summope-
 rè cauendum.

785. Capillorum defluuium, quod ætate
 contingit, nunquam restituitur.

Inten-

Intensus capitis dolor insinuat, ma- 786.
teriam existere in membranis cerebrū
ambientibus.

Cogitatio vehemens & imaginatio, 787.
in principio morborum capitis, impro-
bantur. Quia humores & spiritus sic ad
caput attrahuntur.

Multa lux, & tumultus, & quicquid 788.
evigilare facit, lethargicis multū con-
fert.

In lethargo in principio, sic & in a- 789.
liis capitis affectibus, in initio sternu-
tamenti vsus improbatur, ne scilicet
materia concitata in cerebro ad ven-
triculos cerebri defluat, & efficiat epi-
lepsiam seu abscessum, vel procumbat
ad pectus, & suffocet ægrum. Ideò à
principio leuibus vtere sternutamen-
tis, sed facta digestionem, & ventris eua-
cuatione, tūm refert fortiorib⁹ vti ster-
nutamentis.

In frigidis capitis affectibus, vt in 790.
lethargo, &c. nequaquam cucurbitu-
læ cum scarificatione circa nucham af-
figantur, ne refrigeretur cerebrum,

P 4

& au-

& augeatur causa antecedens, sic nequaquam à venis vicinis extrahatur sanguis, sed potius à remotis.

791. In lethargo, in principio repellentia & oxyrrhodina administranda sunt, in anteriori capitis parte, & non in occipite. Frigida enim nervis sunt inimica. Resolutiva verò tutius adhibentur in occipitio, quia calida nervos non lædunt, præterea per suturam lambdoidem virtus medicamenti potest penetrare.

792. Lethargum febris subsequitur lenta, subeth verò sen carum præcedit vehementior.

793. Excedens cibi & potus quantitas, ciborumque fumosorum comestio, memoriam multum lædit.

794. Fructuum stypticorum, & coriandri præparati, post comestionem, temperata assumptio, prohibendo fumos ad caput eleuari, memoriam iuvat valde.

795. Sollicitudo visorum, vel auditorum, frequens recordatio, memoriam confirmat, & roborat.

Apo-

Apoplexia subito accedens frigida, 796.
crassa, ac viscosa materia, cerebri ven-
triculos occupantis indicium est.

Cucurbitula supra collum posita, 797.
apoplecticos interdum ad vitam reuo-
cant, & exuscitant.

Apoplexiæ fiunt maximè à quadra- 798.
gesimo anno usque ad sexagesimum.

Vertiginosis senibus apoplexia faci- 799.
lè imminet.

Grauiissima cephalæa, & maximè in 800.
repletis, futuram prædicit apoplexiam.

Apoplexiam fortem nullo prorsus 801.
modo debilem ægrè curaueris.

Apoplexia ubi accidit ob sanguinis 802.
redundantiam, venas replentem & ob-
struentem, quod constat ex faciei rube-
dine, seu fuscedine, diæta euchyma præ-
cessit, & sanguinis missio diu posthabi-
ta, hinc multum sanguinis auferatur.

In apoplexia, ubi ægro non potest 803.
immiti clyster, tum inserenda sunt ano-
fortia suppositoria, & intra corpus pil-
lularum de euphorbio, vel cochiarum
scrupuli quatuor cum aqua lauendulae

P 5 effe-

310 *Aphorismorum Medicin.*

offerendi. Debēt autē pillulæ istæ prius puluerisari: Nō enim possunt deglutire pillulas, qui apoplexia correpti sunt.

804. In omni apoplexiæ specie, sic in syncope, cū venis ad ægrum, tūm eius os aperias, imponendo ligni frustum.

805. In apoplexiæ paroxysmo, primò in aluum iniicias acutum clysterem, aut suppositoriū acutū ano inferas, postea errhina & sternutatoria administres.

806. In apoplexia spiratio est cum stertore, aut intermittens, aut difficilis, in subeth verò illæsa & inculpata.

807. In apoplexia facies ægri similis est homini viuo: In syncope verò homini mortuo.

808. Quicunque iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione maximè ætatis, & temporum & locorum, & victuū quoque, liberantur.

809. Morbus comitialis post annum vicesimum quintum ortus, ægrè curatur, multoque ægrius is, qui post quadragesimum annum cœpit.

810. In morbo comitiali, si simul totum corpus afficitur, neque antè in partibus

aliquis venientis mali sensus est : sed homo ex improviso concidit , cuiuscunque is ætatis est, vix sanatur.

Si in comitali morbo mens læsa est, 811.
aut neruorū facta resolutio, spes nō est.

Bilis atra, quæ ex succorum adustione nascitur, fit nociua valdè: Nam dū illa accenditur atque ardet, concitatos furentesque ipsa solet facere. 812.

Insania timenda est, vbi expeditior alicuius, quàm sani fuit, sermo est, subitoque loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior, aut vbi rarò quis & vehementer spirat. 813.

Insanis si varices, vel hæmorrhoides superuenerint, insanix solutio. 814.

Ab insania, quam Maniam græci vocant, difficultas intestinorum, aut hydrops, aut ecstasis, bonum. 815.

Deliratio, quæ cum risu fit, tutior: quæ verò studio adhibito, periculosior. 816.

In delirantibus nihil meliùs, quàm detondere capillitium, somnum provocare, & silentium imperare. 817.

Frequens oculorum motus nullo dolore substate, somnus ereptus con- 818.

312 *Aphorismorum Medicin.*

tinuaque nocte, & die vigilia, insolitus dentium stridor, insanix signa sunt.

§19. Suffusæ mulieris mammae sanguine, furorem futurum esse testantur.

§20. Auris dolor acutus cum febre continua, vehementique, sæpè mentem turbat, & ex eo casu iuniores interdum die septimo moriuntur: seniores tardiùs, quoniam neque æquè magnas febres experiuntur, neque æquè insaniunt.

§21. Phrenetico, si ambo genua rosea facta fuerint, solida cum inflammatione, ipsa die moritur.

§22. Qui supra quadraginta annos phrenetici fiunt, non omninò sanantur, minùs enim periclitantur, quorum naturæ & ætati morbus sit conueniens.

§23. In phrenitidis principio secetur mediana, quia materia hîc est in fluxu, in statu verò cephalica, quia materia hîc iam est fluxa.

§24. Quibus in phrenitide vena non potest secari, illis in principio cucurbitulæ

bitulæ in brachiis affigantur, vbi verò materia iam fluxa est, in occipitio hæc apponantur.

In phrenitide vtimur oxyrrhodi- 825.
nis, & aliis repellentibus actu frigidis, quando febris adest intensa cum raptu materiæ multo, sic in æstate, ac si medicamentum subtilis est substantiæ.

In phrenitide vtimur oxyrrhodinis 826.
& aliis repellentibus actu tepidis, quando febris adest mitior, cum raptu materiæ pauco, sic in hyeme, ac si medicamentum crassæ est substantiæ.

In phrenitide post diem quartum 827.
primùm adhibemus resolutiua, vt catulos, vel pullos, vel pulmones arietis calidos. Hæc omnia, quamprimùm incipiant refrigerari, deponantur, & alia calentia admoueantur. Si his statim à principio vtimur, tum plùs materiæ attrahitur, vndè apostema & febris augentur. Hæc resolutiua non solùm in vera phrenitide conferunt: verum-
etiam in phrenitide non vera à ma-

P 7 teria

teria vaporosa in capite retenta, resol-
uunt enim eam.

828. In phrenitide, ipsa vnguenta & em-
plastra, non debent frigide apponi, ne
pori constringantur, & fumi retinean-
tur, qui deinde maioris desipientiae
causa sunt.

829. Quemadmodum externae tenebrae
omnibus hominibus pauorem incu-
tiunt: sic atrabilis color, mentis sedem
tenebris similem reddens, timorem in-
ducit. Ob id melancholici, cum timo-
ris causas secum deportent, semper ti-
midi sunt.

830. Melancholia seu tristitia animi, lon-
gas ægritudines, tanquam umbra cor-
pus sequitur.

831. In omnibus morbis melancholicis,
animi accidentia, quæ siccant, vitanda
sunt, ut timor & tristitia, lætitia verò o-
ptimè competit.

832. In melancholicis morbis, quando
melancholicus succus non est sanguini
mixtus, vel quando sanguis in corpo-
re existens, paucus est, tum venæ
sectio

sectio non conducit, sic enim sanguis calidus & humidus, qui malitiæ melancholiæ, & eius siccitati & frigiditati resistit, educitur. Hoc in casu melius est, humorem Melancholicum prius purgare, & educere, quàm venam secare.

In melancholicis morbis opera danda est, ut æger fiat obesus, & pinguis. 833.

Ufus multi aceti generat quidem melancholiam, in melancholicis tamen affectibus medicamenti non nihil additur, penetrationis saltem gratia, & ut dissecet & attenuet humoris crassitiem. 834.

In melancholicis morbis semper vana confortetur cor, præcipuè cibo cucurbitulæ chymo, & facilis concoctionis, ut inde spiritus synceri ac boni generentur. 835.

Nervorum origini cucurbitulæ superpositæ, ipsos calefaciunt, ob id curant paralyticos. 836.

Quacunque parte corporis membrum aliquod resolutum est, si neque movetur, &

& emacrescit, in pristinum habitum nō conuertitur, eoque minus quò vetustius id vitium est, & quo magis in corpore senili est.

838. Vniuersalis ablatio, vel diminutio subita motus voluntarii, frigiditatem, & humiditatem cerebri significat.

839. In paralyſi non licet vti localibus, nisi post frequentem euacuationem, & digestionem. Nam si in principio statim fricabis locum paralyticum cum pannis calidis, tūc materia irritatur, & magis ad locum affectum attrahitur, vnde augetur malum. Ideoque in fine tantum morbi localibus vtendum est.

840. Membro paralytico nequaquam fortia calorifica adhibeantur, ne calor debilis à vehementer calidis resoluitur. Ideoque localibus resoluentibus, styptica non excessiue calida, commisceantur, quò calor membri naturalis conseruetur, ne euaporet, transpiretque.

841. In paralyſi principio, semper à leuioribus incipiendum est, & ad fortiora

ra procedendum. Sed si periculum ad-
esset apoplexiæ, tum statim à principio
fortioribus vtendum est medicamen-
tis. Extremis enim morbis, extrema ex-
quisitè remedia necessaria sunt.

In paralyfi, facta per terminatio- 841.
nem colicæ in paralyfin, tum nequa-
quàm vehementer caloricis topicis v-
tere. Hæc enim malum augent: Nam
sic materia subtilis & fluxilis auertitur
ad locum paralyticatum. Ideoque
medicamentis tantum, ex repellenti-
bus & confortantibus conflatis con-
structisque vtendum est.

In paralyfi nonnunquàm pars ægra 843.
est frigidissima, propter oppilationem,
quòd spiritus vitalis eò pertingere non
possit, sed pars sana est calidissima, ob
maximam spirituum copiam eò pertin-
gentem. Nam tunc & ea spiritus quan-
titas, qui ad ægram partem peruenire
debebat, ad sanam quoque delegatur.

Mel rosaceum est bonum digesti- 844.
uum in paralyfi, sed non in spasmò,
quia

quia in hoc materia est crassior, quàm
in paralyfi,

845. Nonnunquàm ex usu balnei aërei,
aut inunctione cum vehementer cali-
dis circa caput, sic si statim à principio
fortia digestiua & diuretica, materia
nondum imminuta, offeruntur, accidit
vel strágulatio, vel oris vlcera, vel asth-
ma, ob materiam in capite fusam & li-
quatam. Ob eandem causam accidit
nonnunquàm tortura oris, aut spa-
smus, aut paralyfis, materia liquata ad
neruos defluxa.

846. In paralyfi, quando membro paraly-
tico emplastra fortiora & calidiora
adhibes, tum sæpiùs emplastrum amo-
ue, & contemplare locum, ne ab im-
modica emplastri caliditate lædatur, &
exulceretur, quando quidem membrũ
sensu priuatum est. Ideò sæpiùs obser-
uetur dispositio impressionis emplastri.
Quare locus cum leui digitorum com-
pressione contrectetur, si rubedo loci
inde euanescit, & locus albefit, tũ cer-
tum est, emplastrum nō nocere, & locũ
affe-

affectum nihil lædere. Si verò ex digi-
torum compressione, & contrectatio-
ne leui, rubedo non cedit, sed fixa ma-
net, & locus caleat, tùm tempus est, vt
emplastrum deponatur, ne locus exul-
ceretur.

In paralyfi inungatur neruorum ori- 847.
go, & spina dorsi, competentibus oleis.

Diureticis & sudorem prouocanti- 848.
bus nequaquam vtimur in paralyfi, nisi
corpore probè ac sufficienter euacua-
to, quia periculum est, ne partes neruo-
sæ debilitatæ, superfluitates per diure-
tica attenuatas recipiant, præsertim
cum materiæ iam à natura eò delegen-
tur, declinentque.

In tortura oris, non competunt gar- 849.
garismi, & sternutatoria, nisi postquam
corpus probè euacuatum fuerit.

In linguæ paralyfi stultè faciunt, qui 850.
sub lingua vehementer calida ponunt.
Sic enim plus materiæ attrahitur, vnde
malum augetur, ideò styptica quædam
addantur, vt galanga, nux moschata,
&c.

In

851. In paralyſi linguæ non debemus feſtinare ad apophlegmaſmos. donec corpus probè ſit purgatum. Sic enim augetur malum.
852. Quando in paralyſi immodicè ſiccantia localia adhibentur, ſæpe ſuccedit ſpaſmus.
853. In paralyſi ſi ſanguis non redundat, tùm periculofum eſt venam ſecare, quia ſic cerebrum & nucha inſrigidantur, & virtus debilitatur.
854. Phlebotomia nunquàm iuuat in paralyſi, niſi fuerit à percuffione.
855. In paralyſi à cauſa ſanguinea, vel ſanguini mixta, fiat phlebotomia conſentientibus aliis, & non multum ſanguinis detrahatur. Sic enim non eſt timor de caloris natiui imminutione, aut frigiditatis intentione.
856. Spafmo aut tetano febris ſi acceſſerit, morbum ſoluit.
857. In ſpafmo membrum curtatur, abbreviaturq; in paralyſi verò plōgatur.
858. Localia remedia, in ſpafmo repletionis, debent eſſe reſolutiua fortia, præmiſſis

missis tamen mollificatiuis, vel cum re-
solutiuis mixtis. Humor enim spasmi
crassior, per debilia resolutiua non re-
soluitur, sed crassior redditur, propter
partium subtilium resolutionem.

In spasmo, vt in paralyfi, semper à le- 859.
uioribus est incipiendum, sed quando
spasmus est fortis, & mortis periculum
præ foribus est, vt in tetano, mox for-
tiora exhibenda sunt remedia.

In tetano sine vlcere, iuvene eufar- 860.
co, æstate media frigida larga profusio
calorem reuocat. Calor verò soluit.

Conuulsioni febrem accedere sa 861.
tius est, quàm feбри conuulsionem.

Conuulsio ab elleboro lethalis. 862.

Conuulsio à vulnere pernitiōsa. 863.

Conuulsio à repletionē fit, vel va- 864.
cuatione, ita verò & singultus.

In catalepsi, palpebræ manent aper- 865.
tæ. In sopore verò clauduntur perpe-
ruò.

In subeth æger interrogatus non re- 866.
sponder. In lethargo verò responder.

In

867. In febre pulsus fortis, & similis pulsibus sanorum colorque faciei, non multum à colore sani hominis differt. In syncope verò pulsus debilis est, & deficiens, & color faciei, sicut hominis mortui.

868. Humidum & calidum corpus, fluxionum vitii obnoxium sæpè redditur.

869. Fuentium humorum retractio, & eorum, qui iam corpus obsederunt, deriuatio, medela est fluxionis. Etenim motum ad contrarium semper trahere, expedit.

870. Materiam prohibere fluentem, & iam fluxam euacuare, membrum à quo fuit, in frigidando confortare, & quod iam collectum est, calefactiuis resolvendo purgare, permittentibus virtute, tempore, & aëre, maximum dant in curandis fluxionibus auxilium.

871. Naturalis humorum fluxus, aut per viam crisis factus, vndeunque fuerit, dummodò non superfluous, haudquam restringendus est.

872. Frequens destillatio in corpore re-

auit,

nui, longoque, tabem timendam esse
testatur.

Post nimias destillationes, tabes. 873.

Luna quò magis remouetur à Sole, 874.
eò magis fluxiones & humores causat
in corporibus.

Quorum caput humidum est, & 875.
rheumatismis abundans, in acutis voci-
bus festinanter mutescunt.

Destillationes, & grauedines, co- 876.
ctionem in valdè senibus nō admittūt.

Destillationes in ventrem superio- 877.
rem, ad suppurationem perueniunt in-
tra dies viginti.

In morbis ex catarrho seu fluxione 878.
ortis, in principio materia lenitiuo est
imminuenda, postea verò materia in-
fluens, ad contrariam partem est re-
uellenda, vt fricatione moderata, deli-
gatura, venæ sectione, clystere, fomen-
to, cucurbitulis, vomitu, errhinis, nasa-
liis, vesicatoriis, cauteriis, & latere ca-
lente pedibus subiecto.

In principio catarrhi competunt 879.
gargarismata styptica, inspissantia &
com-

comprimentia. Detestantur verò gar-
garismata resoluentia & attrahentia ab
initio, in processu verò competunt.

880. In fluxu cerebri seu catarrhali,
detestatur vsus masticatoriorū & gar-
garismatum, ne sic materia ad stoma-
chum & intestina trahatur, auertatur-
que, sed errhinorum optimè con-
fert.

881. Præsente rheumate fomentationes
lotionesque capitis & pedum, penitus
dimittendæ sunt, maximè ante mate-
riæ antecedentis euacuationē, sic & pe-
ctinatio capitis in principio detestatur
sic & caput multum mouere improba-
tur.

882. In catarrho, vbi materia est frigida
detestatur venæsectio, sic & in materia
calida si materia nō existit intra venas.

883. In catarrho tantum in tribus casibus
phlebotomia admittitur. Primò, quan-
do plethora adest: secundò, quando ca-
tarrhus procumbit, vel ad oculos, vel
fauces, vnde angina, vel pulmones, vnde
peripneumonia, vel ad pleuram
vnde

Unde pleuritis: tertio si febris adest in-
tensa, & præcipuè continua. Aliàs ubi
vena tunditur, periculum est, ne hu-
mores intra venas attrahantur, & suc-
cedat febris aut pleuritis.

Vbi febris suo calore fundit & li- 884.
quat materiam in capite, vnde tussis,
hic phlebotomia conceditur, vt æstus
mitigetur.

In principio catarrhi, poma ambraë 885.
non sunt odoranda, quia sua caliditate
intemperiem cerebri augent, vnde ma-
teria tenuior, & fluxibilior fit, sed in de-
clinatione ad reliquias resoluendas,
competunt.

Stultè faciunt, qui statim in princi- 886.
pio catarrhum, antequàm materia mi-
norata & euacuata sit, sistere & cohibe-
re conantur, sic enim materia compin-
ditur. Quare materia coaceruata &
multiplicata, postea cum magno impe-
tu prorumpit, & fit catarrhus, & fluxus
copiosior priore.

Quando catarrhus per nares effluit, 887.
non sistatur.

Q

Mate-

888. Materiam per venas & arterias ascēdere ad caput, constat ex vehemēti pulsatione, ac tensione venarum. Leuamen autem succedit, si pulsum venarum manu, lamina plumbea, aut styptico emplastro inhibueris.

889. Quando catarrhus adest subtilis, qui refrigerantia & inspissantia requirit, materia verò in pectore crassa existens, requirat attenuantia dissecantia, tūc dispositioni magis infestæ succurras, nempe, catarrho, postea & materiæ fluxæ, aut facies medicamentum, quod vtrique dispositioni competat, aut sic componas, vt syrupi respiciant catarrhum, aquæ verò materiam in pectore contentam.

890. In catarrho extrinsecus membrum recipiens, in principio fluxionis confortetur repellentibus. Hac verò in circuitu membri recipientis administretur, supra verò membrum ipsum recipiens ponantur anodyna, vt sic dolor mitigetur, ne plus materiæ attrahatur.

891. Dūm vteris repellentibus, materia

reue

reuellatur, & euacuetur, ne materia re-
pulsâ ad membrum nobile, regurgitet.
Cauere item, ne membrum repellenti-
bus immodicè refrigeres, ne corrup-
tatur, & denigretur locus calore nati-
uo extincto.

In catarrho in tribus casibus utimur 892.
gargarismis: primò, in catarrho calido
subtili, utimur gargarismis refrigeran-
tibus, inspissantibus ac stypticis, ut sic
catarrhus subtilis inspissetur, & eius a-
cumen hebetetur, & catarrhus quodam-
modo sistatur. His gargarismatibus et-
iam à principio uti licet. Secundò, ca-
terificis, quæ materiam catarrhalem à
cerebro detrahant, horum usus in prin-
cipio. Tertiò etiam abstergentibus, ut
sic materia ad fauces defluxa absterga-
tur.

A somno surgentes, ubi grauitatem, 893.
in stomacho, aut dolorem sentiunt, si-
gnum est, catarrhum tempore somni
ad stomachum defluxisse.

Actu frigida oculis, expurgato ven- 894.
tre, siue incisa vena, vel sæpius utroque
Q 2 facto,

328 *Aphorismorum Medicin.*

facto & non aliter, admouenda.

895. Aëris luminositas viuificos spiritus dissoluendo, visum multum debilitat. Ipsius verò obscuritas, illos congregando roborat.
896. Oculos, prout decet, curare impossibile est, nisi ipsi capiti cura prius inducatur, nec caput potest curari, nisi ipsum corpus totum præcuretur.
897. Viridis color visui est delectabilis, albus autem & splendidus, nocius est.
898. Fortissimos oculorum dolores sedant humeralium venarum facta apertio directo.
899. Chronicè rheumatizantes oculi, leuuantur cucurbitula admota thoraci, auertuntur scapulis facta scarificatione.
900. Nihil coitu oculis nocentius.
901. Crapula nocet oculis, magis qui cibo statim dormiunt.
902. Sanguinis frequens emissio, oculorum claritati obest.
903. Qui affectibus oculorum laborant, caueant à fortibus vomitoriis, & à cathartici purgiiis, seu errhinis.

In oculorū passionibus, in fine pluri- 904.
mum competit balneum aquæ dulcis,
quia hoc subtiliat humorem in oculo
existentem, aperit poros, & efficit, ut
materia per cœcam transpirationem e-
uaporet.

In cataracta, phlebotomia non ad- 905.
mittitur, nisi plenitudinis & plethoræ
signa affuerint, & vrina rubea, & ocu-
lorum venulæ rubæ fuerint, ac tumē-
tes, tunc moderata medianæ phlebo-
tomia conceditur. Sed copiosa phlebo-
tomia hoc in casu semper improbatur.
Cerebrum enim indè refrigeratur, &
aquositas in eo multiplicatur.

Qui ex oculis laborant, illis nequa- 906.
quàm prouocantia vomitum offeran-
tur, ne materia irritata copiosius ad o-
culos defluat.

Ophthalmia laborantem alui pro- 907.
fluuiio corripì, bonum.

Oculorum dolores, meripotio, aut 908.
balneum, aut fomentum, aut phlebo-
tomia, aut purgatio soluit.

Dolores oculorum post meraci vini 909.

Q₃

potum,

330 *Aphorismorum Medicin.*

potum, & aquæ calentis balneum, venæ sectione curato.

910. Quibuscunque in morbis oculi ex causa illacrymant, bonum: Quibuscunque sine causa, malum.

911. In ophthalmia ægro, neque debet adhiberi balneum, nec cataplasma, fomentum, collyria, nisi prius corpus sit euacuatum, aut phlebotomia, aut pharmaco deiectionario.

912. In oculorum affectibus, post ventris purgationem, multum refert in occipitio cucurbitulam affigere, & in fronte apocristica adhibere.

913. Medicamenta, quæ in oculos insperguntur, debent subtilissimè esse pulverisata, & omni asperitate carere.

914. Errhina, & sternutatoria detestantur in paratis ad ophthalmiam, oculorum lacrymas, & cataractam.

915. Fortia repellentia, in principio morborum oculorum, ante corporis inanitionem nequaquam oculis indantur. Sic enim oculorum pori adstringuntur, & obstruuntur, unde materia sic detinetur,

netur, quæ vehementissimas phlegmones, doloresque difficiles inuehit, vt interdum cornea tunica, ob nimiam ab humoribus extensionem, disrumpatur, præcipuè vbi rubor, plurimaque materia oculos occupauerit.

In oculorum passionibus, collyriis 916.
ex fellibus ad postremum, quando alijs nihil efficimus, vtimur. Quando autem hæc adhibemus, æger in ore intempestim gestet aquam frigidam, & assumat earum theriacæ. Sic ante vsum horum collyriorum ex fellibus fronti repercussus imponantur, & fomentetur oculus priùs decocto humectante.

Lac, vbi intra oculum immittitur, 917.
vltra horam in oculo non dimittatur, quia ibi corrumpitur, & sua acerositate mordet, & lædit oculum.

In oculorum affectibus, pili palpebrarum præscindantur, ne sua longitudine pungant, & lædant oculum.

Antequam aliquid oculis indas, priùs 919.
illi mundificentur, & abstergantur cum coto in aqua sacchari infuso, &

Q 4

ex-

extremitati styli alligato.

910. Errhina & nasalia, vbi æger ex oculis laborat, non probatur. Sic enim materia ad oculos auertitur.

911. In ophthalmia, si magna adest plethora, tùm principio venæ tali secantur, sic vbi & mensium adest retentio, deindè aperiatur mediana, tertio cephalica, si enim præsentè plenitudine tunderetur cephalica, tùm humores è corpore toto ad caput auerterètur, vnde auergeretur malum.

912. Opiata, sunt oculorum maxima perniciës.

913. In oculorum affectibus, nequaquam fortia repellentia medicamèta in principio administrentur, quia tunicas reddunt crassas, & materiæ resolutionem, & euaporationè prohibent, doloremq; augment. Clausis enim poris materia calida, & mordax, corrodit tunicas, vnde dolor vehemens. Si verò materia non fuerit mordax, sed multa, tùm distendendo augebit dolorem. Ideò si effopiatum cautè administretur, & potius
supra

supra oculum ponatur.

Medicinæ debent actu tepidæ in 924.
ophthalmia in oculos immitti. In sani-
tate verò actu frigidæ administrentur.

Actu calida auribus, expurgatio ven- 925.
tre, siue incisa vena, vel sæpiùs utroque
facto, & non aliter ad mouenda.

Nihil plùs aduersus surditatem, quã 926.
biliosa alius potest.

Surdi quandoque fiunt, vbi biliosus 927.
fluxus ventris substiterit.

Surditas magna & antiqua, medica- 928.
minis auxilia non admittit.

Lac, quando intra aurem immitti- 929.
tur, non diu illic dimittendum est, quia
facilè corrumpitur.

Narcotica non facilè auribus indã- 930.
tur, nisi summa hoc exigat necessitas.

In maturatiuis aurium semper ad- 931.
misceantur, quibus exiccandi vis inest,
vt naturalis earum complexio conser-
uetur, quæ sicca est.

Quando parotides, seu inflamma- 932.
tiones iuxta aures eueniunt, tùm ne-
quaquam repellentia medicamenta in

Qs

prin-

334 *Aphorismorum Medicin.*

principio adhibeantur, sed potius attractiua administrentur. Repulsa enim materia ad interiora, accidit inde aut apoplexia, aut paralyfis, aut spasmus, aut angina, aut phthisis.

933. In aurium apostematibus, nunquam meris, ac nudis vtendum est repellentibus, ne materia repulsa ad interiora, accidat phrenitis, aut lethargus, aut phthisis.

934. Quibus olfactus trienio abfuit, semper deficiet.

935. Sanguine ex dextra nare fluente, brachii dextri cephalicæ apertio, aut cucurbitula dextro apposita hypochondrio, & contrà, sistit fluxum sanguinis.

936. Dextræ naris sanguinis fluxum sedat cucurbitula, dextro apposita hypochondrio, sinistræque sinistro. Sub mammillis mensium fluores mulierum cōpescit. Femori autem ac cruribus, ipsos menses euocat.

937. In curatione polypi & ozænarum, ac reliquorum narium vlcerum, medicamen-

camenta assiduè sunt administranda, neque vnquàm pars affecta absque medicamento dimittenda. Facilè enim ob influentem humorem eluuntur.

In profluuiò sanguinis narium, caue 938.
ne caput refrigerantibus medicinis immodicè refrigeretur, ne sanguis in reti mirabili concreascit, & succedat apoplexia, vel aliud graue malum. Sic quoque non admodum est tutum, assiduè collum circumdare panno lineo in aqua frigida madefacto, ne sic in venis apoplecticis ob sanguinem coagulatum accidat apoplexia.

Nonnunquàm in profluuiò sanguinis narium, vnà cum stercoribus sanguinis, aliquid excernitur, ob sanguinem qui ex capite ad stomachum defluxit. 939.

In sanguinis narium profluuiò, cauendum ne quid sanguinis intra corpus illabatur, quia inde sæuissima symptomata subsequuntur, videlicet ventriculi inflatio, pulsus diminutus, & syncope. Quare caput prouum seruetur. 940.

Sternutamentum cietur ex capite, 941.

Q 6

cere-

336 *Aphorismorum Medicin.*

cerebro excalfacto, aut perhumectato spacio in capite inani. Aër enim intus contentus, foras erumpit. Strepit autem, quia per angustum ipsi est exitus.

942. Quando aliquis usus est sternutatorio, & inde ardorem aut pruritum in naribus sentiat, tùm inungantur nares, aut oleo rosaceo, seu violaceo, aut attrahat per nares lac muliebre.

943. Sanguis spumofus ab ore egrediens, à pulmone eiicitur. Vomitu autem reiectus, à stomacho egreditur.

944. Sicut inflammatoria, & subtiliatiua cogunt effluere sanguinem: sic infrigidantia, & ingrossantia prohibent emanare.

945. Mulier sanguinem euomens, erumpentibus menstruis liberatur.

946. Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari.

947. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit, ii vel capitis doloribus conflictentur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graves habeant, vel aliquo morbo etiam debi-

debilitentur.

Si ora venarum, sanguinem solita 948.
fundere, subito suppressa sunt, aut aqua
inter cutem, aut tabes sequitur.

Quibus sæpè ex naribus fluit sanguis, 949.
his aut lien tumet, aut capitis dolores
sunt, quos sequetur, ut quædam ante o-
culos tanquam imagines obuersen-
tur.

Si sanguis profluxit, deinde secuta 950.
est dementia, cum distensione neruo-
rum, periculum mortis est.

Si angina subito finita est, in pulmo- 951.
nem id malum transit, idque sæpè intra
septimum diem occidit. Quod nisi in-
cidat, sequitur, ut aliqua parte suppu-
ret.

Angina correpto, si tumor appareat in 952.
collo bonum. Foras enim morbus existit.

Ab angina detento, tumor & rubor 953.
in pectore superueniens, bonum. Foras
enim morbus vergit.

In principio anginae, gargarismata 954.
repellentia solummodò teneantur in

Q 7 ore.

Ore, non gargarisentur, ne plus materiæ ad locum affectum auertatur. Insuper & parumper tepida, vt sic melius penetrent, administrari debent.

955. In difficili deglutitione, vt in angina, multum refert, cucurbitulam amplam absque scarificatione affigere circa secundam vertebam. Fauces enim hoc reddit ampliores.

956. In angina, nequaquam repellentia medicamenta extrinsecus in collo sunt administranda, ne materia ad interiora, siue ad pulmones repellatur.

957. In angina, v uula, alcola, & gingivarum vlceribus, vbi locus incipit liuescere & corrumpi, tum repetatur phlebotomia, & alui purgatio, postea scarificetur locus profundis vulnusculis, si corruptio profunda est, tandem gargariset acetum calidum, aut oxymel simplex, deinde locus denigratus impleatur vnguento Ægyptiaco. Si verò putrefactio & corruptio, sic non potest inhiberi, tum cauterisabis locum cauterio actuali,

actuali, vel aqua forti. Ardor autem mitigetur cum lacte in ore detento, aut cum aqua plantaginis, aut solatri.

Vbi fauces dolent, aut pustularum 958.
eruptiones exoriuntur in corpore, excrementa spectare oportet. Nam si biliosa fuerint, vnà corpus egrotat: si verò sanorum excrementis similia, tutò corpus alere poteris.

Strangulati aut suffocati, non tamen 959.
mortui ad se non redeunt, quibus circa os collecta spuma apparuerit.

Balbi longo alui profluvio maximè 960.
corripiuntur.

Collutiones oris, quæ in dentium 961.
dolore exhibentur, debent actu esse temperatæ. Frigidæ enim intense nocent dentibus, sicut & vehementer calida. Nam à frigidis calor naturalis dentium, qui paucus est, extinguitur, à calidis verò resoluitur.

In vuæ procidentia periculosum est, 962.
statim à principio sub vua ponere pulueres calidos attractiuos, nulla materiæ facta euacuatione.

In

963. In vuæ procidentia, gargarismata non probantur. Quia motus ille agitatiuus materiam concitat, & ad vuam auertit.

964. In dentium dolore masticatoriorum vsus detestatur.

965. Extrinsecus in dentium dolore, non est tutam repellentia medicamenta administrare, ne materia ad fauces repellatur, & efficiat anginam, sed extrinsecus tantum anodyna & resoluentia applicentur.

966. Et si acetum dentibus noceat, nonnunquam tamen penetrationis gratia, reliquis medicamentis additur, propter ossium duritiem.

967. Omnia ossa humani corporis confirmantur, curantur, & ad locum suum reuocantur, exceptis dentibus, qui extracti, nunquam restituuntur.

968. Oris resolutio alio cita sanatur.

969. Ulcera pulmonis, cæteris vlceribus sunt curatu tardiora.

De

XII.

De morbis medii ventris, nempe de thoracis & pulmonum affectibus.

Pulmonum incommoda muliebri 970.
lacte, pueri impubis vrina, atticoque
melle, mensuris æqualibus mixtis, sanantur.

Tabes subit, si in lateris dolore orta 971.
suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit.

In pulmonum morbo pus expuisse, 972.
deindè ex toto spuerè defuisse, mortificum est.

Autumnus, tabidis nocuus. 973.

Tabes iis maximè ætatibus fit, quæ 974.
à decimo octauo ad tricesimū quintū.

Qui tabe vexantur, si sputum quod 975.
extussunt, carbonibus iniectum olet
grauiter, & capilli defluunt, pernitiosum signum.

Quibus per tabem capilli defluunt, 976.
iis fluxione alui superueniente, in propinquo

pinquo mors.

277. Si tabe detento profluuium alai superueniat perniciosum.

278. Pillulæ ubi exhibendæ sunt in phthisicis ad purgandum corpus, tum formetur cum syrupo violarum, aut iuiubino, aut nenupharino, ne pillulæ febres hæcticas augeant.

279. Phthisici quando multam sentiunt in ventre ventositatem, tum vtantur aniso confecto, vnam habente cooperturam sacchari.

280. Infantes à phisi faciliùs liberantur.

281. In morbis pectoralibus, vt in tussi ex catarrho, si nihil sputi reiiciat æger, tum considera eius causam, num materia nimis sit subtilis, aut crassa. Si nimis subtilis, inspissantia offerenda sunt, vt Diatragacanthum frigidum: si verò nimis crassa, tum attenuantia, & dissiccantia offeras, & semper à leuioribus incipias, & ad fortiora procedas. Materiam autem nimis esse subtilem aut crassam, ex sputi reiecti substantia

stantia deprehendes. Si enim sputum per totum est crassum, tùm nimis crasse est substantiæ, si verò in medio tantum crassum, & circumferentia tenue, tùm tenuis est substantiæ.

In pectoralibus vitiis solutiua non 982.
exhibentur ad euacuandam materiam coniunctam in pulmone existentem, sed tantùm antecedentem.

Vnguenta quæ pectori inunguntur, 983.
epida administrentur. Frigiditas enim nocet pectori, & tussim auget.

In pectoris vitiis, vbi materia copio- 984.
sa est, detestantur pharmaca purgatoria fortia, ne syncope accidat, ob materiam viscam. Si vomitus fortis improbatur.

In vitiis pectoralibus ac catarrhali- 985.
bus, non tutum est administrare pectori epithemata, & sacculos frigidos, ne materia in pectore contenta, à resolutione & excretionem prohibeatur.

Quando cum pectoris affectibus v- 986.
na epar laborat, tùm pectoralibus medicinis vna, quæ epar respiciant, commisceto.

Quibus

987. Quibus circa pectus materia existit copiosa, detestatur in principio, antequàm materia est imminuta, vomitus vehemens, & sternutatio fortis, ne inde accidat syncope, aut suffocatio ob materiam motam. Materia autem minorata, hæc probè competunt.
988. Quibus circa pectus materia existit copiosa, detestatur in principio vehemens ac fortis purgatoria medicina, ne materia fusa liquataque fiat syncope.
989. In morbis pectoralibus, quando nuda calida medicamenta & resolutiva offeruntur, nullis mollificantibus & lenientibus adiectis, tùm materia sit crassior, & viscosior, subtilibus scilicet partibus euaporatis, resolutisque, ut minimè tussi rejici possit.
990. Sic in morbis pectoralibus intense frigida detestantur. Reddunt enim materiam crassam crassiorem, & quasi cōgelatam, ut minimè expui possit.
991. Quando pectori administras unguenta & emplastra, caue os stomachi
attin-

attingas. Sic enim appetitus prosternitur, & stomachi robur exoluitur.

Hordeum debet esse excorticatum 992.
pro aqua hordei, in morbis pectoralibus.

Cum ad vigorem peruenit peripneumonia, nisi expurgetur, in nullo alio auxilium sperandum est. 993.

In peripneumonia, si difficulter spirat æger, fuerintque urinae tenues & acres, atque sudores in capite, & ceruice coniunguntur, malum. Contra sputa matura urinae crassae, bonum. 994.

A pleuritide peripneumonia, malum. 995.

In laterum doloribus, si materia intra quatuordecim diebus non excreatur, vomica oboritur, quæ rursus si quadraginta diebus non purgatur, tabes subit. 996.

Pregnantibus, senibusque laterum dolores plerumque lethales sunt. 997.

Qui ex pleuritide empyi fiunt, si àruptione empyematis intra dies quadraginta repurgentur, liberantur: alioqui transeunt in tabem. 998.

Pleu-

999. Pleuritide aut peripneumonia de-
tento diarrhæa interueniens, malum.
1000. Qui acidum ruçant, non admo-
dum pleuritici fiunt.
1001. In pleuritide, rupto abscessu, si pus
expellitur ad pectoris concauitatem,
tùm materia adiuuanda est lambitiuis,
vt sic euacuetur. Si verò pus ad vias
urinæ expellitur, tum diureticis eua-
cuetur, & si febris adest, hæc refrige-
rantibus aperitiuis temperetur. Quod
si sanies ad intestina vergit, tum eua-
cuetur clysteribus absterſiuis, & per os
dentur flores cassiæ, aqua mellis, &c.
Quando autem sanies est collecta inter
carnem & cutem ac tumor emergit,
tum perforetur, aut cauterio actuali a-
periat.
1002. In pleuritide, quando materia affluit
à capite, in principio reuellatur incisio-
ne cephalicæ affecti lateris, postea me-
dianæ, quando autem à matrice, vt in
retentis mensibus, venæ tali, postea
medianæ. Si verò à crure, ob consoli-
datum vlcus saphenæ, postea medianæ.

In

In pleuritide, quando totum corpus 1003.
valde repletum est sanguine, tùm sem-
per conducit in principio vniuersalem
repletionem sanguinis minuere sectio-
ne venæ communis, scilicet medianæ
in latere opposito & non in affecto.

In venenosa pleuritide quidam in 1004.
in principio utrasque saphenas aperiunt,
& postea medianam affecti lateris.

Medici rarò in principio pleuritidis 1005.
vocantur, ideò commodè mediana af-
fecti lateris secatur.

Cathartica fortia in pleuritide ne- 1006.
quaquam offerantur, sic enim fluxio
concitatur, moueturque, vt copiosius
ffluar, vnde apostema crescit, dolor in-
cenditur, febris, & corporis debilitas
augetur.

Doloribus lateris & pectoris, cæte- 1007.
arumque partium, an ægri multùm
differant, discendum est.

Solutiuorum stypticorum vsus in 1008.
pleuritide detestatur, vt Myrobalano-
um, Rhabarbari in substantia, &c.
hæ enim vestigium stypticitatis
relin-

348 *Aphorismorum Medicin.*

relinquendo, facilem sputi reiectionem impediunt.

1009. Digestiua in pleuritide, tempore hyemis, calida sunt offerenda, tempore verò æstatistepida, & bis per diem exhibeantur, manè scilicet in aurora, & vespere per duas horas ante cœnam.

1010. Pleuriticis, quæ è directo affectu lateris adhibetur sanguinis missio, clarissimam vtilitatem adfert. Quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obscurâ, aut certè post temporis interuallum.

1011. Pleuritici sputum excipiant petiis mundis, vt sic ex eo melius iudicari possit.

1012. Calefactoria in pleuritide infrigidari incipientia, citissimè sunt auferenda, ne sua actuali frigiditate materiam ingrossando, & poros claudendo, inferant nocumentum.

1013. Quando in pleuritide adhibitis auxiliis omnibus, dolor non mitigatur, neque intra quatuordecim dies mundificatur, sed febris & anhelitus difficultas, dolor & tussis augentur, tunc certum

certum habes indicium, apostema ad suppurationem tendere. Quare repente molienda est suppuratio maturatiuis medicinis, & postea mundificatiuis, & absterfuiis vtendum est.

Quando in pleuritide maturandum 1014.
est, nequaquam ipsa venæsectio repetatur. Quia euacuato sanguine, & spiritu, calor natiuus debilitatur, & materia congelatur, vnde prohibetur ipsa maturatio.

Si empiis cum vruntur, aut secantur 1015.
purum & album pus effluat, euadunt; si verò sub cruentum, feculentumque & fœtidum, pereunt.

In empyemate, quādo pus in pectore 1016.
est collectum, vt in fine pleuritidis, vel peripneumoniæ, ac in pectore tumor apparet, aut aliàs quædam mutatio qualitas, tūm aperiatur pectus vel cum cauterio actuali, aut potenciali, aut cum rasorio, secundum costarum longitudinem, inter quartam, & quintam costam mendosam, & paulatim scissures sic emittatur, extrahaturque, deinde

R inde

indè rursus claudatur vulnus, nec diu dimittatur apertum, ne ab aëre fiat alteratio, & caloris ac spirituum exhalatio.

1017. Instans suppuratio discutienda est, subsistens resoluenda, increscens utroque modo oppugnanda est.

1018. A sanguinis sputo puris expuitio, malum.

1019. Quando sputum sanguinis succedit syncope, signum est, sanguinem in pulmone seu pectore concretum esse.

1020. Quando ex usu sistentium sanguinem anhelitus fit difficilior, tùm offerantur, quæ pectus rursus amplient, e-largentque, & quando anhelitus rursus facilius fit, ad adstringentia & sanguinem sistentia redi.

1021. Quando aliqua in corpore rupta est vena, tùm aloes usus tibi suspectus esse debet.

1022. In confesso est spirationem à vita, & vitam à spiratione separari non posse adeò ut viuentem non spirare, & spirantem non viuere, sit impossibile.

Pul

Pulmone carentia, carent & spira- 1023.
mine, & in aqua non demerguntur.

Spiritus frequens, aut doloris, aut 1024.
inflammationis, in partibus septo trās-
uerso superioribus, indicium est. Ma-
gnus, & ex longis interuallis, delirium
declarat. Frigidus, ex naribus & ore
prodiens, lethalis admodum est.

Facilis spiratio in morbis acutis, qui- 1025.
bus febris copulatur, quæq; intra qua-
draginta dies finiri solent, magnum ha-
bet ad salutem momentum.

Asthmatici debent sæpè & parum 1026.
bibere, si enim multum bibunt, tum
augetur causa antecedens, id est, crassi
& crudi humores in corpore multipli-
cantur. Quod autem talis humor indi-
geat humectatione, indè constat, quia
ipse continetur in locis angustis, & in
loco multi caloris, & in membro con-
tinui motus, vndè quàm facilimè in-
durari humor potest.

In pulmonis vitiis, potest nonnun- 1027.
quàm anhelitus esse bonus, & pulsus
malus, quando scilicet vitium existit

R 2

in ve-

in venis, & arteriis pulmonis, & non in carne, vel canna eius.

1028. Dulcia tussientibus & moderatè calida conueniunt. Acuta autem, acetosa aut frigida actu, nusquàm debent exhiberi.

1029. Quando tussis est vehementissima, & continua, non permittens ægrum quiescere, tùm pillulæ stupefacientes offerendæ sunt, vt pillulæ de styrace.

1030. Quando tussis accidit in febribus, ob fumos acutos pulmonem stimulant, tùm offerantur refrigerantia & humectantia intra corpus, talia quoque in ore gestentur, vt aqua hordei, & syrupus violaceus. Eiusmodi etiam valêt, quando tussis adest ob catarrhum, ratione febris colliquantis, ortum.

1031. Qui vehementer tussiant, non nunquàm sanguinem mingunt.

1032. In tussi fugida, & materia crassa ac viscosa, nequaquàm intensè calida, & purè resolutiua exhibeas, quia materiam in pectore crassam crassiorè reddunt, partibus subtilibus resolutis, & exic-

exiccatis. Ideò cum fortibus vteris resolutivis, tum semper quæ & vim leniendi, & humectandi habeant, cum hisce commisceas, vt passulas, caricas, violas, hordeum, liquiritiam, saccharum candum, &c. Quare vbi opus est exhibere syrupum de hyssopo, vel de calamento, tum vnâ cū eis commisceas syrupum violaceum. Sic vbi cogeris exhibere ob materiã valdè crassam oxymel, tum vnâ admisceas syrupū de liquiritia, ne oxymel ob acetum lædat pectus.

In vehementissima tussi conducunt 1033.
opiata, vt philonium Romanum, pillula de cynoglossa, &c. Hæc autem non, nisi corpore probè purgato, offerantur.

In tussi & asthmate, omnes autores 1034.
venæsectionis nullam faciunt mentionem, sicut etiã in catarrho, qui in pectus defluit. Sed quando magna adest plenitudo seu plethora, & materia in venis est contenta, vel vbi mensium seu hæmorrhoidum adest suppressio, tum venæsectio imperanda est. Hic plæunque tussis quæ adest, sicca est.

R 3

In

354 *Aphorismorum Medicin.*

1035. In curatione tussis & asthmatis à materia frigida, crassa & viscosa, curandum est, ne medicamenta subtiliatiua & maturatiua sint nimis calida, resoluentia & acuta, ne sic materia subtilis exiccetur & euaporet, & materia crassior fiat. Et si vehementer calidis vtendum est, tùm horum caliditatem hebetes obrundasque, prætereà semper quedam lenitiua, & lubrica commiscenda sunt.
1036. Qui sæpè & vehementer sine causa manifesta animo linquntur, ii derepentè moriuntur.
1037. Vinum natura calidum, dandum est iis, qui vehementem omninò patiuntur syncopen.
1038. Humorom omnium superuacua exinanitio, cordis vires offendit.
1039. Odorata omnia cordi conueniunt.
1040. In omni cordis tremore competit venæsectio, virtute adhuc existēte fortit. In causa calida cum sanguinea repletionem non est dubium: in causa verò frigida etiam confert, quia cùm cor natu-

naturaliter abundet sanguine pro necessitate finis, ad generationem spirituum, dubium nõ est, ob assiduum cordis tremorem sanguinem in corde incipere ebullire tandem. Vndè venæseçtio hîc etiam competere videtur.

Sacculi cordiales refrigerantes, antequàm administrantur, priùs calefiant 1041.
vapore aquæ rosaceæ vel buglossæ, candenti lateri, inspersæ, & sic reperfacti adhibeantur.

Epithemata cordis, antequàm venter purgatus sit, nunquàm administrantur. 1042.

Epithemata cordialia, antequàm applicantur, expresso linteolo priùs gestentur parum per inter manus, vt sic tepescant, tandem administrentur, aut aquis priùs tepesfactis, cordi applicentur. Quidam antequàm ea administrant, priùs in duplici vase semel aut bis ebullire permittunt, & tandem administrent. 1043.

Vnguenta pro cordis confortatione, ieiuno stomacho per vnâ horam 1044.

R 4 ante

356 *Aphorismorum Medicin.*

ante cibum assumptum, inungantur.

1045. Epithemata cordialia efficaciora sunt sacculis. Citiùs enim ad cor eorum virtus penetrat.

1046. In cordis confortatione refrigerantibus, semper calidum quippiam aromaticum & odoratum, vt crocum, admisceto, vt calor nativus sic conseruetur, & refrigerantia ad cor citiùs penetrare, perferrique possint.

1047. Immodicè calida detestantur, ne spiritus resoluantur. Ideò calidis quædam refrigerantia admisceantur, vt spirituum substantia uniatur, & medicinarum vis conseruetur, donec ad cor perveniat.

1048. Cor confortantia etiam arteriis in carpo imponantur.

1049. Vbi spiritus aliquo in morbo immodicè fuerint resoluti, restaurentur cibo euchymo, vt vino, ovis, gallinis, grato odore, conuersatione cum iocosis & ridiculosis hominibus, musicis instrumentis, iucundis cantilenis, aëreque puro inspirato.

XIII. De

XIII.

De Morbis infimi ventris.

Frigida ciborum collectio, in ven- 1050.
triculo remanens, humores gignit a-
cerbos. Calida autem, fumositates ge-
nerat. Et sic morbus calidus fumosita-
tem gignit, & frigidus acetositatem.

Frigida cerebri complexio cum ca- 1051.
lida iecoris distemperatura, ventricu-
lum fluxionibus obnoxium reddit.

Singultus sternutamento finitur. 1052.

Longas deiectiones supprimit vo- 1053.
mitus.

Si senioribus supra modum purga- 1054.
tis singultus superuenerit, malum.

Frequens medicamentorum vsus, 1055.
stomacho officit.

Oleosa & pingua, stomacho inimi- 1056.
ca sunt.

Singultus infiniti ex cū capitis, le- 1057.
thales sunt.

Singultus ab inanitione, lethalis. 1058.

Stomacho affecto plerunque dolor 1059.
est, circa decimam spinæ vertebam.

R s

Quando

1060. Quando in stomachi inflatione, & abominatione, ob materiam pituitosam, intestinorum accidit murmur, signum est, materiam esse subtiliatam, dissolutamque, & ad exeundum paratam, ideò euacua.

1061. Vomitus spontaneus in morbi initio, leuitatem, & subtilitatem materiæ portendit.

1062. Quando stomachus longo tempore dolore quodam molestat, qui neque vomitu, neque aliqua alui purgatione sedatur, signum vehementis adhæsiōnis, aut imbibitionis humoris in stomacho.

1063. Quando vomitus, antequàm corpus purgatum est, intempestiuè sistitur, nonnunquam materia regurgitat, vel ad epas, vel lienem, vel caput. Id si accidat, secetur vel epatica, vel basilica sinistra, vel cephalica, & purgetur materia stypticis.

1064. Quando vomitus adest, detestatur croci vsus.

1065. Quando ad stomachum aliqua mate-

materia ab aliis membris est defluxa, tùm principio offer absterfium, deinde materia euacuetur à membro mandante stypticis, tertio auertatur materia clysteribus, fomento pedum, deligatura, cucurbitulis, sudoris prouocatione, &c. Postea confortetur & alteretur membri mittentis intemperies, ne noua regeneretur materia. Postremo, membrum recipiens scilicet stomachus, confortetur stypticis, ne recipiat, admittatque materiam influentem. Hæc enim materiam influentem inspissant, & ora venarum adstringunt. Talia autem ieiuno stomacho, & non statim à cibo offerantur.

Quæ pro confortatione stomachi 1066.
manè offeruntur, illa nequaquam in forma potabili exhibeantur, sic enim statim è stomacho delabuntur, sed potius dentur in forma pulueris, aut Electuarii, aut cõfectionis, sic enim diutius in stomacho persistunt, perseverantque.

Fœtida omnia stomacho aduersantur, & nauſcam ac vomitum mouent. 1067.

R 6

Econ-

360 *Aphorismorum Medicin.*

Econtrà verò omnia odorifera, stomachum confortant.

1068. Sacculi, qui pro confortatione stomachi adhibentur, debent prius suffumigari cum vino aromatico lateri candenti asperso, vel sacculus prius in vinum ponatur, & vna vel tribus ebullitionibus factis exprimatur, & stomacho imponatur.

1069. Ad stomachi intemperiem siccam emendandam, non tam antè, quàm posteriùs circa spinam dorsi humectantia medicamenta, applicantur.

1070. Hiera simplex Galeni, in stomachi vlceribus optimè valet. Habet enim vim abstergendi, carnem producendi, & consolidandi.

1071. Ne vsus frigidorum per os assumptorum lædat stomachum, refert ipsum extrinsecùs oleis caloricis inungere.

1072. Medicamenta topica, quibus ad sistendum vomitum vrimur, vtiliter super os stomachi antè & retrò administrantur, sic & in fontanella gulæ, & pulsibus brachiorum.

Olea

Olea & linimenta stomachum con- 1073.
fortantia, cum lana succida administrē-
tur.

In intemperie calida stomachi, re- 1074.
frigerantibus multis, calorifica quæ-
dam admiscenda sunt, ne eius paucus
calor omnino extinguatur. Est enim
stomachus membrum nervosum, &
exangue.

In stomachi passionibus, cerata præ- 1075.
feruntur vnguentis. His autem inter-
dum penetrationis gratia parum aceti
addi solet.

In stomachi affectibus, nunquam so- 1076.
lis relaxantibus, & discutientibus est v-
tendum: sed hîc semper adstringentia,
quæ stomachi robur conferunt, admi-
scenda sunt. Idem & de epatis medica-
mentis intelligendum est.

Quæ stomacho conferunt, illa etiã 1077.
intestinis commoda sunt.

Antequam inungatur stomachus, 1078.
præmittatur fomentum, vt oleorum &
vnguentorum vis penetrare possit.

Piper, zinziber, baccas iuniperi, 1079.
R 7 masti-

mastichen, & alia quædam integra deuoramus, cum ventriculum calfacere citra epatis calidi noxam volumus. Si autem epar & longinquas partes calfacere studium est, non modò ea leuissimè trita sumimus, sed etiam liquore mista tenuissimo.

1080. Quando in vomitu cholericò, stomacho extrinsecus medicamenta refrigerantia administrantur, tùm caue ne Diaphragma inde refrigeretur, aut epar, & sic horum actiones vitientur. Sæpè enim indè accidit anhelitus difficultas, & intemperies frigida in epate, id vbi contingit, succurratur oleis caloricis, vt oleo de absynthio, de spica, mastichine, vel ex his fiant vnguenta, aut emplastra.

1081. In stomachi apostematibus, fortia cathartica in principio non sunt exhibenda, ne materia irritetur, conciteturque, & plus materiæ attrahatur, vnde apostema augeatur. Sic pura lenitiua etiam nō sunt offerenda, vt cassia, hæc enim mollificando & relaxando, rarefaciendo.

faciendoque stomachum ad superfluitates recipiendas, aptiorem reddunt. Si verò cassia cum aquis stypticis offertur, vt cum aqua endiuix & parum absinthii, tūm confert.

In ventriculi inflatione, cū ventū 1082.
& flatus discutere intendimus, non vtendum est vnguentis, quia cera poros cutis obstruit, & oppilat, sed potius vtendum fomentis.

Excessiuè calida non tam in stoma- 1083.
chi, quàm aliorum membrorum imbecillitate nunquàm adhibeantur, ne tepidus calor sic resoluatur, & euaporet.

Vnguenta & emplastra stomacho 1084.
adhibita calorifica, vbi ipsum immodicè calefecerunt, coctio corrumpitur, ructus indorosi, ac fœtidi adsunt.

Quæ ad os stomachi superius con- 1085.
fortandum administrantur, illa non tã anteriùs, quàm posterius circa decimã tertiam vertebrã spinæ admoueantur.

Cū lauandum est, stomachus de- 1086.
bilis priùs vel sacculo, vel inunctione

con-

confortetur, ne eius robur relaxetur. Calida enim & humida os stomachi rarefaciendo relaxant, vnde vomitus.

1087. Cerata stomachica, tempore coctionis, deponantur, ne sua adstrictione cibum ad fundum descendere inhibeant.

1088. Accidit nonnunquam à balneo nausea, ob materiam ad os stomachi attractam, quæ leui vomitu rursus euacuanda est.

1089. Omnia medicamenta & vnguenta, quibus stomachus extrinsecus in causa frigida debet inungi, abundè calida sunt, quippe quæ tepida sunt, omnia ventriculi firmitudinem dissolunt. Sunt autem eiusmodi vnguenta in duplici vase calefacienda.

1090. Quando in vomitu & sputo sanguinis, adstringentia & inspissantia sanguinem adhibemus, semper quædam calida aperitiua admiscenda sunt, vt sic adstringentium vis ad locum affectum deducatur. Sic vnguentis & emplastris adstrin-

adstringentibus, & conglutinantibus,
quædam aperitiua adduntur, vt ad-
stringētium vis ad interiora deferatur.

In vomitibus à principio, antequàm 1091
materia est euacuata, nequaquàm fri-
gida & styptica offerenda sunt. Hæc
enim faciunt ad maiorem humoris im-
mersionem, compellendo ipsum in al-
trum, seu profundum, claudendo & ad-
stringendo poros stomachi, vnde nau-
sea & difficultas vomitus augetur. Ex-
trinsecus verò adhibita medicamenta
styptica, non adeò nocere possunt, ex-
primunt enim & repellunt humorem
immersum in stomachi concavitate.
Ideò hæc non adeò nocent, vt illa quæ
per os assumuntur. Sed quando humor
non est immersus in stomacho, tū certè
non nocet styptica offerre per os; quia
adstringendo os superius, stomachi hu-
morem deprimendo, per inferiora de-
pellunt, præterea etiam vniendo stoma-
chum confortant.

Si omentum exciderit, necessariò 1092.
computrescit.

Vehe-

366 *Aphorismorum Medicinæ.*

1093. Vehemens clysteris infusio vomitum sedat.
1094. Qui siti premuntur, parcius edere, minus laborare, vinumque dilutum & perfrigidum bibere debent.
1095. Sitim sedat somnus.
1096. Quibus epas calidum est, & stomachus frigidus, necessarium est, venas eorum crudis humoribus, & phlegmaticis abundare, præcipuè si copiosè reficiantur. Nam cruditas chyli peractionem epatis corrigi nequit.
1097. Post arquatam morbum febrem oriri, periculosum est.
1098. Auriginosi, non admodum ventosi.
1099. Regio morbo laborantibus iecur durum fieri, malum.
1100. In epatis oppilatione, ubi fortia aperitiua exhibere cogis, tum cum eis lenitiua, & ipsorum calorem non nihil hebetatua permisceto. Quia fortia aperitiua humores exacuunt, & etiam humores adurunt, & melancholiam generant. Ideò post horum usum, lenientibus melancholiam respicientibus, uti

ti refert.

Sacculi pro epatis cōfortatione, an- 1101.
 q̄ epati administrentur, prius calefiāt
 apore resoluti ab aqua eupatorii seu
 bsynthii calenti, lateri inspersa.

Quando epar ex vsu balnei aërei, aut 1102.
 emplastrorum, supercalefactum est, q̄
 ex siti & vrina colorata constat, refri-
 gerantia adhibeantur.

Medicinæ epaticæ subtilissimè pul- 1103.
 ueriscentur, sic & Diuretica, vt per angu-
 stos meatus transire possint, & in auro-
 ra offerantur.

Epati nihil actu frigidum adhibea- 1104.
 tur, sed omnia modicè calefacta, hoc
 est, tepide adhibeantur, ne ex actuali
 frigiditate venæ adstringātur, oppilen-
 turque, & materia crassior & resolutio-
 ni ineptior fiat.

Frequens singultus, & præter con- 1105.
 suetudinem continuus, iecur inflam-
 matum esse significat.

Ex iecinore si pus cruentum exit 1106.
 mortiferum est.

Si ante septimum diem febrici- 1107.
 tanti

tanti superueniat morbus regius simul cum horrore, soluitur febris, si verò sine horrore acciderit, perniciem denunciat.

1108. Quibuscunque iuuenibus epar calidum constipationem inducit, his potus aquæ frigida subuenit, præcipuè si sumatur circa principium refectionis.

1109. Iecore malè coquente, facies, oculique tument.

1110. Epar calidum sæpè est in causa vt generetur cancer, lepra, quartana, & reliquæ ægritudines melancholicæ. In epate enim calido, generantur humores adusti multi. Quare epatis intemperies in eiusmodi morbis hebetetur, ac emendetur, refrigerantibus epithematibus, inunctionibus, & cibis refrigerantibus, humectantibusque. Humores autem assari, adurique, ab epatis intemperie calida, constat, ex vrina intense rubea, & ex arenulis in matula lateribus adhærentibus rubeis. Quando itaque in quartana, cancro, & aliis melancholicis affectibus talis vrina emingitur,

igitur, certum est, hos morbos ex humorum adustione esse ortos: hic plerumque una adest corporis siccitas, mariesque, color faciei rubet, aut flauescit, & sitis adest.

Epati nequaquam vehementer calidula administrentur, ne epar immodice rarefiat, & eius virtus resoluatur, evaporato calore nativo & spiritibus. Est enim epar alias membrum rarum, & facile resolubile. Sic etiam intense frigida letestantur, ne eius calor natiuus extinguatur, vnde hydrops, aut ne eueniat oppilatio.

Immodicè styptica epati applicantula non sunt. Venæ enim per epatis substantiam disseminatæ, per se strictæ sunt, ideoque à stypticis arctiores fiunt, & sic facile obstruuntur.

Vitiato epate, totius corporis color alteratur.

Quando epati administramus emulastra discutientia, & resoluentia materiam in eo contentam, hæc enim rarefaciendo epatis substantiã resoluunt, debi-

370 *Aphorismorum Medicin.*

debilitantque, ideo cū discutientibus
quædam styptica boni odoris, epat
conferentia, vt spicam, spodiū, &c. cō
miscere debemus, in parua tamen quā
titate, ne resoluentium & rarefacientiu
virtutem seu operationem impedian

III 5. Quibus iecur aqua refertum eru
perit in omentum, his venter aqua ex
pletur, atque moriuntur.

III 6. Propter iecoris inflammationem
singultus, malum.

III 7. Quibus purulentum iecur aduritum
si purum pus effluat & album, salui fi
unt. In tunica enim ipsis pus contine
tur: si verò qualis amurca profluat, in
tereunt.

III 8. Quibus iecur vehementer dolet, in
febris superueniens soluit dolorem.

III 9. Si aqua intercutē quem impleuit, si
mul eam omnē effudisse, mortiferū est.

III 20. Aqua intercutem, si ex acuto morbo
cœpit periculosa est. Neque enim fe
brē soluit; sed doloribus torquet, atq
interficat. Oritur verò magna ex parte

ve

elabilibus, vel lumbis, vel à iecore.

Aqua intercus, plerunque vitio ie- 1121.
inoris oritur.

Lienis magnitudo, hydropem mi- 1122.
atur, vel corporis maciem.

Ginginarum & oris vlcera in hydro- 1123.
e, mortem minantur.

Hydrops, qui iecoris apostemati su- 1124.
peruenit, difficulter sanatur.

Qui hydropem causat humor, si te- 1125.
nui fuerit per sudores resoluitur, sin
crassus ac densior, paracentesi, aut cu-
rbitulis exploditur.

In hydrope detestatur venæsectio, 1126.
nisi hic ob menses retentos ortus sit,
um vena tali secanda est. Idem intelli-
gatur, vbi hydrops ob retentas hæmor-
rhoides ortus est.

Phlebotomia in omni hydrope de- 1127.
testatur, parua tamen conceditur in tri-
bus casibus: vt si hydrops ortus sit, vel
ob epatis apostema, vel retentos men-
ses, seu hæmorrhoides, hîc saphenæ
tundantur vel ob magnam plethoram,
à qua calor natiuus suffocatur.

la

1128. In hydrope, vbi paracentesi vti volueris, aquæ parum semel euacuetur, ne immodica spirituum fiat euacuatio vndè mors. Idem intelligatur de magnis apostematibus, ne semel sanies immoderatus euacuetur.
1129. In hydrope ex causa calida orto, quæ intra corp⁹ offeruntur, sint temperata, hoc est, ex refrigerantibus & calorificis conflata. Extrinsecus verò supra ventrem ponantur calida, & resolutiua, super epas verò refrigerantia.
1130. In extrahendo aquam per puncturam in hydrope, semper obserues pulsum, hic vbi cœperit debilitari, tum sistas & retineas aquam & interim vaces confortationi virtutis, & rectificationi dyscrasiæ membrorum naturalium.
1131. Quando ascites seu hypofarca accidit, ob debilitatem attractricis renum, tum renibus vnguenta calida extrinsecus adhibeantur, vt eorum virtus attractrix confortetur, deinde exhibeantur vrinam prouocantia, tandem repetantur solutiua, & deinceps rursus diuretica

ica offerantur.

Quando venter inferior tumet, & 1132.
rina est inculcata, tunc certum est in-
icium per stomachum multiplicari
entositatem extendentem, & non est
ympanites, quia impossibile est, hy-
ropem fieri absque epatis noxa.

Aqua intercutem laborantibus ex- 1133.
ta in corpore vlcera, non facile sanā-
ir.

Hydrope detento, si aqua è venis 1134.
ventrem confluerit, soluitur mor-
us.

Quicumque empyi aut hydropici v- 1135.
untur, aut secantur, si pus aut aqua
niuersim effluerit, omnino moriun-
ir.

Hydropicis tussis si superueniat, ma- 1136.
im.

Albæ pituitæ, aqua intercus super- 1137.
enit.

Paracentesis solummodò in ascite 1138.

tentanda, & nequaquam in hypo-
erca seu tympanitide; nam hoc morta-
est: item in sene, in puero, & quando

S adest

374 *Aphorismorum Medicin.*

adeſt tuſſis, aut ventris fluxus, aut quādo æger debilis eſt, tūm nequaquā paracentefi vtere.

1139. Vt vix vnquā exuit ſalſedinem a-
ger, quem mare aliquando inundauit:
ita corpus affectum ſemel gallica ſca-
bie, vix, vel vnquā ab ea perfectè ſa-
natur.

1140. Febris ſi coniungatur cum morbo
gallico, malum.

1141. Nota ſufficiētis inunctionis in mor-
bo gallico eſt, cū dentes dolere, os
exulcerari, gingiuarū inflari, humiditates
manifeſtè ex ore fluere, & accidentia
remittere incipiunt, hoc enim indi-
ciū eſt, materiam attenuatam, ſubtiliatam-
que eſſe, & hīc ſecretum eſt exhibere
ſolutium, vt ſic humores per alium,
& non per os euacuentur.

1142. In morbo gallico, cum puſtulæ iam
incipiunt apparere, natura expulſiue
adiuuanda eſt.

1143. In lue venerea puſtulis apparenti-
bus, phlebotomia poſthabenda eſt.
Quādo enim materia adhuc exiſtit in

tri

tra venas, sicut in principio, ad materiam minorandam phlebotomia admittitur, sed quando materia extra venas ad cutem notabiliter est expulsa, tunc improbatur. Idem de scabie & variolis etiam intelligatur.

Curatio per lignum guaiacum, de- 1144.
testatur in corporibus cholericis, siccioris habitudinis, & emaciatis. Inde enim cum hecticam febrem, tunc talem incurrunt.

Suffumigio cum cinnabare in morbi 1145.
gallici cura postremo utimur, quando de salute ægri desperamus, & eo non nisi in corpore robusto & athletico utimur. Hoc verò utendum non est, si adest asthma, aut hectica, aut acuta febris, aut in valde debilibus.

Ligni guaiaci usus detestatur in fe- 1146.
brientibus, & extenuatis corporibus.

Tempore inunctionis in morbo gal- 1147.
lico, confert guttur, palatum, & os, quibusdā convenientibus gargarismis dedere, ne ex inunctione vehementer exulceretur, & exhibere pillulas Cochias,

376 *Aphorismorum Medicin.*

vt materia sic ad intestina auertatur, dirigatur.

1148. Colicorum cruciatus multò magis, quàm nephriticorum, lenientibus mitigantur clysteriis, atque euenit interdum, vt frigido aliquo liquore simul eiecto, protinùs quiescant. Nephriticis verò dato medicamento, quòd lapidè in renibus conterere possit, simul & affectum ipsum, & sedem affectam leuari contingit, cum vrina enim lapillo existente, à dolore liberantur.

1149. Ab ileo vomitus & singultus, & desipientia & conuulsio, malum.

1150. Quando, in colica ventosa ex usu anodynorum, dolor intenditur, augeaturque, tunc certum est, materiam ventosabilem esse multam, quam medicamenta non possunt consumere, sed potius eam in flatus conuertunt, vnde dolor intenditur. Quare hîc humorem flatus fouentem dissecare, & concoquere citra vehementem calorem, & minimè per infantium usum, conuenit.

1151. Quicquid in colica in clysteribus, vesi-

vesicis, emplastris, & vnguentis administratur, id cum temperata caliditate applicetur, quia mordax caliditas tristam facit sensationem, & sic intendit dolorem.

Quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua ex parte prorumpit. Quorum si nihil euenit, necesse est, in cruribus mala vlcera, & ex his nigræ cicatrices fiant. 1152.

Eos, quos lien malè habet, si tormina prehenderint, & hoc vel aqua intercutem, vel intestinorum leuitas consequatur, vix vlla medicina periculo subtrahit. 1153.

In lienis affectibus, non temerè est secanda vena, nisi hoc summa exigat necessitas. Quia lien est membrum frigidum, & inde magis infrigidatur. 1154.

Ex phlebotomia saluatellæ sinistræ manus, in morbis spleneticis maius sequitur iuuamentum, quàm ex phlebotomia basilicæ sinistræ. 1155.

Ad splenem in scirrhum indura- 1156.

S 3 tum,

378 *Aphorismorum Medicin.*

tum, sanguinis detractio commoda est, quæ inter paruum sinistrae manus digitum, & eum qui medio proximus, facta sit.

1157. Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bono est.

1158. Eadem ferè est curatio in lienis affectibus, quæ in epatis affectibus, nisi quod illic fortiora requirantur medicamenta.

1159. Lienis excremēta, solùm per aluum sunt euacuanda, non per sudorem, sicut materiae epatis.

1160. Lien acetosis delectatur.

1161. In lienis affectibus, nunquàm nudis, aut fortioribus utamur resolutiuis, ne induretur, sed semper cum resolutiuis mollificatiua permisceantur.

1162. Lieni nihil actu frigidum imponatur, sed omnia quæ extrinsecus administrantur, tepido calore prædita sint.

1163. Lien indiget attenuantibus pharmacis, citra manifestam tamen caliditatē, ne vehementiùs, succus crassus in ipso obturatus, incrassescat.

Non-

Nonnūquā accidit vomitus cho- 1164.
lericus, æruginosus, prasinusque in co-
lica, ob dolores, vigilas, & medicinas
calidas administratas. - Indè enim cho-
lera augetur, aduritur, quæ, cū per al-
uum non potest excerni, regurgitat ad
stomachum, vndè vomitus.

In dolore ventoso, vt in colica fla- 1165.
tuosa, nequaquā fortia anodyna ca-
lida admouenda sunt, antequā mate-
ria, seu clystere, vel lenitiuo imminuta
sit, sic enim dolor intenditur, materia
crassa frigida inflatus conuersa.

Ne pituitosæ materiæ calido disso- 1166.
lutæ, à stomacho ad renes, & ad vicinas
partes ducantur, priusquā exhibeas
lapides comminuentia, cum cassia, o-
leoque amygdalarum dulcium, ven-
trem lenire oportet.

Etsi, quæ crassos glutinososque suc- 1167.
cos attenuant, calculosis conducunt: iis
tamen quæ valdè calefaciunt dari, ne-
quaquā conuenit.

Si is, quem calculus infestat ob- 1168.
esus est, huic tenuem victum audacter

iniungere licet.

1169. Nephritici ab initio dilutas, pluresque urinas reddunt, sequentibus vero diebus crassi aliquid in ipsis residere videtur.

1170. Renum & vesicæ vitia in senibus, difficulter curantur.

1171. Si, quibus è renibus laborantibus, dolores circa spinæ musculos fiant, siquidem ad loca exteriora sentiantur, extrinsecus abscessum fore expecta: si vero ad interiora magis vergeant, abscessum etiam intrinsecus futurum, potius sperandum est.

1172. In renum ac vesicæ affectibus, electuaria lenitiua melius competunt, quam haustus lenitiui. Electuaria enim non sic ad vias urinæ properant, ut potiones. Sic flores cassiæ probantur: sed vulgaris cassia extracta, quæ communiter in officinis seruatur, non probatur. Est enim diuretica.

1173. Enemata in renum affectibus non in magna quantitate infundantur, ne intestina repleta distentaque, renes comprimant,

primant, nec etiam in se multum salis habeant.

In renum vlceribus, dùm consoli- 1174.
datiuis vteris, tertio quoque die laua-
tiuam potionem exhibeas, vt si fortè a-
liqua materia eò defluxisset, non faciat
obstructionem, & à calore renum in-
spissata & indurata, conuertatur in cal-
culum.

Quidam per circuitus quosdam san- 1175.
guinem è renibus excernūt, simili mo-
do vt ex hæmorrhoidibus, & talis san-
guis absq; dolore excernitur, sed quan-
do intempestiuè sistitur, grauitas acci-
dit, nonnunquàm etiam vertigo, deli-
rium, hydrops, &c.

Nonnunquàm post curationem cal- 1176.
culi, sequitur dolor iunçturarum, pro-
pter vsum diureticorum in curatione
calculi adhibitorum. Humores enim
indè attenuati & liquati, ad iunçturas
defluunt, vndè podagra, vel arthritis.

Nulla medicamenta lapidem fran- 1177.
gentia, sunt intra corpus exhibenda,
nisi priùs materia circa primas vias sit

S 5

dige-

digesta, & euacuata medicamentis lenitiuis.

1178. Exectionem calculi sæpè succedit aut immodicum sanguinis profluuiū, arteria scilicet aliqua dissecta, aut frequens vrinæ fluxus, quòd neruosa pars vesicæ sit vulnerata, quæ non consolidatur, aut sterilitas dissectis vasis spermaticis, aut dolor vehemens, aut apostema, aut sanguinis in vesica, coagulationio.

1179. In calculo & apostemate renum, è directo renis, accidit sæpè pedis obdormitatio, seu stupor, eò quòd neruis ad tibias & pedes tendentibus, mala qualitas sit communicata, aut quòd nerui comprimantur, vnde obstructio attenuatoria, sic vt spiritus minimè liberè ad pedes transire possint.

1180. In calculo, dolore instante, nequaquam fortia lithōtriba & diuretica exhibenda sunt, sic enim intenditur, augeaturq; dolor, sed quæ dolorem mitigent, & clysteres mollicantes, iniiciantur.

1181. In calculi dolore detestatur medicamenta

camenta adhibere extrinsecus exiccantia, vt sacculos exiccatiuos ex milio factos, item pannos calidos. Sic enim calculus fit durior, & meatus vrinales arctiores fiunt, ob continuam exiccationem. Hic adhibeantur resoluentia cum mollificantibus permixta, vt materia crassa sic humectata, possit resolui, & vt viae vrinae ampliores reddantur, ab humectantibus, mollificantibusque. Si enim nuda resolutiua applicantur, tum subtilibus partibus resolutis, materia crassa in calculum conuertitur.

Quando in renum, seu viarum v- 1182.
rinae exulceratione exhibemus consolidantia, tum cum eis aliqua diuretica, in pauca tamen quantitate, vt semen feniculi, petroselini, dauci, &c. sunt commiscenda, quae medicamenta consolidantia eò, ad vias scilicet vrinae, deducant. Quia eiusmodi medicamenta per se sunt difficilis transitus ad vrinae vias. Quando verò dolor est intensus, tum his narcotica quaedam admiscenda sunt.

S 6

Vesicae

384 *Aphorismorum Medicin.*

1183. Vesicæ calculi pueritiam: renum verò senectutem, magis infestant.

1184. Quibus in meatu urinario nascitur tuberculum, suppurato eo & rupto, solutio.

1185. Inconsolidatione ulcerum colli vesicæ, ob meatus seminis consolidatos, sæpè succedit sterilitas, hîc enim in coeundo nihil seminis excernitur.

1186. Curatio herniæ per incisionem, non est molienda in laborantibus valida iusti, in reconualescentibus, in senibus excedētibus annum sexagesimum, nec in tempore magni frigoris, aut magni æstus.

1187. Difficultatem urinae, phlebotomia soluit: secare verò interiores.

1188. Stranguriam & dysuriam thorexis, & venæsectio soluit. Incidendæ autem sunt interiores.

1189. Quibus à stranguria Ileus superuenit, intra septem dies moriuntur, nisi febris superueniente copiosa urina fluxerit.

90. Quæ urinam prouocant, illa etiam

etiam menses prouocant.

Quando in sanguinis mictu extrin- 1191.
secus vsus es vnguentis, tum omnibus
diebus in sero, panno lineo in aceto ca-
lido infuso, abstergantur & mundifi-
centur partes inunctæ, ne viscositate
olei, & ceræ, pororum fiat clausio, & sic
per accidens calor intrinsec⁹ augeatur.

Vrina supprimitur, vbi lotium vltra 1192.
modum in vesica detinetur, vnde ve-
sica ita repletur ac distenditur, vt mini-
mè contrahi possit. Idem accidit, vbi
intestina stercoribus immodicè sunt
referta, vnde aluus cohibetur. Idem et-
iam contingit, vbi stomachus immodi-
cè cibo est repletus, tales strangulari &
suffocari videntur.

A iecoris constrictione, alui fluor fa- 1193.
ctus, aperitiuis de oppilantibus & venæ
basilicæ sectione curatur.

Alui fluxum parientes, iecore crassis 1194.
succis obstructo, & digestrice læsa, cali-
dis dissoluentibus egent. Quibus verò
retentrix debilis fit, his conducunt in-
frigidantia.

S 7 Post

386 *Aphorismorum Medicin.*

1195. Post alui longam resolutionem, termina, posthæc intestinorum leuitas oritur.
1196. In fluxionibus alui, excrementorum non in deteriora facta mutatio, iuuat.
1197. Longo alui profluuiio laboranti, spontè vomitus superueniens, morbum soluit.
1198. A diarrhæa, dysenteria.
1199. In diuturna leuitate intestinorum, si ructus acidus superueniat, qui prius non extiterit, bonum est signum.
1200. In longis intestinorum difficultatibus cibi fastidium, malum, & cum febre peius.
1201. In omni ventris profluuiio, quando virtus debilis est, morbusque sæuit, ac syncopem minatur, tùm posthabita euacuatione fluxus sistatur, ne virtus prosteratur. Sed postea restaurata virtute, vt post quinque vel sex dies, repetatur euacuatio stypticis, vt mala materia retenta euacuetur, ne sit causa recidivæ.

Quan

Quando profluvia ventris intempe- 1202.
stinè sistuntur, succedit nonnunquam
phrenitis, lethargus, parotides, aut pe-
riculosi abscessus, arthritidis, iuncturarū
dolor, aut angina.

Quando ventris adest fluxus im- 1203.
modicus, tūc tota tua intentio sit hu-
mores commotos reddere quietos &
immobiles, refrigerando scilicet, & in-
spissando, ac adstringendo meatus, per
quos materia ad stomachum fluit.

In ventris fluxibus, si vis, quòd Rha- 1204.
barbarum minùs debeat euacuare, &
magis adstringere, tūc assetur. Si verò
vis ipsum plùs euacuare, quàm adstrin-
gere, tūc non assetur.

Dysenteria, si ab atra bile incipiat, 1205.
exitiosa.

Si dysenteria laboranti veluti ca- 1206.
runculæ deiiciantur, mortiferum.

Dysenteria superuenit lienteria. 1207.

In dysenteria, vbi clysteres consoli- 1208.

dantes iniicere est animus, tūc nequa-
quā imponantur olea & pinguedines.

Quia hæc omnia consolidationē fieri,
prohibent.

In

388 *Aphorismorum Medicin.*

1209. In ventris profluuiis & in dysenteria, inunctiones & fomenta quæ adhibentur, non sint multum calida, sed tantum tepida.

1210. In dysenteria intestinali, semper quoque habeas respectum ad epar, quia dysenteria intestinalis sæpè coniungitur cum fluxu epatico, quod multos decipit.

1211. Medicamentis adstringentibus in dysenteria, urinam cientia semper sunt admiscenda, ut sic materia per vias auertatur urinæ. Si hoc non fit, periculum est, ne materia, via adstringentibus præclusa, regurgitet ad epar, & efficiat hydropem, aut ad pedes, & fiat podagra. In summa omnia diuretica tam calida, quam frigida, sistunt ventrem, eò quod multiplicent urinam.

1212. In forti dolore ventris, partium extremarum frigiditas, malum.

1213. Qui colicis doloribus sæpè laborant, in nervorum resolutionem incurunt.

1214. Iliacus morbus, nisi resoluatur intra diem

diem septimum, lethalis est.

Chronica intestinorum exulceratio 1215.
cuiusvis humoris fuerit, clysteribus
absterfuis vna vice iniectis, & altera
constrictiuis, eget.

Iuvenes cholericici in viis vrinalibus 1216.
ulceratis fluxum patientes, à potu vini,
& maximè acuti, abstinere debent.

Quibus elata hypochondria mur- 1217.
murant, lumborum superueniente do-
lore, aluus humectatur, nisi infernè fla-
tus erumpant, aut vrinæ multitudo
prodeat, atque hæc in febribus.

Quibus ad hypochondrium dolor 1218.
est sine inflammatione, iis febris super-
ueniens dolorem soluit.

Dolores ventris sublimes, leuiiores: 1219.
non sublimes, fortiores.

Si quod gracile intestinum perfectū 1220.
fit, non coalescit.

Quibus in iuuentute aluus est hu- 1221.
mecta, iis in senectute siccatur: Quibus
contra sicca adstrictaque iuuenibus
fuit, iis senibus humecta, laxaque fit.

Quibus aluus est humida, iuuen- 1222.
tam

tam quidem agunt facilius, quàm qui eandem siccam habent, sed senectute difficiliùs defunguntur. Iplis siquidem senescentibus, ferè resiccatur.

1023. Aluo constricta deorsum purgans pharmacum offerre, priusquam solvatur mollit uo enema, siue supposito-
rio, rationi disconuenit.

1224. Brassica subcruda aluum mollit, bis cocta stringit.

1225. Assuefactio simplicis suppositorii, vel clysteris, in illis, qui à constipatione grauantur quotidiana, non offendit naturam.

1226. Aluus ex toto suppressa, malum.

1227. Medicinæ alui constrictiue, antequàm ministrentur, modicum sunt ad-
urendæ.

1228. Iuuenes quià fluxu cholericò molestantur & maximè in æstate, copiosus potus aquæ frigidæ liberat, si sumatur urgente siti, præcipue circa refectionis principium.

1229. Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides superuenientes, bono sunt.

Diutur

Diurnas curanti hæmorrhoides, 1230.
nisi vna quæpiam seruetur, periculum
quæ intercuris, vel tabis impendet.

In tenesmo, omnia calidè actu ad- 1231.
ministrantur, quia frigida vehementer
inocent musculo ani.

Intense frigida, nequaquàm testicu- 1232.
is administrantur. Habēt enim hi col-
ligantiam cum corde, & aliis membris,
& citò alterantur.

XIIII.

De morbis mulierum.

Suffitus aromatum muliebria edu- 1233.
cit. Ad alia verò multa utilis esset, nisi
capitis ingeneraret grauitatem.

Mulier in vtero ferens secta vena, ab- 1234.
ortit, eoque magis, si sit fœtus gran-
dior.

Matrix fœtus concipere, & nutrire 1235.
concupiscens, si diu sine fructu ma-
neat, priueturque desiderijs, circa vi-
scera sese mouendo, grauiter molestat
mulieres.

Mulier

1236. Mulieri grauidæ sine modo fusa al-
nus, elidere fœtum potest.
1237. Si mulieri lac ex mammis profilit
imbecillum est, quod intus gerit. Dura
verò mammae, sanum illud esse testan-
tur.
1238. Mulier si ex partu cum febris, vehe-
mentibus & assiduis capitis doloribus
premitur, in periculo mortis est.
1239. Mulieri grauidæ, si subito mammae
emarcuerint, abortus periculum est.
1240. Quæ neque peperit, neque grauidæ
est, si lac habet, menstrua suppressa esse
indiciū est.
1241. Mulieres quæ in nauibus pariunt
mutos edunt.
1242. Prima pares, & quæ rarius pariunt
plurimum in partu & puerperio labo-
rant, quæ verò crebrius, pariunt mi-
nus.
1243. Saltus in primis septem diebus peri-
mit semen, & eiicit.
1244. Fœmina cum concepit, menses non
defluunt, siquidem fœtus sanus futurus
est, præterquam pusillum, quibusdam
primis

primo mense.

Sternutamenta partum adiuuant, 1245.
conceptum verò expellunt.

Prægnantibus tenesmus, lethalis 1246.
t.

Ebrietas conceptum inhibet. 1247.

Vulvæ strangulationes, quæ retar- 1248.

tis mensibus fiunt, minoris sunt pe-
culi, quàm quæ retento genitali semi-
accidunt.

Si gravidis vbera emoriuntur, abor- 1249.
s imminet.

Fetus humidi in matricis ægritudi- 1250.
bus noxii sunt.

Mulierum nonnullæ omninò steri- 1251.

sunt, aliæ mutatis coniugiis sterili-
tem exuunt, nonnullæ tantùm semel,
quædam autem mares tantùm, & aliæ
minas pariunt.

Mulieris vulvæ collum constrictum 1252.

querit absque duritie concipit si: verò
in duritie, strictum reperitur ab ob-
trice, vterum pati demonstrat.

Mulieres candidam faciem haben- 1253.

, & quæ ad plumbi colorē declinant,
frigidæ

394 *Aphorismorum Medicin.*

frigidas & lubricas habent matricēs,
ob id rarò concipiunt. Albæ autem ru-
bro colore perfusæ, sæpius.

1254. Passiones animi vehementes, aut la-
bores corporis fortes, alui fluor, vomi-
tus, aut venarum sectio, repletio su-
perflua siue inanitio, coitus nimius
balneum uè calidum, hæc prægnante
abortire cogunt.

1255. Trochiscorum galliæ moschata pul-
uis, cum albo vino datus, parturienti-
bus difficilem partum accelerat, foeti
quoque mortuum, & secundinam e-
ducit.

1256. Sanguineæ mulieres in prima Luna
quadra, suos menses patiuntur, in se-
cunda biliosæ, quibus atra bilis abun-
dat in tertia, & in quarta, pituitosæ.

1257. Menstruis deficientibus sanguis
naribus fluens bonum.

1258. Quibus fœminis menstrua non pro-
ueniunt, necesse est capitis acerbissim
dolores sint, vel quælibet alia pars mor-
bo infestetur.

1259. Si mulier à partu vehementes do-
lor

res habet, neque præterea signa mala
sunt, circa vigesimum diem, aut san-
guis per nares erumpit, aut inferiori-
bus partibus aliquid abscedit.

Menstruorum retentio, frequentes 1260.
morbos gignit, conceptum impedit,
venas implet atque distendit, vesicam
remit, urinam prohibet, dolorē lum-
borum, & suffocationem excitat, coxæ-
micem molestat, interdum putrescit, &
suppurat.

Mulier ubi conceperit, menses non 1261.
effluunt.

A menstruis repurgatæ, concipiunt 1262.
facilimè.

Mammis cucurbitula imposita, mu- 1263.
serum menstrua sistit.

Quibus menses in totum præmatu- 1264.
è subsistunt, citius moriuntur.

Mulierem gravidam morbo quoopiã 1265.
ocuto corripit, perniciosum.

Mulieri sanguinem euoment, men- 1266.
struis erumpentibus, solutio fit.

Mulieri, menstruis præter naturam 1267.
efficientibus, sanguis è naribus pro-
fluens,

396 *Aphorismorum Medicin.*

fluens, bono est.

1268. Mulieri hystericae, aut difficulter parienti sternutamentū superueniens, bonum.

1269. Mulieri menses decolores, nec eodem semper modo & tēpore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam.

1270. Mulieri geminos ferenti si altera mamma extenuetur, alterum abortum edit: Et si quidem dextra mamma extenuata est, marem, si verò sinistra, foeminam abortione excludit.

1271. Quibus in mammis sanguis colligitur, furorem significat.

1272. Si scire velis an mulier conceperit, dormiturae aquam mulsam potui dato, & si ventris tormina patiatur, concepit: sin minus, non concepit.

1273. Mulier grauida, si marem gerit, coloratior est, si foeminam, decolor.

1274. Si praegnantī in vtero fiat erysipelas, perniciosum est:

1275. Quae praeter naturā tenues vterum gerunt, abortiunt, donec habitiores euaserunt.

evaserunt.

Quæ verò mediocriter corpulentæ, 1276.
abortum faciunt, secundo mense aut
tertio, sine occasione manifesta, iis co-
yledones lentoris sunt plenæ, nec præ
ponderare fœtum continere possunt, sed
ruptis decidit.

Quæ præter naturam crassæ, non cõ- 1277.
cipiunt, iis vteri os ab omento compri-
mitur. Itaque gravidari, donec extenu-
antur, nequeunt.

Si qua parte vterus coxæ adiacet 1278.
suppuraverit, emmotis medicamentis
uretur necesse est.

Mares dextra vteri parte, fœminæ si- 1279.
nistra magis gestantur.

Ad secundas derurbādas sternutato- 1280.
io immisso, nares & os, manu obtura.

Mulier, si placet menstrua sistere, 1281.
curbitulam quàm maximam ad mē-
bras appone.

Quæ ventrem ferunt, iis vteri os 1282.
conniuet.

Quæ fœtum sunt perdituræ, iis 1283.
ammæ extenuantur. Contrà verò
T duræ

398 *Aphorismorum Medicin.*

duræ si fiant, dolor aut mammas, aut
coxas, aut oculos, aut genua fatigabit
nec abortiunt.

1284. Quibus os vteri durum est, iis arde-
tur est necesse.

1285. Quæ gestantes vterum febribus cor-
ripiuntur, aut vehementer sine euiden-
te causa extenuantur, eæ difficulter &
cum periculo pariunt, aut abortiente
periclitantur.

1286. Si muliebri profluuiio convulsio
aut animi defectus superueniat, malum
est.

1287. Menstruis abundantibus morbi e-
ueniunt, & subsidentibus accidunt a
vtero morbi.

1288. Si mulier non concipit, & scire pla-
cet an sit conceptura, veste præligatam
& undique obuolutam subter sufficit
ac si odor corpus pervadere videretur
ad nares & os usque non sua culpa steri-
lilem esse scito.

1289. Si prægnanti purgationes menstrui
cursum suum teneant, benè valere for-
tum est impossibile.

Simu

Si mulieri purgationes non prodeant, 1290.
neque horrore, neque febre superue-
niente, cibique fastidium accidat, præ-
gnantem esse putato.

Quæ frigidos & densos locos ha- 1291.
bent, vtero nõ concipiunt, & quæ præ-
humidos habent, gravidari nequeunt:
Extinguitur enim in ipsis genitura. Et
quæ sicciore & æstuosos: nam alimen-
ti defectu semen corrumpitur. Quæ
verò ex vtraque oppositione modera-
tam naturæ sunt locorum temperatio-
nem, & fecunditate valent.

Par est de maribus ratio. Aut enim 1292.
propter corporis raritatem spiritus fo-
rās dissipatur, ita ut genituram eiacula-
ri nequeat: aut propter densitatem hu-
mor forās non profilit, aut propter fri-
gidityatem non incenditur, ut eò loci
coaceruari possit: aut propter calidita-
tem hoc idem ipsum usu venit.

Mulier podagra non laborat, nisi i- 1293.
psam menstrua defecerint.

Si prægnanti tenesmus superuene- 1294.
rit, abortus est causa.

T 2

Mulier

400 *Aphorismorum Medicin.*

1295. Mulier non fit amphidextra.

1296. Post quadragesimum quintum annum nequaquam menses prouocandi sunt.

1297. Quando menses retenti sunt ob sanguinem crassum, ab excessiua caliditate, scilicet epatis, inspissatum & assatum, tùm leuibus vtere diureticis, cum refrigerantibus & humectantibus permixtis. Si enim calidioribus vteris, sanguis fit crassior partibus subtilioribus resolutis. Hic etiam refert choleram adustiore fountem cum infusione Rhabarbari euacuare.

1298. Menses prouocantia, tempore motus menstruorum, exhibenda sunt, vt natura in suis motibus iuuetur. Motum vero naturę adesse, constat ex dentiũ & capitis dolore, & membrorum grauitate.

1299. In mensium retentione, si corpus est plethoricum, tùm principio mediana secetur, & parum sanguinis mittatur, ad plenitudinem solùm minuendam, postea vena tali aperiatur.

In

In retentis mensibus venatali sece- 1300.
tur, & parum sanguinis semel extraha-
tur, vt sic sanguis affuescat petere, & de-
fluere ad inferiora.

Quæ menses prouocant, illa prouo- 1301.
cant etiam hæmorrhoides.

Mensium prouocatio detestatur in 1302.
corporibus emaciatis cum diureticis.
Hic enim sanguis est paucus. Idem in-
telligatur, vbi sanguis menstruus in lō-
gis ægitudinibus non promanat. Hic
potius resumptiua offerantur, adhibe-
anturque, ne hæctica succedat.

In reconualescentibus ex morbo 1303.
chronico, nequaquam menses prouo-
centur.

Quando menses seu hæmorrhoi- 1304.
des plus iusto fluxerint, vel periodum
accelerauerint, significat corpus eua-
cuatione subtilium humorum, acuto ū
calidorumque indigere. Si verò restri-
ctæ fuerint, vel periodum tardauerint,
significat corpus indigere crassorū hu-
morum, frigidorumque, vt pituitæ, vel
melancholiæ, euacuatione.

T 3

Præ-

1305. Prægnantes mulieres, tutò & absque discrimine purgamus cassia præparata, ne flatus excitet, & Rhabarbaro. Hoc enim habet vim adstringendi, & confortandi, idèd à purgatione fœtum in vtero corroborat, & confirmat. Hæc medicamenta præterea non agitant, vna vtero gerentes ex spontaneis suis vomitibus, quos habent, primis mensibus, magis perturbantur, quàm ex his euacuationibus.

1306. Mulieres, quibus menses adsunt, purgandæ non sunt.

1307. In vomitu seu sputo sanguinis, ob re-
tentos menses, nequaquàm styptica offeras, sed sanguinem ad pectus fluentem, auertas ad interiora, vt pedum fomento, & deligatura, sic phlebotomia venarum tali, aut poplitis, aut scarificatione crurum, sic fiant balnea & infusiones ex leuibus menses prouocantibus, sed hæc nequaquàm stomachum & pectus attingant. Sic suffitibus & pessariis prouocentur menses, si his nihil promoueris, per os exhibeto leuia
medi-

medicamenta sanguinem attenuantia,
& venas aperientia.

In matricis procidētia, nequaquam ^{1308.}
excessiue fœtidæ suffumigationes in-
ferne ad matricem administrētur, præ-
sertim in delicatis mulieribus. Ex ho-
rum enim usu sæpè accidit syncope,
propter temperamenti spiritus altera-
tionem. Prætereà percepto nocumen-
to à virtute sensitiva, vehementer mo-
uetur matrix, ex quo vehemēti motu
vehemens fit ligamentorum extensio,
vndè intensus dolor. Ad hæc eiusmodi
suffumigationes calidæ sunt, vndè hu-
miditates in matrice existentes, in fla-
tus conuertuntur, hinc matricis fit dis-
tensio, vndè dolor. Ideò à leuioribus
suffitibus incipiendum est.

Menses non sunt prouocandi in ex- ^{1309.}
tenuatis, & in reconalescentibus ex
longo morbo, quia in talibus sanguis
est paucus, eoque natura profici conser-
uatione indiget. Si itaq; menses prouo-
care intēdis, tūc succedit hectica, cor-
pore immodicè exiccato. Sic in laborio-

T 4 sis

sis puellis, ut sunt rusticanæ, in quibus magna fit humorum resolutio, nequaquam menses prouocare intendas.

1310. Accidit nonnunquam in mulieribus, quibus menses retenti sunt, vomitus materiæ phlegmaticæ crudæ, ob frigidam stomachi intemperiem, hinc nequaquam menses prouocare præsumas, donec stomachi vitium sit emendatum, ne crudi humores ad venas traducantur, unde ipsa obstructio augeatur. Ideò principiò leue digestiuium offer, ut oxymel simplex cum melle rosato colato, postea pillulas leues, ut de hiera simplici offerro, tandem stomachum oleo nardino inungito, ut eius intemperies emendetur. Quando itaque stomachus ita est curatus, tunc quæ menses prouocent, exhibeto, tamen prius, ut materia præparata sit attenuantibus & dissecantibus, curato.

1311. Suffocatio matricis nonnunquam accidit, cum sanguinis eruptio ab utero repente sistitur.

1312. In paroxysmo suffocationis matricis,

cis, nequaquam aspergatur in faciem
agræ vinum, aut aqua rosacea, neque
etiam agra bibat vinum.

Venæsectio detestatur in suffocatio- 1313.
ne matricis, ex retento spermate orta.
Sic enim periculum est, ne venenosa
materia intra venas retrahatur, ut san-
guis totus inficiatur.

Mulieres cupientes prolem, cum utun- 1314.
tur diæta calida, & administrant matrici
res calidas, corripuntur interdum icte-
ritia.

Quando suffumigiū ad vuluā in pro- 1315.
uocandis mensibus præparare intēdis,
tūm circūquaq; probè cōtegatur mu-
lier, ne odor & fumi ad nares pertin-
gant, & capitis gravitatem inducant.

Quando menses repentē sistuntur, 1316.
accidit matricis suffocatio.

Menses retenti sæpè regurgitant ad 1317.
epar, & obstruunt ipsum, & sunt causa
hydropis.

Mulieribus, in quibus menses reten- 1318.
ti sunt, accidit nonnunquam sanguinis
sputum, vomitus sanguineus, fluxus

T 5 san-

sanguinis alui, hæmorrhoidarum fluxus, sanguinis narium fluxus, aut fluxus sanguinis per aures, materia ad superiora conuersa.

1319. Menses supprimuntur orificiis venarum, ad matricem pertinentium, obstructis, vel à crasso & lento succo, vel à pinguedine comprimente vasa, vel à cicatrice ab ulcere relicta, aut panniculo ori interiori prætenso, hicque menses superiora petunt, & puellæ suffocantur.

1320. Retinentur etiam menses, vel ob sanguinis inopiam, ut in adurentibus & chronicis febribus, ac labore emaciatas mulieribus, vel ob sanguinem aliò auersum, ut in nutricibus, & pustulis in cute enatis, vel ob calorem intensum, adurentem & inspissantem sanguinem.

1321. Virginibus quibusdam, ubi instat tempus, quo debent menses profluere, dolores vehementes accidunt, quod insinuat quandam esse obstructionem, & parùm menses euacuari.

1322. Prægnantibus mulieribus accidit epilepsia, ob materiam prauam retentam.

tam. Partu verò superueniente soluitur, materiebus malis euacuatis.

Vidux sanguineæ, plurimo abundantes sanguine ac spermate, matricem & testiculos habent calidos, semē detentum, adurentes, vaporesque indè ad cerebri meninges delati, efficiunt maniam.

XV.

De morbis puerorum.

Epilepsia laborantes pueros cū lo- 1324.
ci, victusque, tūm maximè ætatis mutatio liberat.

Epilepsia ante pubertatem a motio- 1325.
nem recipit: post vicesimū verò quintum annum, ferè comitatur ad vsque mortem.

Puer podagra non laborat, ante ven- 1326.
neris vsū.

Qui gibbi ex asthmate, aut tussi 1327.
ante pubertatem fiunt, statim moriuntur.

Pueri non sunt fame & inedia 1328.

T 6

mole-

molestandi, ne trucidetur ob magnam resolutionem, aut ne cadant in hecticam.

1329. In morbillis & variolis, nequaquam exhibeantur medicamenta purgatoria, ne materia acuta ad centrum retrahatur, auertaturque, & accidat intestinorum exulceratio, & lethalis dysenteria.

1330. Homo potest bis, ter, aut quater morbillis ac variolis affici.

1331. Sexagenarius potest affici variolis ac morbillis.

1332. Variolæ ubi fuerint egressæ, vena nequaquam est secanda, ne ad intra venas retrahantur.

1333. Variolæ ubi iam perfectè egressæ sunt, & iam maturæ sunt, acu aurea aperiantur, & sanies continuò cum coto leuiter exicceretur. Diutius enim sanies detenta corrodit carnem subiectam, & fiunt cicatrices fœdæ.

1334. Quando variolæ difficulter exeunt, & tardè hoc indicat materiam esse crassam. Ideò hæc attenuantibus est
atte-


attenuanda, & cutis oppilatio diffecā-
tibus referanda, vt materia sic possit ad
expulsionem præparari, & expelli.

Variolæ & morbilli cū incipiunt 1335.
apparere, tum debes iuuare naturam,
ad expellendam materiam ad superfi-
ciem cutis.

In variolis nequaquam refrigeran- 1336.
tia styptica extrinsecus administrentur,
ne materia repellatur ad interiora, &
accidat lethalis dysenteria, aut diffi-
cultas anhelitus. Sic etiam olei vsus de-
testatur, quia oleum sua viscositate op-
pilat poros cutis, inde variolarū exitus
inhibetur.

Corallia rubea infantum lactantiū 1337.
collo appensa, ad os vsque ventriculi
deuenientia, lactis vomitum prohibet,
roborantq; horum digestiuam.

Infantes quamdiu dentes non ha- 1338.
bent, vagiunt, vbi duos aut tres balbu-
tiunt, vbi completos loquuntur.



APHORISMO-
RVM MEDICINA-
LIVM,

SECTIO OCTAVA.

I.

De vulnere.

1. Cum Medicus putredinem à vulnere non eiicit, in loco putredinis sana caro nequaquam potest coalescere.
2. Satius est, vulnus omninò relinquere, quàm ei cum graui totius corporis perniciè mederi.
3. Erysipelatosa vulnera, pharmaco purgatiuo totius corporis indigent.
4. Auferre putredinem, est causa sine qua in vulnere caro generari nequit, donec quidem putredo fuerit in ipso, sana caro nullatenus orietur.
5. Carnem sanam, non est possibile, gigni,

gigni, nisi caro vulneris super quam est generanda, temperata sit.

Quoniam curatio est deperditi re- 6.
stauratio, concaua vulnera carne, cuius sanguis materia præcipua dicitur, replenda sunt.

Quantò magis vulnera humida 7.
fuerint, tantò magis siccis indigent.

Omnes, quotquot in thorace vul- 8.
nerati sunt iniectam per vulnus aquam mulsam illicò expuere solent.

In quibuscunque vulneribus mem- 9.
bri substantia non deperditur, sola æquatio, & conglutinatio restaurat sanitatem.

Labra vulneris conglutinantur, si 10.
nihil alienum intercidat, & naturalis membri complexio fuerit custodita.

In magnis vulneribus ligatura ne- 11.
quit absque futura labra vulneris contiguata conseruare.

Filum sericum labra distincta no- 12.
dans in moderata distantia, futuram efficit meliorem.

Festina

13. Festina consolidatio, vulnerū potissimum, causatur à sanguine pauca aquositate, quapropter aquosos potus vulneratos oportet cauere.
14. In vulneratis phlegmaticis, & in hyeme, mel vulnerariis potionibus coniungitur.
15. Sicut vulneratis hæmorrhagiam passis, merum præcipue conuenit: sic pronis ad eam denegatur omne vinū, & quicquid acuit sanguinem, vel stimulat ebullire.
16. Arteria vulnerata quantò plùs dilatatur, plus sanguinis euomit, quocirca necesse est, vt eius dilatatio, quantum possibile fuerit, remittatur.
17. Latitudinalis arteriæ sectio promptius solidatur, quàm apertura secundum longitudinem.
18. Modica venæ pulsatis apertura, in corpore molli & humido, vt puerili, & muliebri, sanari potest. Magna verò vix, aut nunquàm, in sicco & calido corpore.
19. Recentia vulnera cum aqua ardente lota,

lora, sanationis effectum citissimè consequuntur.

Alimentum attractum & incorporatum, in saniem conuertitur, ideoque vulneratis superfluitas alimenti obest.

Sicut aquositati debentur exiccatiua, 21.
sic vulnera saniosa mundificantibus indigent medicinis.

Superfluitas vulneris nisi vertatur in saniem, vel conglobata, generat apostema, vel spasmus accelerabit.

Vbi caput vulneratum, delirium 23.
metuendum est.

In vulnere neruorum, contractio- 24.
nes exitiales sunt, & quæ ex arefaciente causa oriuntur.

Sanies & maximè in vulneribus cõcauis, deperditæ carnis subitantiã prohibet generari.

Si in magnis vulneribus & prauis 26.
tumor non appareat, ingens malum.

Medicamenta neruis vulneratis ne- 27.
quaquam frigida administrentur. Frigus

gus enim nervis inimicum. Omnia itaque calidè, etiam ipsæ fasciæ administrantur.

28. Vulnere arcta ampliamus radice gē-
tiana, vel spongia vehementer com-
pressa & intorta.

29. Digestivis vivimus in vulneribus &
ulceribus brevi tempore, scilicet vix
tribus vel quatuor diebus, hoc est, do-
nec sanies satis bona & in debita quan-
titate generata fuerit, tūc amplius non
est utendum digestivis, ne ulcus putri-
dum, seu sordidum fiat.

30. Vulnus factum esse ab instrumento
seu sagitta veneno infecta, constat ex
loci tumefactione tendente ad lividi-
tatem & nigredinem.

31. In defensivis vulnerum pectoris, a-
cetum est omittendum.

32. Omne vulnus contusum, necesse est
putrefieri, & in saniem converteri.

33. Vbi dolor intensus vulnera affligit,
certum est, nervos in profundo vulne-
ris existentes, aut panniculum, qui ossa
ambit, esse tactum, & vulneratum.

Localia

Localia in vulneribus nimum quã 34.
oportet calefecisse, constat ex vulneris
circuitu, rubedine, pruritu, ac tenui sa-
nie. Medicamentum verò nimum re-
frigerasse, indè constat, quòd vulnus
frigeat, albescat cum crassa sanie.

II.

De Ulcere.

Ulcera, cæterorumque morbo- 35.
rum continuitatem, aut eorum diutur-
nitatem facit materiæ successus, cuius
cura est ablatio.

Omne vlcus, siue sponte, siue ex ac- 36.
cidenti factum, exiccati desiderat, me-
dicamento non aspero, præterquàm v-
bi malignum, & cum vehementi putre-
dine fuerit.

A membro ulcerato malam dyscra- 37.
siam auferre, maxima pars curationis
putatur.

Ulcera saniosa absteruis primò, & 38.
mundificatiuis egent, postea autē sic-
catiuis, & incarnatiuis.

Sordidis

39. Sordidis vlceribus tumefactis, exiccantium congruit, absque mordicatione resoluens.
40. Vlceribus corrosiuis, quæ spontè dilatantur, ac profunduntur, styptica mordicatione carentia debentur exiccatiua. Si verò fuerint venenosa, vt lupus & cancer, theriacalia debent administrari.
41. In quibuscunque vlceribus caro est mortua, computrescit, ideò vel ferro secari, vel igne comburi, aut medicinis tolli debet.
42. Magna collectio, præcipuè grossi humoris, tutiùs in saniem vertitur, quàm euaporatione dissoluitur.
43. Omnia vlcera, præter ea quæ loca humidissima inuadunt, diu aperta tenere, utilissimum est. Nullæ verò sunt partes humidiores pudendis, quare iis primo quoque tẽpore occurrendũ est.
44. Si tumores super vlcera subito esse defierint, idq; à tergo incidit, vel distectio neruorum, vel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit, vel
lacteis

lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam in huiusmodi casu, quæ tutissima inter hoc est, profusio alui sequitur.

Vlcus, siue ante, siue in ipso morbo 45. natum est, obseruari debet. Nam si moriturus est homo, aridum aut liuens, aut pallidum ante mortem apparet.

Vlcera quæ in sanientibus accidunt, 46. pestifera sunt.

Vlcera quæ rotunda sunt, difficulter 47. complentur.

Quicumque meatus innaturalis potest absque timore claudi, si fuerit strictus, & antiquitate suspectus, ob immundities coarctatas, enlargendus est incisione, vel medicinis, ut à profundo sincera consolidatio procuretur.

Quicquid præter naturam additur, 49. numero vel mensura, si tutò fieri queat, totum est auferendum.

Oleum non ponitur in vlceribus, nisi 50. si sit vehementis stypticitatis & siccitatis, ut est oleum myrtinum & masticinum. Et si omninò ponendum est, non

418 *Aphorismorum Medicin.*

non ponitur nisi in vlceribus contusis,
aut fortasse vt sedet dolorem.

51. Circumglabra vlcera, maligna.

52. Quibus in corpore pus nullam sui
dat significationem, ob crassitudinem
sui aut loci non se prodit.

53. Si vlcera annua, aut etiam diutur-
niora fiant, os abscedere est necesse, &
cicatrices cauas fieri.

54. Quæ unque vlcera medicamentis
non curantur, ferrum curat: quæ verò
ferro non curantur, ignis curat: quæ ve-
rò igne non curantur, ea existimare o-
portet immedicabilia.

55. Digestiuis in vlceribus si immodicè
usus fueris, vlcus putridum & sordidū
euadet. Ideoque cū in vlcere bona
sanies generata fuerit, digestiua medi-
camenta omninò sunt auferenda.

56. Abstergentes medicinæ, si immodi-
ce abstergunt, & nimis acutæ fuerint,
vlcus humidius euadit, ob carnem col-
liquatam. Hic æger erosionis sensum
sentit, & pars ipsa calidior, rubentior, &
tumentior apparet.

In

In vlceribus malignis, vbi color f. - 57.
 citi prauus est, vt albus aut plumbeus,
 aut citrinus, hoc insinuat epar esse vitia-
 tum, & sanguinem esse corruptum, vn-
 de vlcus egrè sanescit. Ergò hîc epar re-
 stituetur conforteturque.

Nihil mali potest aduenire vlcери 58.
 pus generanti. Suppuratio enim maxi-
 mum est in vlceribus ad securitatem
 signum.

Vlcus quando putridum est, tùm a- 59.
 cutis abstergentibus, vt vnguento Æ-
 gyptiaco, aut aqua salita, aut oxymelli-
 te mundificetur.

Omnia vlcera requirunt exiccantia, 60.
 exceptis contusis vlceribus, ibi opus est
 emollientibus digerentibusque.

Sanies semper debet abstergi in vl- 61.
 ceribus, ne membrum corrumpat.

Vlcere curato æger singulis mensi- 62.
 bus pharmaco, humorem exuperantē
 respiciente purgetur, ne de nouo ma-
 teria generetur, & in corpore coacer-
 uetur, quæ coaceruata, vbi per locum
 consuetum non potest effluere, regur-
 gitat

420 *Aphorismorum Medicin.*

gitat ad epar, & efficit hydropem, aut ad caput, & efficit maniam, aut ad pulmones, & efficit phtisin.

63. Quanto plus in vlcere abundat saniei, ac quantò acutius est pus, tantò sæpius ligatura est soluenda. Idem fiat in tempore calido, sic si putredo aliqua adest.

64. Omne vlcus siue sponte, siue ex accidenti factum fuerit, exiccari desiderat, medicamento non aspero, mordente & acri, præterquam vbi malignum, & cum putrilagine fuerit.

65. Quando in vlceribus nervosis labra callosa & dura sunt excindenda, tùm ante incisionem corpus est purgandum, & nucha secundum longitudinem spinæ inungenda confortantibus nervos, ne materiam motam ob dolorem recipiat.

66. In hæmorrhagia ligatura non est soluenda, donec securi sumus, sanguinem esse cohibitum.

67. In intemperie calida ligatura sæpius est soluenda, quàm in frigida. Item
in

in vulneribus neruorum, & chordarum
per diem bis aut ter soluenda ligatura,
& vt sic vlcus sæpiùs à sanie mundetur,
præsertim vbi mordicatio sentiatur.

Ex deligatura vehementi sæpè acci- 68.
dit membri corruptio, & mortificatio,
quòd per venas & arterias calor, spiri-
tus & sanguis ad membrum peruenire
non possunt. Calore itaque extincto,
membrum emoritur.

Ex vehementi deligatura, sicut et- 69.
iam ex ictu & casu accidit, vt humores
ad locum ratione doloris attrahantur,
auertanturque, vndè obstructio, aut in
venis, vndè membrorum atrophia, aut
in neruis, vndè paralyfis, aut nerui re-
pletio, vndè spasmus.

Quibus occulti cancri adsunt, non 70.
curare meliùs. Curati enim citiùs in-
tereunt, non curati verò longiùs vitam
trahunt.

In cancro topica constent ex me- 71.
diocriter digerentibus, cū refrigeranti-
bus quibusdā nonnihil permixtis, & o-
mnino rosione careant. Calida enim &
V dige-

422 *Aphorismorum Medicin.*

digerentia, vehementer tenuiores sanguinis partes digerunt, & humorem magis assant, crassiolemque reddunt. Frigida verò vehementer humorem crassiolem reddunt, & ad resolendum contumacem. Mordentia autem vitii malignitatem irritant.

72. Carbunculis nequaquam vehementer calida & caustica administrentur. Materia enim fit malignior, acutior, acriorque, prætereà cùm natura induratur, spiritus & sanguis ad interiora, scilicet ad cor, confugiunt, vnde coinficitur.

73. Erysipelas foris intrò conuerti, malum: intus verò foràs existere, bonum.

74. Ab ossis nudatione, erysipelas.

75. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.

III.

De inflammatione.

Communis curandi intentio o- 76.
 omnium phlegmonum, materiæ est eua-
 uatio. Eorum verò quæ adhuc fiunt,
 riuſquàm euacues ſanguinem, prohi-
 e fluere ad phlegmones augmentum.

Super calefacti mēbri exceſſiua in- 77.
 igidatio humores coarctando, natu-
 m membri corrumpit.

Post magnos feruores corporis, ner- 78.
 rum rigor aut diſtentio.

In particulis recenter inflammatio- 79.
 tentatis ex oppoſito: in vetuſtiori-
 s ex propinquo venæſectio eſt mo-
 nda.

Quando membrum phlegmone tē. 80.
 ur, tūm hoc neque eſt exercitandū,
 que mouendum, neque fricandum,
 eſertim in principio.

In omnium inflammationum prin- 81.
 cis ab oppoſita parte ſanguinē mit-
 oportet, at vbi affect⁹ diutiùs per-
 auerit, tūm maximè ab eodem affe-

424 *Aphorismorum Medicinæ.*

cto membro, si fieri potest, sin minu
saltem à propinquis sanguis mittat
tur.

IV.

De Apostematibus.

82. Humorū acuitas, aut ipsorum gra
uitas, siue virtutis expulsiuæ, aut ma
dantium membrorum fortitudo, &
fufcipientium debilitas, meatuum
nimia apertio, siue succorum copia, fre
quenter in membris causant apostema
ta.

83. Apostemata in nobilibus memb
& cordi vicinis facta, nusquàm fine
sine febris.

84. Si in magno abscessu multum p
coit, simul id omne effudisse mor
rum est.

85. Quibus speratur abscessum f
rum ad articulos, liberat ab hoc ab
su, vrina multa, crassa & alba facta,
lis in laboriosis febribus, quarto
quibusdam incipit fieri. Si verò e
ex naribus fluxerit sanguis, breu
mo

modum solutio fit.

Absque cibi tenuitate nunquam hu- 86.
moralis collectio comòdè resoluetur.

Multa parit incommoda, tardare a- 87.
pertionem saniosæ collectionis.

Cauendum est, ne abscessus summa 88.
cute in conualescentibus erumpens,
medicamento ad viscera reprimatur:
sed vt aliqua ratione discussum magis
ac magis expellatur, manibus, pedibus-
que innitendum.

Dùm pus fit, dolores ac febres acci- 89.
lunt magis, quàm confecto.

In principio apostematum, quando 90.
materia est multa & in fluxu, tùm ma-
teria antecedens est imminuenda, vt sic
postematis augmentum inhibeatur.
Quia in principio materia est obsequens
minoratiuo medicamento, eò quòd fit
in fluxu & motu.

Quando venenosum apostema ali- 91.
quo in membro est obortum, vt carbū-
culus, antrax, aut membri fideratio, &
corruptio, hîc extrinsecùs, cordi, & in-
trinsecùs, quæ cor confortent, ac de-
fendant,

426 *Aphorismorum Medicin.*

fendant, ne à venenosis vaporibus, in loco affecto resolutis, facile inficiatur, & quæ contra venena faciunt, vt in feбри pestilentiali, offerantur. Vapores autem petere cor, constat & ex feбри, & cordis tremore, seu saltu, ex syncope & virium debilitate.

92. In principio apostematum, materia semper ad oppositum est reuellenda, nisi in morbis pestilentialibus, vbi celeriter materia per partem propinquirem est expellenda.

93. Quando apostema aliquod aperis, tùm etiam ligatura expulsiua vtere, vt sic sanies in effluendo adiuuetur.

94. Quando apostema enanescit, & materia ad interiora recurrit, tùm principalia membra, non tàm extrinsecus, vt caput oxyrrhodino, cor & cæpar epithematibus stypticis, quàm intrinsecus confectionibus confortetur. In loco verò apostematis medicamenta attrahentia, vel cucurbitula affigantur. Sic & synapismis, fomentis, fricationibus, lapide corrosiuo, seu rupto.

ruptorio, materia foràs euocetur. Idem intelligatur de vlceribus intempestiue curatis.

Si in duritiem conuertatur apostema, 95.
tùm vtere primò mollificantibus,
& postea resolutiuis, aut vtere mollifi-
catiuis vnà cum resolutiuis permix-
tis.

In venenosis abscessibus, vt in car- 96.
bunculo nequaquam mera resoluen-
tia, & discutientia adhibeantur, ne ma-
teria fiat acutior, malignior, & naturæ
magis contraria. Ideò cum resolutiuis
quædam refrigerantia permisceantur,
vt ipsorum caliditas nonnihil hebetetur.
In summa componantur empla-
stra ex iis, in quibus sit attractio, euapo-
ratio, & digestio cum repressione.

Quando in apostemate oborto in 97.
interioribus, vt in pleuritide, &c. ve-
nam secas, euacuas, & anodyna admi-
nistras, & accidentia indè non miti-
gantur, certum est, apostema tendere
ad suppurationem.

V 4

Quan-

98. Quandoq; ex apostemate duro, melancholicoque aut scirrroso fit cancer, cum scilicet Medicus temerè medicinis vtitur resolutiuis calidis. Indè enim materia apostematis calefit, acuitur, & vritur.
99. Resoluentia medicamenta immodicè adhibita in apostematibus, materiam subtilem discutiunt, vnde scirrhus oritur, aut topi fiunt, resolutis scilicet partibus subtilioribus, crassis verò partibus relictis.
100. Apostema ad suppurationem tendere constat, ex doloris, pulsationis, caloris ac febris incremento.
101. Quæ perfrigerata sunt excalfacere oportet, præter ea, quæ sanguinem profundunt, aut breui sunt profusura.

V.

*De articulorum luxationibus,
& fracturis.*

Quicumque à nariuitate mutili fiunt, 102.
plerique ex his curabiles sunt, nisi val-
dè magna emotio facta fuerit, aut et-
iam adultis, & præauctis iam pueris cõ-
tigerit.

Articuli excidentes aut luxati, quò 103.
plus luxati aut elapsi fuerint, tantò dif-
ficiliùs reponuntur: & contrà.

Vbi articulorum & ossium discessus 104.
diuturnus est, vt reponantur, exigua
spes restat, periculi autè multum. Nam
si quis non reponat, stultæ plebeculæ
artis expers videbitur: si verò reponat,
ægrum propiùs ad mortem, quàm sa-
nitatem perduxerit.

Recentes humeri luxationes citiùs 105.
incidunt, quàm quis putare possit. Sed
& veteres quoque citò reponuntur,
nisi caro in acetabulum deueniat. Ve-

V s ranta-

runtamen & ita mihi inueteratam
brachii luxationem reponi posse vide-
tur. Quid nō enim nouit iusta molitio?
verūm ne iterum pro consuetudine fa-
cilē excidat, periculum est.

106 Si spina vsque in ventrem internē
luxata fuerit, nulla arte aut machina
repelli possit, viuis hominibus. Cur igi-
tur hoc scribo, inquis? sanē quia non-
nulli putant se hominem ita affectum
curasse, spinamque sua sponte, iterum
fanescere nulla repositione indigentē.
Quippe ignari multi sunt, & lucro hoc
habent, quod ignorant. Persuadent et-
iam aliis, cū tamen ipsi pessimē fal-
luntur.

107. Quibuscunque spinæ verticula in-
trō obliquantur, ita vt alia ab aliis mul-
tū distent, lethale signum. Sed si su-
perstitēs euadant, profluam magis sem-
per habent vrinam, & cruribus impo-
tentiores, & torpidiores fiunt.

108. Ossa circa cubiti flexuram molestio-
ra sunt, quā quæ circa genu, & diffici-
cilius reponi possunt. Luxantur quidē
minus,

minus, quàm illa, verùm difficilius reponuntur ac coaptantur : insuperque magis inflammantur, & callum acquirunt.

Quibus tibiæ ossibus luxatis ac vl- 109.
cere superinducto, articuli pedum omnino eminent, si verò intrà vergant, siue extrà, tales non reponere melius est. Certò enim morietur homo.

Os pedis luxatum, eadem die, aut 110.
postridiè, aut tertio ad summum die reponi debet: Quarto enim recrudesce solet. Post decem verò dies repositum, vix continetur.

Quibus pes solus excesserit, aut 111.
cum appendice, nisi rursus incidat, attenuatur progressu temporis, & coxa, & femur, & tibiæ pars luxationi opposita.

VI.

De cutis vitiis.

112. Quibus sunt cum vlceribus tumores conspicui, ii non admodum conuelluntur, aut insaniunt: Quibus verò repente euanuerint, siquidem postica parte factum sit, conuulsiones & tetani accidunt: si verò à fronte insania, lateris dolor acutus, empyema & dysenteria, si rubecundi fuerint tumores.
113. Tumor apparens in loco aliquo, semper materiam significat.
114. Ruptiones quæ ex dorso ad cubitum descendunt, venæ sectio soluit.
115. Post restaurationem fracturæ ossis, fit vt membrum maneat gracile, quod accidit, aut ob indecentem & arctam membri deligaturam, vnde membrum suo nutrimento fuit destitutum, aut immodicam resolutiuorum administrationem.
116. Asphacelismo ossis abscessus.
117. Quando membrum aliquod incipit virescere,

virescere, & liuescere, tùm certum est ipsum tendere ad corruptionem.

Quibuscunque venter fuerit stypticus, & chymi crudi & acuti multiplicantur in venis, vt plurimum scabie vexantur, & immunditie cutis. 118.

Nonnunquam secta vena accidit 119. scabies aut si adest inde augetur. Huius duæ sunt causæ: Prima est, quòd exigua phlebotomia commouet humores, & humorum commotorum aliqua pars ad cutis superficiem delegatur, vnde augetur scabies. Altera est, quia per phlebotomiam magna quantitas exuperantis humoris expellitur, qua expulsa natura reliquiis dominatur, & expellit ad exteriora.

Licet in cutis defædationibus ac 120. scabie corpus probè euacuetur, tamen scabies non desinit, huius causa hæc est: quòd cutis & partes subcutaneæ malam intemperiem acquisiuerunt, ita vt qui quid ad ipsam pro nutrimento delegatur corrumpatur. Ideò post purgationes corporis factas adhibenda sunt

V 7 extrin-

extrinsecus inunctiones & balnea, ut cutis intemperies sic alteretur emendeturque.

121. Quando in cutis defædationibus ac scabie, corpore purgato, ac balneis & inunctionibus æger non curatur, signum est multitudinis humorum, & crassitie eorum. Quare materia de nouo digeratur, purgetur, æger inungatur & balneetur, & curabitur.

122. Corpora scabiosa & cacochymica non crassescunt, donec corpus sufficienter sit euacuatum.

123. Quando scabies ex adustis, cholericis & melancholicis humoribus nascitur, & corpus est emaciatum, cholericumque, tunc nihil est melius quam corpus impinguare.

124. Quando scabiosi urinam habent laudabilem ac inculpatam, sic ubi & alui excrementa sunt inculpata, tunc scias corpus esse mundum, & virtutem naturalem robustam. Ideo tunc extrinsecus hærens scabies conuenientibus medicamentis curetur.

Con-

Confectio Hamech est præstans 125.
medicamentum, vbi vlcera & pustulæ
in cute apparuerint.

Viperarum caro quàm celerrimè ad 126.
cutem ac superficiem digeri ac distri-
bui solet. Quare vbi recrementorum
copia affuerit, & viæ fuerint obstructæ,
minimè totò viperarum caro exhibe-
tur; sed postea cum coniecturauerimus
humores esse attenuatos, & vias esse
dilatatas.

In scabie & cutis defœdationibus 127.
cucurbitularum vsus non admittitur,
donec corpus probè perpurgatum sit,
quia sanguinem intercutem exhauriūt,
euacuantque.

In cutis defœdationibus reliquis 128.
purgatoriis ac digestiuis medicamentis
administratis, extrinsecùs primùm fiat
balneum, vt sic materia ad superficiem
cutis attrahatur, & resoluatur. Deinde
vnguenta desiccantia & congruentia
adhibeantur.

Latæ pustulæ non admodum pruri- 129.
ginosæ.

Quan-

130. Quando in corpore tubercula nascuntur, tùm alui excrementa, vrinæ, & vomitum inspicere oportet. Si enim hæc biliosa apparent, tùm certum est totum corpus vitiosis adhuc humoribus, qui euacuatione indigeant, abundare. Si verò hæc sanis similia fuerint, tùm palam est, naturam totam superfluitatem ad partes patientes deposuisse, & totum corpus bonos humores habere, ac sine vlllo periculo nutriri posse.
131. Medicamenta omnia quæ contra ambustionē ignis administrantur, nequaquam frigidè administrantur, sed tepidè, ne partes adustæ sic detineantur, vt fumi exhalare non possint.
132. Curatio sanguinis mortificati sub cute, in principio perficitur cum medicinis resolutiuis, permixtis cū quibusdam stypticis. Resolutiua enim aperiunt & dilatant orificia venarum, ideò styptica admiscenda sunt, quæ prohibent ne sanguis è venis exeat. Postea vbi dolor quieuerit, sola discutientia admoveantur.

In

In lepra, vbi materia ad cutem nota- 133.
biliter est expulsa extra venas, venæse-
ctio detestatur.

Aphorismorum Practicorum
FINIS.





